

新除草・調節剤

ア リ セ ッ プ PAC・BIPC 水和剤

(取扱メーカー) 北興化学工業株式会社

対象作物：タマネギ本畑・タマネギ苗床・ラ
ッキョウ・チュウリップ。

性状・作用特性：㊦1巻㊦3号参照。

使用方法：タマネギ本畑・ラッキョウ・チュ
ウリップでは定植後(秋季)および生育期(春
季)に、タマネギ苗床では2〜3葉期に、10
アール当り タマネギ本畑、400〜600g, タ
マネギ苗床、400〜500g, ラッキョウ・チュ
ウリップ、300〜500gを100ℓ前後の水に
溶かして、地表にむらなく散布する。

使用上の注意としては、雑草の発生前や小さ
いときに散布し、雑草がすでに大きくなったと
きは、中耕後に使用する。

また、作物の生育が悪いときや高温時には、
葉害を生ずることがあるので注意する。

砂土はさけること。

クサキラー水和剤50 クレダジン除草剤

(取扱メーカー) 三 共 株 式 会 社

北 海 三 共 株 式 会 社

九 州 三 共 株 式 会 社

対象作物：カンショ・トマト・ピーマン・イ
チゴ。

性状・作用特性：本剤は、SW-6701の
試験名で試験が実施されてきた薬剤である。

植調㊦3巻㊦2号参照

使用方法：カンショは挿苗後、トマト・ピー
マンは定植直後、アール当り40〜60gを水
10ℓに希釈して土壌表面に均一に散布する。
イチゴ(本畑)は、活着後、アール当り50〜
60gおよびマルチ前40gの体系処理。

判 定	判 定 理 由 お よ び 使 用 法	委 託 メ ー カ ー
継	試験年次不足 薬量を下げて再検討	三 菱 油 化 日 本 化 薬 み か ど 加 工
継	試験年次不足 薬量を下げて再検討	三 菱 油 化 日 本 化 薬 み か ど 加 工
継	試験年次不足 薬量を下げて再検討	三 菱 油 化 シ オ ノ ギ 製 薬 み か ど 加 工