

	作物名	薬剤名	剤型	有効成分および含有率
除草剤	カボチャ	NPA (アラナップ)	液	N-1-ナフチルフタラミン酸(ナトリウム) 20%
	チューリップ	クレダジン (SW-6701 クサキラー水和)	水和	3-(2-メチルフェノキシ)ピリダジン 50%
	ユリ	MCC (スエップ水和剤)	水和	メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル)カーバメイト 40%
	ネギ(本畑)	SAP・プロメトリン (エス乳剤)	乳	SAP 50% プロメトリン 5%

	作物名	薬剤名	剤型	有効成分および含有率
生育調節剤	キュウリ	FC904	液	未公開 10%
	イチゴ	FC904	液	未公開 10%
	ナス	FC904	液	未公開 10%
	カーネーション	IBA (エタペロン)	液・粉	インドールブチリックアシッド
	メロン	エスレル	液	2-クロロチルホスホニックアシッド 480g/l

	作物名	薬剤名	剤型	有効成分および含有率
マルチ	レタス	DCMU シート		DCMU; 3-(3,4-ジクロロフェニル)1,1-ジメチルウレア 10g/a 15g/a
	イチゴ	プロメトリン シート		プロメトリン
		DCMU シート		DCMU 10g/a 15g/a
		ディノラン シート		クロロクシロン; N-4(4-クロロフェノキシ)フェニルN',N'-ジメチル尿素 30g/a 40g/a

毒草の話

雑草のなかには、有毒な成分をもつ毒草があり、間違えて食べたりするとひどい目にうことがある。

アゼムシロ、ウマノアシガタ、キツネノボタン、タガラシ、イヌハウズキ、オキナグサ、

ガガイモ、クサノオウ、タケニグサ、トウダイグサ、ドクゼリ、ヒガンバナ、フクジュソウなどは、全体に有毒成分があり、また、カラスビシャクの球茎、ヤマゴボウの根、ヨウシュヤマゴボウの葉や根にも有毒な成分が含まれている。近頃は、山菜ブームで、野草を食べる人が多

判 定	判 定 理 由 お よ び 使 用 法	委 託 メ ー カ ー
継	試験年次不足	アラナップ普及会
?	後作用についての試験未了につき判定保留	三 共
?	試験進行中の成績をまって判定	スエップ普及会
実	定植後および土寄せ後うね間土壌処理60cc	日 本 農 薬 東 洋 棉 花

判 定	判 定 理 由 お よ び 使 用 法	委 託 メ ー カ ー
継 ?	効果は充分でないが、処理方法についてさらに検討	藤 沢 薬 品
継 ?	同 上	同 上
継 ?	同 上	同 上
実・継	10, 20ppmの16, 24時間, 粉剤0.1% 粉剤0.5%について継続	塩 野 義 製 薬
継	試験年次不足	2, 4 - D 協 議 会

判 定	判 定 理 由 お よ び 使 用 法	委 託 メ ー カ ー
継	試験年次不足	組 合 包 装
継	薬害, 効果不十分とみられるので試験継続	み か ど 加 工
継	試験年次不足	組 合 包 装
継	試験年次不足	同 上

くなりましたが、毒草には注意したいものだ。 培している種類のもので、野草のヤマゴボウ
実話であるが、ヤマゴボウの味噌漬に野草のヤ とは別のものである。
マゴボウを採集してきて、これを食べて中毒を
起こしたという例がある。毒草を知っておくの
も、大切なことだ。

なお、売っているヤマゴボウの味噌漬は、裁