

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農 薬 名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	使用 目的	使用時期	使用濃度はま たは希釈倍数	使 用 方 法	登録会社
ナフサク液 剤 20	α -ナフタリン酢酸 ナトリウム 20.0%	液 剤	温州みかん (成木)	摘 果	満開後 25~35日頃	650~1000倍 (200~ 300ppm)	散 布	北興化学工業 三 共 北 海 三 共 九 州 三 共 クミアイ化学 トモノ農業 日 本 農 業
ナフサク粉 末	α -ナフタリン酢酸 ナトリウム 90.0%	粉 剤	温州みかん (成木)	摘 果	満開後 25~35日頃	3000~4500倍 (200~ 300ppm)	散 布	トモノ農業 日 本 農 業
			からまつ苗木 (秋植え予 定)	生長休 止期間 間促進		200~300倍 (3000~ 4500ppm)	8月中旬~9月上旬まで間に5 ~7日おきに2~3回苗床面積 1㎡当り0.5ℓを茎葉散布	
			かぼちや	結 果 促 進		50000~ 80000倍	雌花の子房に薬液を毛筆で塗布 し後、柱頭に花粉をつける	
ナフトン- 90	α -ナフタリン酢酸 ナトリウム 90.0%	粉 剤	温州みかん (成木)	摘 果	満開後 25~35日頃	3000~4500倍 (200~ 300ppm)	散 布	大 塚 化 学 薬 品

訂正について

第5巻第5号11頁「新登録除草剤一覧」中のピクロラム除草剤は非ホルモン型除草剤に記
載されているのは誤りで、ホルモン型除草剤であります。何とぞご訂正下さい。

財団法人 日本植物調節剤研究協会 編

除草剤使用基準 (登録・都道府県別)

☆ 本書の特徴

昭和46年度、各都道府県において指導指
針に入れた除草剤の作物別使用量、使用時期、
処理法、適用土壌、使用上の注意等を一覧表
形式にとりまとめている。

なお、昭和46年8月1日現在、登録され
ている除草剤の有効成分、含有率、対象作物
別使用量等を、系統別に一覧表形式に編集し
てある。

< 予約取扱中 >

規 格 B5判
頁 数 320頁程度
紙 質 上質 55Kg
装 幀 ダイヤボード 並製本
頒布価 950円程度 (送料別)

発行所 植 調 編 集 印 刷 事 務 所
東京都港区芝愛宕町1-3
全国農村教育協会内