

新登録生育調節剤一覧

農林省農政局植物防疫課

昭和47年1月1日～3月31日

農薬名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用方法	登録会社
エスレル	2-クロルエチルホスホン酸 39.0%	液剤	アトリカラー [ネオレゲリア カロリー ナトリカラ ー]	着花促進 (開花促進)	4～11月 開花希望日の約 3カ月前	葉面散布 500～600倍 葉筒内注入 600～1000倍	本剤の所定希釈液を葉全面に散布または葉筒内に株当たり20cc注入する。 使用株は葉数20枚以上であること。	日産化学工業, 石原産業
			インコアナナス [イブリー ジア カリナー タ]	同上	1～6月 開花希望日の約3 カ月前	葉面散布 600～1000倍 葉筒内注入 4000倍		

昭和46年度既登録農薬残留量調査試験実施状況

財団法人 日本植物調節剤研究協会

昭和46年度、当協会において受託した既登録農薬残留量分析試験調整(64薬剤148組)および農薬残留量分析結果報告書の審査状況(20薬剤43組)については、下記の通りである。

(昭和47年3月31日現在)

(注) 印は対象作物が審査済である。

2,4PA(水稲移植), MCP(水稲移植), PCP(水稲移植・水稲移植体系・陸稲・ばれいしょ・菜豆・こんにゃく), PCP・MCP(水稲移植), MCC・MCP(水稲移植), 2,4PA・ATA(水稲移植), CNP・MCP(水稲移植), MCC(陸稲), MCPB(水稲移植), CNP(水稲移植, 水稲体系), NIP(水稲マルチ・水稲移植・かんらん・い

ちご・きゅうり・らっかせい・かんしょ), NIP・MCP(水稲移植), シメトリン(水稲移植), DCPA(水稲移植・かんしょ・レタス), DCPAホドガヤ(水稲移植), DCPA・CHCH(水稲移植), DCPA・NAC(みかん), TOPE(水稲移植), DMNP(小麦), DMNP・MCP(水稲移植), DNBP(水稲畑苗代, 大豆), EPTC(菜豆・ばれいしょ), DCNP(菜豆・小麦), CMPT(小麦), DNBPA(菜豆), CMPT(小麦), DPA(なたね・てんさい・みかん・りんご), IPC(菜豆・いちご・はくさい・いんげん・ごぼう), CAT(陸稲・ち