

区 分	除 草 剤 名	処理法	処理時期	使用量(製品)	適用土壌	適用地帯	使用上の注意
3) 水稻刈跡 i) マツバイ	DPA・MCP 水溶	茎葉処理	稲刈取後平 均気温 18℃以上	80~120 g/a	壤土~ 埴土	温暖地以西	・マツバイ, 冬生雑 草対象
	DPA・MCP 微粒	茎葉処理	稲刈取後平 均気温 18℃以上	300~450 g/a	壤土~ 埴土	温暖地西部 以西	

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農 林 省 農 政 局 植 物 防 疫 課

昭和47年6月1日~7月31日

農薬名	有効成分の種類 および含有量	剤型	適用作物名	使用目的	使用時期	使用量または希釈倍数	使用方法	登録会社
ルチエース	5-クロル-1H-3-イン ダゾリル酢酸ナトリウム 0.050%	粉剤	花木類 ヒマラヤン ーダ, マメ ツゲ, ドー ダンツツジ, キンボー ジュ, モク セイ, カイ ヅキ, ツバキ(品 種は熊谷に 限る)	挿木の発 根及び活 着を促進 する	各種花木類の 通常の挿木時 期	粉剤をその まま使用す る	挿穂の切 り口を水 でしめら せ本剤を 粉衣しす ぐに挿床 に挿す	日産化学 工業
日本カーバイ ドMH-30	マレイン酸ヒドラジドジエ タノールアミン 58.0%	液剤	たまねぎ	貯蔵中の 発芽防止	収穫前 1～2週間	120～150 ^倍	散 布	日本カー байд工 業
			ばれいしょ		収穫前 2～3週間	100～200		
			てんさい		収穫前 2～4週間	120		
			たばこ	吸芽抑制	芯止期以降	60		
			かんしょ	つるぼけ 防 止	収穫前 2～3週間	120		
			夏蒔 かんらん	抽苔防止	11月下旬 ～12月上旬	100		
			結球 はくさい		12月下旬 ～1月上旬			
			にんじん		収穫前 1～3週間	120		