

果樹園の下草除草に



優秀農薬として発明賞受賞の DCPA・NAC除草剤

ワイダック® 乳剤

- 雑草には極めて強力な除草効果を示します。
- 除草期間は理想的です。(30～50日間)
- 根からの薬害がありません。
- 柑橘の茎葉にかかってても薬害の心配はほとんどありません。
- りんごその他落葉果樹に使用の際は葉にかからないよう散布して下さい。
- 尚ご使用の際は指導員によくおきき下さい。

梅雨あけの夏期高温時に本剤2～3ℓを水150～300ℓに
稀釈して、加圧噴霧機で雑草によく付着するよう散布する。

《ワイダック普及会》

全国の農業協同組合で取扱っております。

クミアイ化学工業・大日本除虫菊
三笠化学工業・北興化学工業・長瀬産業
保土谷化学工業・(特別会員) 全農

事務局 保土谷化学工業株式会社
東京都港区芝罘平町2の1 TEL03(502)0171代表

新登録生育調節剤一覧

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和48年8月1日～昭和49年5月31日

農薬名	有効成分の種類 および含有率	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	希釈 倍数	散布液量	使用方法	登録会社
ブルーン	ドデシルベンゼ ンスルホン酸 カルシウム塩 25.0%	液剤	てっぼう ゆり	摘蕾	出蕾3日前か ら 蕾長1cm以内	100倍	20cc/ 1株	局部(茎頂) 散布	花王アトラス 武田薬品工業
プロテ クトン	炭酸カルシウム 95.0%	水和剤	りんご	有機硫黄水 和剤による 果実の表皮 障害の防止		80倍		有機硫黄水和 剤に混用して 散布	丸尾 カルシウム
シオノ ックス 水和剤	二酸化ケイ素 75.0%	水和剤	りんご (ゴール デンデリ シャス)	さび果防止	落花直後(中 心花の花べん が80%落ち た時)に1回、 その後10日 間隔で1～2回	30倍	500 ～600 1/10a	果実を中心に 散布する	塩野義製薬