

区分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	4 4 年度	4 5 年度	4 6 年度	4 7 年度	4 8 年度	4 9 年度
(つぎ)	ベスロジン乳剤	バナフィン乳剤	千ha	千ha	千ha	千ha 0.1	千ha 0.5	千ha 0.5
	アシュラム液剤	アーザラン液剤				5.8	14.1	8.3
	ビクロラム	ケイビン				0.9	3.3	4.8
	DSMA・MCP P 粉剤	DSCP 粉剤			0.4	0.2	0.2	0.2
	DSMA・MCP P 液剤	DSCP 液剤			0.2	0.5	0.5	1.0
	小 計		267.5	260.7	145.9	121.8	164.5	186.6
畑作	合 計		1,430.0	1,708.9	1,829.1	2,097.4	2,488.4	3,177.0
総 合 計			5,674.8	6,268.4	6,461.0	7,343.0	8,042.7	9,497.9

(財団法人 日本植物調節剤研究協会試算)

- 注) ① この統計表の算出にあたっては、各メーカーより報告された出荷数量を基とした。
 ② 使用面積の算出にあたっては、10a 当り使用量の平均値を用いて換算した。
 ③ 昭和44, 46, 47, 48, 年度の数値については、換算率に誤りがあったので一部訂正した。

新 登 録 除 草 剤 一 覧 表

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和50年3月1日～5月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 物 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
オキサジ アゾン複 合肥料	ロンスタ ー複合肥 料85	5-タージャリ ーブチル-8 -(2,4-ジ クロル-5- イソプロポキ シフェニル) -1,3,4-オ キサジアゾリ ン-2-オン 0.35% 磷酸アンモニウ ム、塩化加里 (アンモニア 性窒素12.0 %, 可溶性磷 酸15%, 水	粒 剤	水 稲 (普通移 植栽培)	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ	全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 (極端な 漏水田 を除く)	植代時 (田植前 1～3日)	20～ 30kg (暖地) 30～ 40 (寒地)	湛水散布 土壌混和 処理, 荒 代かき後 水深3～ 5cmに湛 水したの ち, 均一 に散布し, 植代かき で土壌表 層2～3 cmの深さ に混和す る。	日産化 学工業

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適 用 物 料 (場 所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		溶性加里15 (%)									
オキサジ アゾン複 合肥料	ロンスタ ー複合肥 料18	5-ターシャリ -ブチル-3 -(2,4-ジ クロル-5- イソプロポキ シフェニル) -1,3,4-オ キサジアゾリ ン-2-オン 0.18% 磷酸アンモニウ ム、塩化加里 (アンモニア 性窒素12.0 %, 可溶性磷 酸15%, 水 溶性加里15 %)	粒 剤	水 稲 (普通移 植栽培)	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ	関東以 西の普 通期裁 培地帯	砂壤土 ~塩土 (極端な 漏水田 を除く)	植代時 (田植前 1~3日)	40~ 50Kg	湛水散布 土壌混和 処理、荒 代かき後 深水3~ 5cmに湛 水した後 均一に散 布し植代 かきで土 壌表層2 ~3cmの 深さに混 和する。	日産化 学工業
ベントゾ ン除草剤	バサグラ ン粒剤	3-イソプロピ ル-2,1,3- ベンゾチア ジアジノン(4) -2,2-ジオ キシド 10%	粒 剤	水 稲 (普通移 植栽培)	水田一 年生広 葉雑草、 ホタル イ、ウ リカワ、 ミズガ ヤツリ、 ヘラオ モダカ ウリカ ワ、ミ ズガヤ ツリ	全域の 普通期 栽培地 帯 関東東 山の早 期栽培 地帯	砂壤土 ~塩土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	雑草の 発生盛 期~発 生揃期 (移植後 15~ 30日) 雑草の 発生揃 期 (移植後 10~ 20日)	4~ 6Kg	浅く湛水 して散布 (茎葉兼土 壌処理)	住友化 学工業 クミアイ 化学工業 サンケ イ化学 北興化 学工業 八洲化 学工業 三 共 日本農薬
ベントゾ ン除草剤	バサグラ ン水和剤	3-イソプロピ ル-2,1,3- ベンゾチア ジアジノン(4) -2,2-ジオ	水和剤	水 稲 (普通移 植栽培)	ミズガ ヤツリ、 ホタル イ、ウ リカワ	全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ~塩土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	雑草の 発生盛 期~発 生揃期	800~ 1200g (70~ 100g)	散 布 (茎葉兼土 壌処理)	住友化 学工業 クミアイ 化学工業 サンケイ化学

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 物 作 (場 所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		キシド 50%						移植後 15～ 30日			北興化 学工業 八洲化 学工業 三 共 日本農薬
				水 稲 (乾田 直播)	ミズガ ヤツリ	関東北 陸以西 (九州, 南四国 を除く)		入水後 雑草の 4～6 葉期	600～ 1200g (70～ 100ℓ)	散布(茎 葉処理)	
ベンチオ カーブ・ ベントゾ ン除草剤	サタグラ ン粒剤	S-(4-クロ ルベンジル) -N,N-ジエ チルチオカー バメート 10% 3-イソプロピ ル-2,1,3- ベンゾチアジ アノン-(4)- 2,2ジオキシ ド 10%	粒 剤	普通移 植水続	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ, ミ ズガヤ ツリ, ウリカ ワ	北海道 を除く 全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	移植後 6～ 10日 ノビエ の1.5 葉期ま で	3～ 4Kg	浅く湛水 して散布 (茎葉兼土 壌処理)	クミアイ 化学工業
				稚苗移 植水稲	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ		埴土～ 埴土 (減水深 2cm/ 日以下)	移植後 6～ 10日 東北, 北陸は 8～ 10日 ノビエ の1.5 葉期ま で			
					ホタルイ	東北, 北陸の 普通期 栽培地 帯					
					ウリカワ	九州, 南四国 などの 暖地の 普通期 栽培地 帯					

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 物 (場 所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 時 期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
ベンチオ カーブ・ シメトリ ン・ベン タゾン除 草剤	エスグラ ン粒剤	S-(4-クロ ルベンジル) -N,N-ジエ チルチオカー バメート 7.0% S-メチルチオ -4,6-ビス (エチルアミ ノ)-S-トリ アジン 1.5% 3-イソプロピ ル-2,1,3- ベンゾチアジ アジノン-(4) -2,2-ジオ キシド 7.0%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ, ウ リカワ, ホタル イ, ミ ズガヤ ツリ	全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 [減水深 2 cm/ 日以下]	移植後 7～15 日, ノ ビエの 2.5 葉 期(寒 地では 2 葉期, 暖地で は 3 葉 期)ま で	3 ～ 4 Kg	浅く湛水 して散布 (茎葉兼土 壌処理)	クミアイ 化学工業
					ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ, ミ ズガヤ ツリ	関東, 東山地 域の早 期栽培 地帯					
				稚苗移 植水稻	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ, ウ リカワ, ホタル イ, ミ ズガヤ ツリ	九州, 南四国 並びに 北海道 を除く 地域の 普通期 栽培地 帯及び 関東, 東山地 域の早 期栽培 地帯	埴土～ 埴土 [減水深 2 cm/ 日以下]				
2,4 PA ・ベンタ ゾン除草 剤	グラスジ ンD粒剤	2,4-ジクロル フェノキシ酢 酸エチル 1.5% 3-イソプロピ ル-2,1,3- ベンゾチア	粒 剤	水 稲	水田一 年生広 葉雑草 ホタル イ, ウ リカワ, ミズガ	関東以 西の普 通期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土 [減水深 1.5 cm/ 日以下]	有効分 けつ終 止期～ 幼穂形 成期前	3 ～ 4 Kg	湛水散布 浅く湛水 して本剤 を手また は散粒機 で均一に 散布する。	日産化 学工業 石原産業

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 場 所	適 用 雄 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		シアジノンー (4)ー2,2ージ オキサイド 10%			ヤツリ						
2,4 P A ・ペンタ ゾン除草 剤	グラスジ ンD水和 剤	2,4ージクロル フェノキシ酢 酸エチル 4.5% 3ーイソプロピ ルー2,1,3ー ベンゾーチア シアジノンー(4) ー2,2ージオ キサイド 30%	水和剤	水 稲	水田一 年生広 葉雑草 ホタル イ, ウ リカワ, ミズガ ヤツリ	関東以 西の普 通期裁 培地帯	砂壤土 ～埴土	有効分 けつ終 止期～ 幼穂形 成期前	700～ 1000g (70～ 100L)	落水散布 散布前日 に落水散 布する。	日産化 学工業 石原産業
M C P ・ ペンタゾ ン除草剤	グラスジ ンM	2ーメチルー4 ークロルフェ ノキシ酢酸エ チル 1.5% 3ーイソプロピ ルー2,1,3ー ベンゾーチア シアジノンー (4)ー2,2ージ オキサイド 10%	粒 剤	水 稲	水田一 年生広 葉雑草 ホタル イ, ウ リカワ, ヘラオ モダカ, ミズガ ヤツリ	北海道 を除く 全域の 普通期 栽培地 帯 北海道	砂壤土 ～埴土 [減水深 1.5cm/ 日以下]	有効分 けつ終 止期～ 幼穂形 成期前 幼穂形 成始期	3 ～ 4 Kg	湛水散布 浅く湛水 して本剤 を手また は散粒機 で均一に 散布する。	日産化 学工業 石原産業
M C P ・ ペンタゾ ン除草剤	グラスジ ンM	2ーメチルー4 ークロルフェ ノキシ酢酸エ チル 4.5% 3ーイソプロピ ルー2,1,3ー ベンゾーチア シアジノンー(4) ー2,2ージオ キサイド 30%	水和剤	水 稲	水田一 年生広 葉雑草 ホタル イ, ウ リカワ, ヘラオ モダカ, ミズガ ヤツリ	西南暖 地を除 く全域 の普通 期栽培 地帯(北 海道を 除く) 北海道	砂壤土 ～埴土 [減水深 1.5cm/ 日以下]	有効分 けつ終 止期～ 幼穂形 成期前 幼穂形 成始期	700～ 1000g (70～ 100L)	落水散布 散布前日 に落水し て散布す る。 湛水散布 浅く湛水 して散布 する。	日産化 学工業 石原産業

種類名	商品名	有効成分の種類 及び含有量	剤型	適用 作物 (場所)	適用 雑草	適用 地帯	適用 土壌	使用 時期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
オルソベン カーブ 除草剤	ランレイ 乳 剤	S-(2-クロ ルベンジル) -N,N-ジエ チルチオカー バメート 50%	乳 剤	芝 (高麗芝、 野芝)	メヒシ バ、ス ズメノ テッポ ウ、ス ズメノ カタビ ラ等禾 本科一 年生雑 草		全土壌	雑 草 発生前	1200 cc~ 1500 cc (300L)	全面散布 (土壌処理)	理研薬販

新除草・調節剤の欄について

この欄では、新たに農薬登録された除草剤・生育調節剤については、すべて紹介いたしたいと思っておりますが、委託者が発売する意思のない薬剤については委託者の意思により掲載いたしておりませんので、何とぞご了承下さい。

多くの作物に安心して使える除草剤

トリアノサイド[®]乳剤・粒剤2.5

- 1年生イネ科雑草に著効を示します

イネ科・広葉の多年生雑草に効果の高い

アージラン^{*}液剤

- きわめて安全な除草剤です

シオノギ製薬

®イーライリリー社登録商標

*メイ・アンド・ベーカー社登録商標