

区 分	除 草 剤 名		昭 和	昭 和	昭 和	昭 和	昭 和
	一 般 名	商 品 名	4 6 年度	4 7 年度	4 8 年度	4 9 年度	5 0 年度
(4)茎葉処理 剤 (つづき)	塩素酸塩・弗化ナトリウム	クロレートFE	千ha 0.4	千ha 0.3	千ha 0.4	千ha 0.3	千ha 0.1
	2,4,5-T・スルファミン 酸・硫酸アンモニウム	ブラッシュパン、イクリ ンエイト	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0
	M C P P	M C P P液剤		4.3	3.5	3.0	3.1
	D S M A・M C P P	D S C P粉剤	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0
	D S M A・M C P P	D S C P液剤	0.2	0.5	0.5	1.0	3.9
	ピクロラム	ケイビン		0.9	3.3	4.8	2.5
	(小 計)		425.6	612.5	882.6	1280.1	928.9
(5)茎葉兼土 壌処理剤 〔対象： 多年生 雑草〕	A T A	ウィダゾール水溶剤	6.8	7.3	3.3	0.0	0.0
	A T A	ウィダゾール粒剤	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ブ ロ マ シ ル	ハイパーX水和剤	28.9	38.8	49.8	48.5	21.3
	ブ ロ マ シ ル	ハイパーX粒剤		0.4	1.5	2.1	0.4
	シ ア ノ 酸 塩	シアノン水溶剤	7.0	11.4	6.9	6.2	4.4
	シアノ酸塩・DCMU	ゼットシアン	3.3	9.2	6.5	0.3	0.0
	DCMU・ターバシル	ゾーバー水和剤				1.3	0.1
	ATA・DCMU	ボミカル、アプレックス 水和剤	19.5	5.3	4.9	3.7	0.0
	ATA・アトラジン	ドマトール水和剤	1.2	1.6	1.7	2.6	3.6
	塩 素 酸 塩	クサトール、クロレート ソーダ水溶剤	78.4	79.8	104.4	84.0	40.8
	塩 素 酸 塩	クサトール、デゾレート 粒、粉剤	58.9	24.6	32.1	75.5	17.1
	塩 素 酸 塩	クロシウム液剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	テトラピオン	フレノック液剤	0.4	0.1	0.1	0.1	0.6
	テトラピオン	フレノック粒剤	0.8	2.1	1.6	4.3	9.1
	アシュラム	アーグラン液剤		5.8	14.1	8.3	7.3
	(小 計)		206.4	186.4	226.9	237.0	104.7
合 計			1816.3	2082.9	2473.8	3174.6	2540.4
総 合 計			6448.2	7227.8	8028.1	9496.4	8548.3

(財団法人 日本植物調節剤研究協会試算)

注) ① この統計表の算出にあたっては、各メーカーより報告された出荷数量を基とした。

② 使用面積の算出にあたっては、10a当り使用量の平均値を用いて換算した。

③ 昭和46.47.48.49年度の数値については、一部に誤りがあったので訂正した。

新 登 録 除 草 剤 一 覧 表

農林省農産園芸局植物防疫課

昭和50年6月1日～10月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 物 作 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
NIP・ ダイムロ ン除草剤	トルロン 粒剤	2,4-ジクロル フェニル-4-	粒 剤	普通移 植水稻		全域の 普通期	砂壤土 ～塩土	植代後 田植前	3～ 4kg	湛水散布 土壌処理	東京有機 化学工業

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適 用 物 作 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		ニトロフェニル エーテル 70% 1-(α , α - ジメチルベンジ ル)-3-(パ ラトリル)尿素 50%			ノビエ その他 水田1 年生雑 草及び マツバ イ, ホ タルイ	及び早 期栽培 地帯, ホタル イは東 北, 北 陸以北	(減水 深2cm /日以 下)	3~2 日又は 田植後 3~7 日(ノ ビエ1 葉期ま でホタ ルイ発 生始ま で)			錦, 昭和 電工㈱
				稚苗移 植水稻		全域の 普通期 栽培地 帯, ホ タルイ は九州 四国の 暖地を 除く	壤土~ 壇土 (減水 深2cm /日以 下)	田植後 3~5 日(ノ ビエ1 葉期ま で, ホ タルイ 発生始 まで)			
CNP・ ダイムロ ン除草剤	ショウロ ンM粒剤	2,4,6-トリク ロルフェニル- 4-ニトロフェ ニルエーテル 90% 1-(α , α - ジメチルベンジ ル)-3-(パ ラトリル)尿素 70%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエ その他 の水田 1年生 雑草及 びマツ バイ, ホ タルイ	全域の 普通期 関東, 東山早 期栽培 地帯, ホタル イ 関東 東山以 北	壇土~ 壇土 (減水 深2cm /日以 下)	植代後 田植前 3日~ 田植後 7日 (ノビ エ1葉 期まで ホタル イ発生 始まで)	3~ 4 kg	湛水散布 土壌処理	三井東圧 化学㈱, 昭和電工 ㈱
				稚苗移 植水稻		全域の 普通期 栽培地 帯, ホ タルイ 東北, 北陸以 北					