

薬 種 商	剤 類 品 名	剤型	有効成分および含有率	委託者名	試験場所	判定	判定の理由・内容
3)	MC-C 蒸散抑制剤 ミクロンC	液	パラフィン・カルナバ 40%	日本技研	群馬, 山梨 徳島各蚕試 (3) (岐阜蚕試) (1)	継	処理条件の再検討。 試験方法および製剤につ いて検討。

昭和50年度茶園関係除草剤・ 生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会

昭和50年度茶園関係委託試験成績検討会は、
昭和50年12月19日、埼玉県茶業試験場に
おいて、試験場所関係者および委託関係者等約
40名参集のもとに開催された。

当検討会では、除草剤3薬剤13点、生育調
節剤2薬剤8点について、各試験場所担当者の
報告、その質疑応答ならびに慎重な検討が行わ

れた。

また、検討会終了後、試験場内の見学がなさ
れ、より親交が深められた。

その判定結果は次のとおりである。(生育調

節剤2薬剤については、以前に専門調査員およ
び試 担当者等と協議がなされ、判定結果が発
表されている。)

昭和50年度茶園関係除草剤・生育調節剤試験結果判定一覧表

A. 除 草 剤

薬 種 商	剤 類 品 名	剤型	有効成分および含有率	委託者名	試験場所	判定	判定の理由・内容
1)	U-67 (酸アミド系)	粒	3,4,5-トリブロム-N, N- α -トリメチルピラ ゾール-1-アセトアミ ド 6%	日本アップジ ョン	茶業試験場, 同枕崎支場, 静岡, 熊本各 茶試, 京都茶 研 (5)	実・ 継	実; 85%製品は300~400 g/a, 60%製品は350 ~400 g/a, 雑草発 生前土壌処理(株元 には散布しない)。 継; 土壌水分と効果および 薬害の関係について検 討。
2)	EDPD ジクワット レグロックス	液	ジクワット・ジブロマイ ド 30%	I.C.I.(ジャ パン), 武田薬 品工業, 日本 農薬	茶試枕崎支場 長野農試下伊 那分場, 静岡 茶試, 奈良農 試茶業分場, 長崎総農試, 彼杵茶業試験	実・ 継	実; 雑草生育初~中期40ml /a うね間雑草茎葉処 理。 継; 薬量・草種・処理時期 と効果との関係につ いて確認。

薬 種 名 商 品 名	剤型	有効成分および含有率	委託者名	試験場所	判定	判定の理由・内容
つづく				支場 (5)		
3) DPX-3674 (トリアジン系) ペルバー	水和	3-マイクロヘキシル-6-ジメチルアミノ-1-メチル-S-トリアジン-2,4(1H,3H)-ジオン 90%	デュボン・フアーイースト	茶業試験場, 三重農技茶業センター, 宮崎総農試茶業支場 (3)	継	試験年次不足 低薬量での検討。

B. 生育調節剤

薬 種 名 商 品 名	剤型	有効成分および含有率	委託者名	試験場所	判定	判定の理由・内容
1) アビオン-E 200 蒸散抑制剤 アビオンE	乳化	パラフィン 36% 乳化剤, その他 64%	アビオン化学研究所	埼玉茶試, 神奈川園試津久井分場, 岐阜中山間農試, 奈良農試茶業分場 (4)	実・継	実: 10~50倍液200~400 $\frac{L}{ha}$, 11月下旬以降2回散布。 継: 地域拡大検討。
2) MC-C 蒸散抑制剤 ミクロンC	液	パラフィン・カルナバ 40%	日本技研	埼玉茶試, 長野農試下伊那分場, 静岡茶試, 岐阜中山間農試 (4)	継	試験年次不足。

新発売

水田多年生雑草防除に

バサグラン* 粒剤 水和剤

特 長

- 水田多年生雑草にすばらしい効果を示す。
- 散布適期の幅が広く、生育期(発生盛期~増殖初期)散布での効果が高い。
- 稲にも、人畜・魚貝類にも非常に安全性が高い。

適用雑草 ミスガヤツリ・ホタルイ・フリカワ・ヘラオモダカ・水田一年生広葉雑草

効きめと安全の信頼にたえる



住友化学

東京都千代田区丸の内1-3-2

*は西ドイツBASF社の商標です。