

新 登 録 除 草 剤 一 覧 表

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和50年11月1日～12月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及び含有量	剤 型	適 用 作 物 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
ナプロバ ミド除草 剤	クサレス 水和剤	2-(α -ナフ トキン)-N, N-ジエチル プロピオンア ミド 50%	水和剤	はくさ い, だ いこん	畑作1 年生雑 草			播種後 (雑草発 生前)	400～ 600g (70～ 100 ℓ)	散布(全 面土壌処 理)1回 以内	日本農薬 (株) 中外製薬 (株)
				キャベ ツ, ト マト [露地移 植栽培]				定植活 着後 (雑草発 生前)			
				日本芝 [コウラ イ芝, ノシバ]	ヒメシ バ			雑草発 生前	600g (300 ℓ)	散布(全 面土壌処 理)	
エースフ ェノン除 草剤	キャスタ イト乳剤	4-ターシャリ -ブチル-2, 6-ジメチル -3,5-ジニ トロアセトフ ェノン 20%	乳 剤	すぎ, まつ, ひのき [播きつ け床, 床替床]	畑作1 年生雑 草			播種覆 土後又 は床替 活着後	1000～ 2000cc (1-2cc /㎡) 10ア- ル当り 散布液 量100 ～200 ℓ (100～ 200cc /㎡)	低圧噴霧 器等で苗 床土壌面 全面に均 一に散布 する。	大日本イ ンキ化学 工業(株)
ジメタメ トリン・ ビベロホ ス除草剤	アピロサ ン粒剤	2-メチルチオ -4-エチル アミノ-6- (1,2-ジメ チルプロピル アミノ)-S -トリアジン (ジメタメト リン) 11% S-(2-メチ ル-1-ビベ リジル-カル ボニルメチル) -0,0-ジ- n-プロピル	粒 剤	水 稲 [普通移 植]	ノビエ, その他 水田1 年生雑 草及び マツバ イ, ヘ ラオモ ダカ (寒地, 寒冷地)	全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 [減水深 3cm/日 以下]	田植後 7～15 日 (ノビエ の2.5薬 期まで 但し北 海道は 2薬期 まで。)	3～ 4Kg	灌水散布 茎葉兼土 壌処理	武田薬品 工業(株)
						九州・ 南四国 の暖地 を除く 全土壌		田植後 15～25 日(ノ ビエの 2.5薬期			

種類名	商品名	有効成分の種類 及び含有量	剤型	適用 作物 (場所)	適用 雑草	適用 地帯	適用 土壌	使用 時期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		ジチオホスフ ェート(ビベ ロホス) 44%				の普通 期栽培 地帯		まで、 但し北 海道は 2葉期 まで、 〔田植前 後の初 期土壌 処理剤 との体 系で使 用〕			
						全域の 普通期 栽培地 帯及び 九州・ 南四国 の暖地 の早期 栽培地 帯、	壤土～ 埴土 〔減水深 2cm/日 以下〕	田植後 10～15 日(ノビ エの25 葉期ま で、但 し北海 道は2 葉期ま で、)	3 Kg		
						全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/日 以下〕	田植後 15～25 日(ノビ エの25 葉期ま で、但 し北海 道は2 葉期ま で)〔田 植前後 の初期 土壌処 理剤と の体系 で使 用〕	3～ 4 Kg		
ジメタメ トリン・ ビベロホ ス・ベン タゾン除 草剤	ワイダー 粒剤	2-メチルチオー 4-エチルアミ ノ-6-(1,2 -ジメチルプロ ピルアミノ)- S-トリアジン 11%	粒剤	水稲 〔普通 移植〕	ノビエ、 その他 水田1 年生雑 草及び マツバ イ、ホ	全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/日 以下〕	田植後 7～15 日(ノビ エの25 葉期ま で、但 し北海	3～ 4 Kg	湛水散布 茎葉兼土 壌処理	武田薬品 工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類及び含有量	剤型	適用作物(場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量(10a当り)	使用方法	登録会社
(つづき)		S-(2-メチル-1-ビベリジルーカルボニルメチル)-0,0-ジ-n-プロピルジチオホスフェート 44% 3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアシアジノン-(4)-2,2-ジオキシド 10%			タリイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ(寒地、寒冷地)	九州・南四国の暖地を除く全域の普通期栽培地帯及び関東・東山・東海の早期栽培地帯		道は2葉期まで)			
								田植後15~25日(ノビエの25葉期まで、但し北海道は2葉期まで)			
								田植前後の初期土壌処理剤との体系で使用)			
				水 稲 〔稚苗〕 〔移植〕		全域の普通期及び早期栽培地帯	壤土〜植土 〔減水深2cm/日以下〕	田植後10~15日(ノビエの25葉期まで、但し北海道は2葉期まで)	3 Kg		
						全域の普通期栽培及び九州を除く地域 の早期栽培地帯	砂壤土〜植土 〔減水深2cm/日以下〕	田植後15~25日(ノビエの25葉期まで、但し北海道は2葉期まで)	3 ~ 4 Kg	田植前後の初期土壌処理剤との体系で使用)	

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適 用 作 物 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使 用 時 期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
モリネー ト・チオ クロルメ チル除草 剤	オードラ ムK粒剤	S-エチルヘキサ ヒドロ-1H- アゼビン-1- カーボチオエー ト 60 % N-(3-クロル -4-クロルジ フルオルメチル チオフェニル) -N,N'-ジメチ ル尿素 25%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエ, その他 水田 1 年生雑 草及び マツバ イ	北海道 を除く 全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	植代後 移植前 1～3 日又は 移植後 2～6 日	3 ～ 4 Kg	湛水散布 〔土壌処 理〕	日本特殊 農薬製造 (株) 八洲化学 工業(株) 三笠化学 工業(株)
						全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯		移植後 7～15 日 (寒 地は 7 ～20日) ノビエ の25葉 期まで		湛水散布 〔茎葉兼 土壌処 理〕	
						稚苗移 植水稻		ノビエ, その他 水田 1 年生雑 草及び マツバ イ	関東以 西の普 通期栽 培地帯	植代後 移植前 2～3 日又は 移植後 3～6 日	
				九州・ 南四国 の早期 栽培地 帯	移植後 3～7 日						
									北海道 を除く 全域の 普通期 栽培地 帯及び 関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯	移植後 5～15 日 (寒 地は 7 ～18日) ノビエ の25葉 期まで	
				ホタル イ	東北 , 北陸地 域	移植後 5～18 日ホタル イの発 生始 から2 葉期ま で		3 ～ 4 Kg			

種類名	商品名	有効成分の種類 及び含有量	剤型	適用 作物 (場所)	適用 雑草	適用 地帯	適用 土壌	使用 時期	使用量 (10a 当り)	使用方法	登録会社
(つづき)				湛水直 播水稻	ノビエ, その他 水田1 年生雑 草及び マツバ イ	中国, 四国以 西の地 域	壤土へ 増土 [減水深 1cm/ 日以下]	播種後 7~15 日イネ の15葉 期以降 ノビエ の2葉 期まで	3~ 4kg	湛水散布 [茎葉兼 土壌処 理]	

財団法人日本植物調節剤研究協会編

Weed List in Asian-Pacific Area

各国の雑草の呼称名を学名と対照した雑草名鑑。学名に対し日本名、英名、ハワイ名、インドネシア名、中国名、台湾名、ソビエト名、韓国名を対照している。

A4版 47ページ

定価 2,000円(送料別)

東京都港区芝愛宕町1-3 全国農村教育協会内

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)436-3388番

ノビエからホタルイまで

新発売

水田初期除草剤

ショウロンM粒剤

☑ホタルイに卓効

特 ☑イネに安全

長 ☑適用地帯が広い

☑高い安全性

ショウロンM普及会

クミアイ化学工業株式会社 昭和電工株式会社
三井東圧化学株式会社 三井東圧農薬株式会社