

種 類 名 (商品名)	剤 型	有 効 成 分 含 有 率	対 象 作物名	適 用 雑草名	適 用 地 域	適 用 土 壤	使 用 時 期	使用量 (/10a)	使 用 方 法	登録会社
MCPB・シメ トリン・モリ ネート除草剤 (つづき)							る土壤 処理と の体系 で使用]			
MCPB・シメ トリン・ベン チオカーブ除 草剤 〔クミリード〕 〔SM粒剤〕	粒 剤	2-メチル-4- クロルフェノキ シ酪酸エチル 0.8% 2-メチルチオ- 4,6-ビス(エ チルアミノ)- S-トリアジン 1.5% S-(4-クロル ベンジル)-N- N-ジエチルチ オカーバメート 10.0%	普通移 植水稻	ノビエ・ その他水 田1年生 雑草およ びマツバ イ・ウリ カワ。 〔北海道〕 〔を除く〕	全域の普 通期栽培 地帯およ び関東・ 東山の早 期栽培地 帯。	壤土へ 植土 〔減水深 2cm /日以下〕	田植後10 ~20日。 ノビエ の3葉 期まで。	kg 3~4	湛水散布 〔茎葉兼土壤 処理〕	クミアイ 化学工業 (株)
			稚苗移 植水稻	ノビエ・ その他水 田1年生 雑草およ びマツバ イ・ホタ ルイ・ウ リカワ。 〔北海道〕 〔を除く〕 ミズガヤ ツリ。 〔北海道〕 〔を除く〕	九州・南 四国を除 く全域の 普通期栽 培地帯。		田植後15 ~20日。 ノビエ の3葉 期まで、 但し寒 地は2 5葉期 まで。			

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和49年6月1日~2月29日

種 類 名 (商品名)	剤 型	有 効 成 分 含 有 率	対 象 作物名	使 用 目 的	適 用 場 所	使 用 時 期	希 釈 倍 数	使 用 方 法	登録会社
植物成長調整 剤 〔ビーエー液 剤〕	液 剤	6-(N-ベンジ ル)アミノプリ ン 3.0%	ぶとう 〔デラウ〕 エア- 〔種〕	花振り防 止。	ハウス栽 培の花振 い発果園。	満開予定 日の14 ~17日前。	(倍) 150~ 300 〔100~ 200 ppm〕	無種子化処理の 第1回ジベレリ ン処理液に添加 して蕾(果房) を浸漬処理する。	クミアイ 化学工業 (株)