

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和51年 3 月 1 日～52年 3 月 31 日

種 類 名	商 品 名	有 効 成 分 及 び 含 有 量	作物名	適 用 雑草名	使用時期	適 用 土 壌	使用量 (10a)	使用方法	適用地帯	登録会社
NIP除草剤	ハーブカット粒剤	2,4-ジクロル フェニル-4'- ニトロフェニル エーテル 7.0%	普通移 植水稻	ノビエ その他 水田一 年生雑 草及び マツバ イ	植代後, 田植前1 ～3日又 は田植後 から8日 (ノビエ 1葉期ま で)	砂壤土 から埴 土(極 端な漏 水田を 除く)	2～3 kg	湛水散布 土壌処理		三笠産業 (株)
			稚苗移 植水稻		植代後,田 植前1～ 3日又は 田植後4 ～7日(ノ ビエ1葉 期まで)					
石油除草剤	シルバゾール-K	芳香族炭化水素 15.0%	林 地	ク ズ	通 年		株径5 cm未満 は株当 り8～ 10cc, 株径5 cm以上 は径1 cm増す ごとに 1cc増 量	スポット 処 理		三菱石油 (株)
ONP・モ リネート除 草剤	オードラム M粒剤	2,4,6-トリク ロルフェノール -4'-ニトロフ ェニルエーテル 8.0% S-エチルヘ キサヒドロ-1 H-アゼピン- 1-カーボチオ エート 6.0%	普通移 植水稻	ノビエ その他 1年生 雑草及 びマツ バイ	移植後5 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	砂壤土 ～埴土 減水源 (2cm /日以下)	3～4 kg	湛水散布 (土壌処 理)	東海, 近 畿以西の 普通期栽 培地帯	八州化学 工業(株)
			稚苗移 植水稻		移植後5 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで)				北海道を 除く全域 の普通期 栽培地帯 及び関東 東山の早 期栽培地 帯	三笠化学 工業(株)
					移植直後 ～4日				九州, 南 四国の普 通期栽培 地帯	