

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適 用 作 物 (場所)	適 用 雑 草	使用時期	使用量 (／10a)	適用地帯	使用方法	適用 土壌	登録会社
ン・ベン タゾン除 草剤	粒剤	エノキシ酪酸 エチル 1.0% ● 2-メチルチ オ-4,6-ピ スエチルアミ ノ-S-トリ アジン 1.5% ● 3-イソプロ ピル-2,1,3 -ベンゾ-チ アジアジノン (4)-2,2- ジオキシド 7.0%			1年生 雑草, マツバ イ, ウ リカワ,	(ノビエ 2葉期 まで)		南四国の 暖地を除 く)の栽 培地帯。	〔土 壤 処 理〕	) 埴 土 (減 水 深 2cm ／ 日 以 下)	三 共。
					ノビエ 等水田 1年生 雑草, マツバ イ, ホ タルイ, ウリカ ワ, ミ ズガヤ ツリ,	移植後 15～25日 (ノビエ 2葉期ま で)。 〔移植前 後の初 期除草 剤によ る土壌 処理と の体系 で使用〕	3kg	東北以西 (九州, 南四国の 暖地を除 く)の普 通期栽培 地帯。	湛水散布 〔茎葉兼 土 壤 処 理〕		
					稚苗移 植水稲	ノビエ 等水田 1年生 雑草, マツバ イ, ホ タルイ, ウリカ ワ, ミ ズガヤ ツリ,	移植後 15～25日 〔ノビエ 2葉期 まで, 但し寒 冷地では移植 後20～ 25日, 稲5葉 期以降 ノビエ 2葉期 まで。〕	3kg	東北以西 (九州, 南四国の 暖地を除 く)の普 通期栽培 地帯, 関 東・東北 の早期栽 培地帯。	湛水散布 〔茎葉兼 土 壤 処 理〕	
					ヘラオ モダカ,			寒 冷 地			

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林省農蚕園芸局植物防疫課

昭和52年12月1日～53年3月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適用作物 (場所)	使用目的	希釈倍液	使用時期	使 用 量 (／10 a)	使用方法	登録会社
植物成長 調 整 剤	OMH-K	マレン酸ヒドラ ジッドカリウム	液剤	た ば こ	腋芽抑制	60倍	芯止期以 降		散 布	大塚化学 薬 品

種類名	商品名	有効成分の種類 及び含有量	剤型	適用作物 (場所)	適用雑草 使用目的	希釈倍数	使用時期	使用量 (/10a)	使用方法	登録会社
	OMH-K (つづき)	22.0%								
	ユゴーザ イA	硫酸オキシキノ リン 0.18%	ペース ト	桐、さくら	切口の愈 合促進		伐採又は 剪定直後 剪定直後	直径5cm の切口に 約2g.	本剤をそ のまま切 口に塗布 する。	富士薬品 工業(株)

一目瞭然 効きめが見える

水田多年生雑草防除に

バサゲラン^{*}粒剤 水和剤

適用雑草 ● ミズガヤツリ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・水田一年生広葉雑草

新発売

効きめと安全の信頼にこたえる



住友化学

東京都中央区日本橋2丁目7番9号

取扱メーカー

クミアイ化学・三共・サンケイ化学

日本農薬・北興化学・八洲化学

(アイワイエス殿)

^{*}は西ドイツBASF社の商標です。

編集後記

桜花舞い落ちて地にかえり、やがて淡緑に衣がえする。当誌も装いを新たにし、第12巻第1号を発刊する運びとなった。通巻120号となるが、飽きることなく、編集後記を書き続け、はや11星霜を経てしまった。4月は穀雨の季節で、低気圧が波状的に通過するために雨の降る日も多く、いままで休眠を続けていた雑草の種子も発芽しはじめる。発芽したばかりの雑草は、作物の生育を害することなく、枯野に緑を添えるので、飢えた心を慰めてくれる。雑草に対する研究が進み、一定の大きさまでにししか伸長しない、しかも圃場の栄養分吸収の少ない藻類のよ

うな雑草が育種されるならば、果樹の草生栽培などで活用されるであろう。

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

電話 東京(03)502-4188(代)

昭和53年4月発行

植調第12巻第1号

¥250(送料140)

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉沢長人

発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都港区愛宕1-2-2 全国農村教育協会内

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)436-3388番