

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和53年4月1日～7月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適用作物 (場所)	適 用 雑 草	適用 地帯	適 用 土 壤	使用時期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
CAT除 草剤	シマジン フロアブ ル	2-クロル-4, 6-ビス(エチ ルアミノ)-S -トリアジン 42%	水和 剤	芝 (和芝及 びティフ トン)	畑地一 年生雑 草			雑草発生 前	200～ 300cc 散布液 〔250l ～ 300l 散布〕	全面土壌 散布.	日本チバ ガイギー
ニトラリ ン除草剤	プラナビ アン微粒 剤	4-(メチルス ルフォニル)- 2,6-ジニトロ -N, N-ジプ ロピルアニリン 2.5%	粉粒 剤	キャベツ, トマト(露 地), きゅ うり(露 地)	畑地一 年生雑 草		砂土を 除く全 土壌	定 植 後 (雑草発 生前)	4～5 kg	土壌全面 に均一に 散布する.	シエル化 学, 北興 化学工業, サンケイ 化学, 三 共.
ダゾメッ ト剤	ガスター ド	3,5-ジメチル テトラヒドロ -2H-1,3,5- チアジアジン- 2-チオン	水和 剤	芝	畑地一 年生雑 草			雑草発生 前	目土用 土1m ³ 当り 100～ 150g	目土, 用 土に本剤 の所定量 を加えて 充分土壌 混和した 後, ビニ ールで7 ～10日被 覆処理す る.	北興化学 工業, 三 菱互斯化 学, 三新 化学工業, クミアイ 化学工業.
アミノブ ロホスメ チル除草 剤	トクノー ルM水和 剤	0-メチル-0 -(2-ニトロ -4-メチルフ ェニル)-N-イ ソプロピルホ スホロアミドチ オエート 60%	水和 剤	芝 (のしば, こうらい しば, テ ィフトン)	メヒシ バ, ス ズメノ カタビ ラなど の一年 生畑地 雑草, (キク 科雑草 を除く)			春期又は 秋期の雑 草発生前	500～ 1000g 散布液 〔250 ～ 300l〕	散布(土 壌処理).	日本特殊 農薬製造.
メチルダ イムロン 除草剤	スタッカ ー水和剤	1-(α, α- ジメチルベン ジル)-3-メチ	水和 剤	芝 (こうら いしば,	ハマス ゲ, ヒ メクグ			春期雑草 発生前	1,000 ～ 2,000 g	土壌全面 散布.	昭和電工.

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤型	適用作物 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
メチルダ イムロン (つづき)		ル-3-フェニ ル尿素 50.0%		ひめこう らいしば、 のしば、 ティフト ン)	等のカ ヤツリ グサ科 雑草及 びイネ 科畑地 雑草、				散布液 [200~ 300l]		
					スズメ ノカタ ビラな どの冬 生畑地 雑草、			秋期雑草 発生前	500~ 1,000 g 散布液 [200~ 300l]		
I P C ・ T C T P 除草剤	ダクリー ン水和剤	イソプロピル- N-(3-クロ ルフェニル) カ ーバメート 12.5% 2,3,5,6-テト ラクロルフタル 酸ジメチル 55.0%	水和 剤	芝 (こうら いしば、 のしば)	イネ科 一年生 畑地雑 草、		洪積、 火山灰 土壌	雑草発生 前	2~3 kg 散布液 (300l)	土壌処理 全面散布、	キング化 学工業、

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和53年4月1日～7月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤型	適用作物 (場所)	使用目的	使 用 量	使用液量	使用時期	使用方法	登録会社
植物成長 調 整 剤	ヘルポス	6-(N-ベン ジル) アミノプ リン 0.5%	ペー スト 塗布 剤	ば ら	腋芽の萌 芽促進	1芽当り 約 100 mg		春期又は 秋期	ペーサル シュート の基部の 腋芽の上 下5mmの ところに 傷をつけ、 塗布する、	(株) 興人
				洋 ラ ン (デンド ロビウム)	高芽の形 成促進剤	さし穂1 本当り約 100mg		春期(3 月～5月)	バルブを 2節づつ 切った挿 し穂の上 部切口に 塗布する、	