

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤型	適用作物 (場所)	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	使用量 (10 a 当り)	使用方法	登録会社
メチルダ イムロン (つづき)		ル-3-フェニ ル尿素 50.0%		ひめこう らいしば、 のしば、 ティフト ン)	等のカ ヤツリ グサ科 雑草及 びイネ 科畑地 雑草、				散布液 [200~ 300l]		
					スズメ ノカタ ビラな どの冬 生畑地 雑草、			秋期雑草 発生前	500~ 1,000 g 散布液 [200~ 300l]		
I P C ・ T C T P 除草剤	ダクリー ン水和剤	イソプロピル- N-(3-クロ ルフェニル) カ ーバメート 12.5% 2,3,5,6-テト ラクロルフタル 酸ジメチル 55.0%	水和 剤	芝 (こうら いしば、 のしば)	イネ科 一年生 畑地雑 草、		洪積、 火山灰 土壌	雑草発生 前	2~3 kg 散布液 (300l)	土壌処理 全面散布、	キング化 学工業、

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和53年4月1日～7月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤型	適用作物 (場所)	使用目的	使 用 量	使用液量	使用時期	使用方法	登録会社
植物成長 調 整 剤	ヘルポス	6-(N-ベン ジル) アミノプ リン 0.5%	ペー スト 塗布 剤	ば ら	腋芽の萌 芽促進	1芽当り 約 100 mg		春期又は 秋期	ペーサル シュート の基部の 腋芽の上 下5mmの ところに 傷をつけ、 塗布する、	(株) 興人
				洋 ラ ン (デンド ロビウム)	高芽の形 成促進剤	さし穂1 本当り約 100mg		春期(3 月～5月)	バルブを 2節づつ 切った挿 し穂の上 部切口に 塗布する、	

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 及 び 含 有 量	剤 型	適用作物 (場所)	使用目的	使 用 量	使用液量	使用時期	使用方法	登録会社
植物成長 調 整 剤 (つづき)	スリト ー ン	α -シクロプロ ピル- α (4- メトキシフェニ ル)-5-ピリ ミジンメタノー ル 0.0025%	液剤	き く (ポット マム)	節間の伸 長抑制 (矮化)	1~2cc /5号鉢	5~10cc /5号鉢	摘芯2週 間後	茎葉散布	武田薬品 工 業
							75cc/5 号鉢		土壌灌注	
							5~10cc /5号鉢	鉢あげ2 週間後	茎葉散布	
							75cc/5 号鉢		土壌灌注	
						3~4cc /5号鉢	75cc/5 号鉢	生育初期 (草丈5 cm以内)	生育初期 に土壌灌 注し出蕾	
									期に更に 茎葉散布 する、	
						1~2cc /5号鉢	5~10cc 4~5号 鉢	出 蕾 期		
				ゆ り (かのこ ゆり)		1~2cc /5号鉢	75cc/4 ~5号鉢	生育初期 (草丈5 cm以内)	摘 芯 後 1ヶ月以内	土壌灌注
				ゆ り 「てっぼう」 ゆり すかしゆり		1~2cc /5号鉢	75cc/4 ~5号鉢	生育初期 (草丈3 ~5cm)		
				ポインセ チア		1~2cc /5号鉢	75cc/4 ~5号鉢	摘 芯 後 1ヶ月以内		
				チューリップ		1~2cc /5号鉢	75cc/4 ~5号鉢	生育初期 (草丈3 ~5cm)		

植調第11巻第11号の訂正ならびに追補について

昭和52年度水稻作関係除草剤試験成績概要(25~47頁)の報告のうち、一部に誤脱がありましたので、下記の通り訂正させていただきますので、よろしくお願いします。

- ① 第1表 昭和52年度水稻作関係除草剤適用性試験結果判定表(26~27頁)のうち、Ⅱ-2. 稚苗移植前後土壌処理の「実および継」判定薬剤のうち X-52・B粒をX-52・B⑩粒と訂正する。
- ② 第2表 昭和52年度水稻作関係実用化除草剤使用基準一覧表(27~47頁)のうち、Ⅱ-2. 稚苗・移植前後土壌処理 22) ブタクロール粒(31頁)の寒冷地の処理時期 +3~+10 (ノビエ3Lまで)を+3~+10 (ノビエ1.5Lまで)に訂正する。
- ③ 第2表 昭和52年度水稻作関係実用化除草剤使用基準一覧表(27~47頁)のうち、Ⅱ-5. 稚苗・適用時期拡大 17) モリネート・SM粒剤(37~38頁)の適用地域・適用草種に、次のように追補する。

適 用 地 域	適 用 草 種
暖地の普通期	一年生雑草、マツバイ、ウリカワ、ミズガヤツリ。
暖地の早期	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ。