

種 類 名	商 品 名	有効成分の 種類および 含 有 量	剤 型	適用作物 (場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 (10a当 り)	使用方法	登録会社
MCC・ MCPB 除草剤 (つづき)		② 2-メチル -4-クロ ルフェノ キシ酸エチ ル 0.9%				地帯(但 し九州、 南四国を 除く)。	深 2 cm以下				
			稚苗移植 水稻			東北、北 陸以北。	壤土～埴 土 [減水 深 2 cm以下]	移植後25 ～30日(ノ ビエ2 葉期まで) [移植前 後初期 除草剤 による 土壌処 理との 体系で 使用。]	3～4kg		

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和54年8月1日～10月31日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用方法	登 録 会 社
植物成長 調 整 剤	ミドリナ ール	アルキルポリオ キシエチレンア ルコール	粘稠 液体	杉 苗	蒸散抑制 による植 え傷み防 止。	移植時(掘 りとり前) 移植時(掘 りとり後)	10～20倍	苗の地上部 全体に均一 に散布する。 苗の地上部 又は全体を 浸漬する。	東邦千葉化学 工業(株)

調節剤試験成績検討会

植 調 協 会 だ よ り

日時：昭和54年12月6日(木)～7日(金)，
10:00～17:00

◎ 会議開催日程のお知らせ

- 昭和54年度春夏作芝生関係除草剤・生育調節
剤試験成績検討会

日時：昭和54年12月4日(火)，9:30～17:00

場所：虎ノ門第17森ビル第5会議室(東京
都港区虎ノ門1-26-5，TEL. 03-
591-1315)

- 昭和54年度春夏作野菜花き関係除草剤・生育

場所：東京トラック事業健康保険組合「健
保会館」5階大会議室(東京都千代
田区四番町5-7，TEL. 03-264-
2361)

- 昭和54年度水稻畑作関係除草剤・生育調節剤
試験成績中央検討会

日時：昭和54年12月11日(火)～14日(金)，
9:30～17:00

実力ある 水田中期除草剤



●水田の中期除草に

アビロサンはスイス国、チノヴァイギー・リミテッドの登録商標

アビロサン[®]粒剤

●広範囲の水田雑草に効果がきわめて優れた、実力のある中期除草剤です。

●水田雑草の総合防除に

ワイダー[®]粒剤

●1年生雑草と多年生雑草を同時に防除できる、水田雑草の総合防除剤です。

*アビロサン粒剤・ワイダー粒剤
ともに、低温時に使用しても薬
害の心配がなく安全です。

場所：日本都市センター大講堂，第一会議
室（東京都千代田区平河町2-4-
1，TEL. 03-265-8211）

●昭和54年度桑園関係除草剤・生育調節剤試験
成績検討会

日時：昭和54年12月21日（金），10:00～17:00

場所：国立教育会館5階中会議室（東京都
千代田区霞が関3-2-3，TEL. 03-
580-1251）

●第38回役員会

日時：昭和54年12月20日（木），14:00～16:00

場所：三井東圧化学（株）10階大会議室

編集後記

そろそろ冬を迎えるというのに，11月5日に
東京で25.2℃という暑さ……そのためか野山の
紅葉がおくれ，晩秋という感がない。しかし，
多年生雑草の野びるなどは，緑の芝生の下から
顔を出し，冬を告げている。この野びるを退治
するには，芝生をはがし，地下の鱗茎を取り除
かねばならないが，春にならなければそれもな
らず，薬剤による防除に頼らざるを得ない。芝
草の休眠期に茎葉処理剤を散布するのが得策だ。

財団法人 日本植物調節剤研究協会
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
電話 東京（03）502-4188（代）

昭和54年11月発行

植調第13巻第8号

¥250（送料140）

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉沢長人
発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都港区愛宕1-2-2 全国農村教育協会内
発行所 植調編集印刷事務所
電話 東京（03）436-3388番