

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧


農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和55年10月1日～56年3月31日

種類名	商品名	有効成分の種類・含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数 〔10アール当 り散布液量〕	希釈倍数	適用場所	使用方法	登録会社
植物成長調整剤	ビーエー乳剤	6-（N-ペ ンジルアミノ） プリン …… 3.0%	乳 剤	ブドウ （デラウ エア種）	花振り防 止	満開予定 日の14～ 17日前		150～ 300倍 〔100～ 200 ppm〕	ハウス 栽培の 花振り 発生園	無種子 化処理 の第1 回ジベ レリン 処理液 に添加 して蕾 （果房） を浸漬 処理す る	クミ アイ化 学工業 （株）
					無種子化 処理の第 1回ジベ レリン処 理時期の 早期への 拡大			300倍 〔100 ppm〕			
同 上	ジベレ リン協 和ペー スト	ジベレリン …… 2.7%	ペ ー ス ト	日本ナシ 〔幸水・ 新水・ 八雲・ 豊水〕	熟期促進	満開30～ 40日後	20～30 mg/1果			果梗部 塗布	協和醃 酵工業 （株）
同 上	フィガ ロン乳 剤	5-クロロ- 3（1H）-イ ンダゾリル酢 酸エチル …… 20.0%	乳 剤	温州ミカ ン	全 摘 果	満開10～ 20日後の 生理落果 最盛期	1回〔葉先か らしたたり落 ちない程度〕	1,000倍		摘果し たい部 分に散 布	日産化 学工業 （株）
					間引摘果	満開35～ 50日後で 果径20～ 25mmの 時期	1回〔250～ 300 l〕	1,000～ 2,000倍		立木全 面散布	
					熟期促進	間引：1回目 摘果用として 使用（満開 35～50 日後）、 2回目：満開 70～80 日後	2回〔250～ 300 l〕	1回目： 1,000～ 2,000倍 2回目： 2,000～ 3,000倍		立木全 面散布	

種類名	商品名	有効成分の種類・含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数 10アール当り 散布液量	希釈倍数	適用 場所	使用 方法	登録 会社
植物成長調整剤 (つづき)	フィガロン乳剤 (つづき)					熟期促進だけに使用する場合 1回目：満開 50～60日後、 2回目：満開 70～80日後	2回〔250～300 l〕	2,000～3,000倍			
同 上	フィガロン乳剤「フジサワ」	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	藤沢薬品工業(株)

適期防除で確かな効果！



アビロサン・ワイダー普及会

武田薬品・日本デバガイギー
石原産業・BASFジャパン

●水田の中期除草に

アビロサン[®]粒剤

アビロサンはスイス国、チバガイギー・リミテッドの登録商標

- ヒエなどの1年生雑草はもちろん、ヘラオモダカ・ヒルムシロなどの多年生雑草に対して抜群の効果があります。
- 相性の良い初期除草剤との体系処理により、ホタルイ・ミズガヤツリを経済的に防除できます。

●水田雑草の総合防除に

ワイダー[®]粒剤

- ヒエなどの1年生雑草はもとより、ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロなどの多年生雑草までも同時に防除できる、水田雑草の総合防除剤です。

＊アビロサン粒剤・ワイダー粒剤ともに、低温時に使用しても薬害の心配がなく安全です。

1981年 国際柑橘学会議の開催について

標記学会(1981 International Citrus Congress)が日本学術会議・園芸学会・国際柑橘学会日本支部・財団法人日本植物調節剤研究協会主催により昭和56年11月9日より12日の4日間、経団連会館(東京都千代田区大手町1-9-4)において開催される。