

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和56年4月1日～7月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名(場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10a 当り〕	使用方法	登 録 会 社
CNP・ ダイヤモンド ロン除草剤	ショウ ロンM 粒剤- 12	2,4,6-トリクロ ロルフェニル- 4-ニトロフェ ニルエーテル ……12.0% 1-(α , α -ジメ チルベンジル) -3-(パラニト リル)尿素 ……7.0%	粒 剤	普通移植 水稻	ノビエそ の他の水 田一年生 雑草およ びマツバ イ・ホタ ルイ	全域の普 通期およ び早期栽 培地帯	壤土～ 埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	植代後田 植前3日 ～田植後 7日 〔ノビエ の1葉期 まで、 ホタル イ・ク ログワ イは発 生始ま で〕	3～4 kg	湛水散布 (土壌処 理)	三井東 洋化学 (株), 昭和電 工(株)
				稚苗移植 水稻	クログワ イ 〔関東東 山以西, 但し九 州・南 四国を 除く〕						
ピラゾ レート 除草剤	サンバ ード粒 剤	4-(2,4-ジク ロロベンゾイル) -1,3-ジメチル -5-ピラゾリ ル-p-トルエ ンスルホネート ……10.0%	粒 剤	稚苗移植 水稻	ノビエ等 水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ヘラオモ ダカ	北 海 道	壤土～ 埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	植代後田 植前3日 ～田植後 7日 〔ノビエ 1葉期 まで、 但し近 畿以西 ではノ ビエ1.5 葉期ま で〕	3～4 kg	湛水のま ま手まき あるいは 散粒機で 水面に均 一に散布 する	九州三 共(株)
					ノビエ等 水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ウリカワ ・ミズガ ヤツリ						
				湛水直播 水稻	ノビエ等 水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ウリカワ	関東、東 海～東北 南部 近畿以西	壤土～ 埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	は種直後 ～は種後 3日 は種前3 日～は種 後3日	3 kg 3～4 kg		

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名(場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当り〕	使用方法	登 録 会 社
マレイン酸ヒ ドラジ ド除草 剤	ヒロバ トール 液剤	マレイン酸ヒド ラジドコリン …… 58.0 %	液 剤	牧野草地 (開こん 地)	ギシギシ, エゾノギ シギシ			秋 季	750 ~ 1,500 m ^l 〔散布 液量 75 ~ 150 l〕	雑草の茎 葉に散布 し、散布 5 ~ 10日 後に刈払 いなどに よって地 上部を除 去する	三菱瓦 斯化学 (株), 保土谷 化学工 業(株), 石原産 業(株)
クロル フタリ ム除草 剤	ダイヤ メート 水和剤	N-(4-クロロ フェニル)-1- シクロヘキセン -1,2-ジカル ボキシミド …… 50.0 %	水 和 剤	芝 〔コウラ イシバ〕	畑地一年 生雑草			春季雑草 発生前	400 ~ 600 g 〔散布 液量 300 l〕	土壌全面 散布	三菱化 成工業 (株), 富士グ リーン (株)
								秋季雑草 発生前	600 g 〔散布 液量 300 l〕		
ブタク ロール 除草剤	マーシ ェット 乳剤	2-クロロール-2, 6-ジエチル- N-(ブトキシメ チル)アセトアニ リド …… 32.0 %	乳 剤	稚苗移植 水稻	ノビエ等 水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ヘラオモ ダカ(北 海道)	関東・東 海以北の 普通期栽 培地帯	壤土~ 埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	植代直後 〔田植前 4 ~ 3 日〕	450 ~ 500 m ^l	原液のま ま湛水散 布	日本モ ンサン ト(株)
					ノビエ等 水田一年 生雑草お よびマツ バイ	近畿以西 の普通期 栽培地帯			350 ~ 500 m ^l		
ブタミ ホス除 草剤	クレマ ートU 粒剤	0-エチル-0 -(3-メチル- 6-ニトロフェ ニル)セコンダリ -ブチルホスホ ロアミドチオエ ート …… 3.0 %	粒 剤	桑	畑地一年 生雑草(キ ク科を除 く)			春季桑発 芽前およ び夏切後 〔雑草発 生前〕		土壌全面 散布	住友化 学工業 (株), 北興化 学工業 (株), 山本農 薬(株), 中外製 薬(株), 日本農 薬(株),

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名(場所)	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当り〕	使用方法	登 録 会 社
ブタミ ホス除 草剤 (つづき)											サンケ イ化学 (株)

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和56年4月1日～7月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用量	使用方法	登録会社
植物成 長調整 剤	ブトッ クス乳 剤	ピペロニルブト キサイド …… 54.0 %	液 剤	た ば こ	オゾンタイ プの光化学 オキシダントによる障 害(生理的 斑点病)の 防止		600倍		開花期頃 から7～ 10日間隔 で1株当 り50m ^l を下位葉 に散布す る。	高砂香料 工業(株)
	塗布用 ビーエ ー	6-(N-ベンジ ルアミノ)プリン …… 1.0 %	液 剤	す い か	着果促進	開花当日	原 液	100果 当 り	果梗部に 塗布	クミアイ 化学工業 (株)
				メ ロ ン	着果促進	開花当日 ～開花翌 日	原 液	1m ^l /		

植調第15巻第4号19頁の写真説明の訂正について

頁	摘 要	誤	正
19	写 真 説 明 〔アメリカオニア ザミの発生生態 と防除法〕	写真 1. 当年発芽したものと、右側に倒 伏しているのは前年開花して枯 死。白いの冠毛である。 (1979. 6. 8. 佐呂間町)	写真 1. 越年後起生してロゼットを形成 する前のもの。 (1980. 5. 15. 佐呂間町)
		写真 2. 越年後起生してロゼットを形成 する前のもの。 (1980. 5. 15. 佐呂間町)	写真 2. 当年発芽したものと、右側に倒 伏しているのは前年開花して枯 死。白いの冠毛である。 (1979. 6. 8. 佐呂間町)

1981年 国際柑橘学会議の開催について

標記学会(1981 International Citrus Congress)が日本学術会議・園芸学会・国際柑橘学会日本支部・財団法人日本植物調節剤研究協会主催により昭和56年11月9日より12日の4日間、経団連会館(東京都千代田区大手町1-9-4)において開催される。