

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適 用 作物名 (場所)	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	使用量 〔10a 当り〕	使用方法	登録会社
ビフェ ノック ス除草 剤 (つぎ)						除く) および 関東・ 東海の 早期栽 培地帯					
				稚苗移 植水稻	ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ ・ホタル イ・ヘラ オモダカ	全域(九 州・南 四国な どの暖 地を除 く)の 普通期 および 早期栽 培地帯		移植前3 日～移植 後8日 〔但し寒 冷地は 移植前 7日～ 移植後 8日、 ノビエ 1葉期 まで〕	3～4 kg		
					ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ	九州・ 南四国 などの 暖地の 普通期 栽培地 帯					

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和56年8月1日～11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物名	使用目的	使用時期	希釈倍数	使用量	使用方法	登録会社
植物成 長調整 剤	アトリ ナール	ナトリウム-2, 3,4,6-ジ- <i>o</i> - -イソプロピリ デン- <i>a</i> - <i>L</i> - キシロー2-ヘ クスロフラン ナート ……18.0%	液 剤	つ つ じ 〔クルメツ ツジ, ヒ ラドツツ ジ〕	分枝数増 加	新梢伸長 初期	30～50倍	250 <i>l</i>	茎葉全面 散布	日本ロッ シュ(株), 三共(株)
				つ つ じ 〔アザレア〕			60～100 倍			
				いぬつげ	摘 果	開 花 期	100～ 200倍			
				かいづかい ぶき, さわ ら, いばた のき, アベ リア	新梢の伸 長抑制	新梢伸長 初期	100倍			