

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和56年12月1日～昭和57年1月31日


種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当たり〕	使用方法	登録会社
ベン デ ィ メ タ リ ン 除 草 剤	ウエイ アップ 水和剤 50	N-(1-エチル プロピル)-3,4 -ジメチル-2, 6-ジニトロア ニリン ……50%	水 和 剤	日本芝 〔こ う ら い し ば〕	畑地一年 生雑草, 〔キク科〕 雑草を 〔除く〕			雑草発生 前	500 ～ 1000 g 〔散布 液量 200 ～ 300 l〕	全面土壌 散布	日本サイ アナミッ ド(株), クミアイ 化学工業 (株)
ベンチ オカー ブ・C NP・ メトキ シフェ ノン除 草剤	ケイサ ターン M粒剤	S-(4-クロル ベンジル)-N,N -ジエチルチオ カーバメート ……7.0% 2,4,6-トリクロ ルフェニル-4 -ニトロフェニ ルエーテル ……6.0% 3,3'-ジメチル -4-メトキシ -ベンゾフェノ ン……2.0%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエ, その他水 田一年生 雑草およ びマツバ イ.	北海道を 除く全域 の普通期 および早 期栽培地 帯.	砂壤土 ～埴土 〔極端な 漏水田〕 を〔除く〕	移植後3 ～10日, (雑草発 生前～ノ ビエ1.5葉 期まで)	3～4 kg	湛水散布 〔土壌処 理〕	クミアイ 化学工業 (株).
ベンチ オカー ブ・シ メトリ ン・メ トキシ フェノ ン除草 剤	ケイサ ターン S粒剤	S-(4-クロル ベンジル)-N,N -ジエチルチオ カーバメート ……7.0% 2-メチルチオ -4,6-ビス(エ チルアミノ)-s -トリアジン ……1.5% 3,3'-ジメチル -4-メトキシ -ベンゾフェノ ン……2.0%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエ, その他水 田一年生 雑草およ びマツバ イ.	全域の普 通期およ び早期裁 培地帯.	砂壤土 ～埴土 〔漏水田〕 を〔除く〕	移植後7 ～15日 (ノビエ 2.5葉期 まで). 移植後15 ～25日 (ノビエ 2.5葉期 まで). 〔移植前 後の初期 除草剤で の土壌処 理との体 系で使 用〕	3～4 kg	湛水散布 〔茎葉兼 土壌処 理〕	クミアイ 化学工業 (株).

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 10 a 当り	使用方法	登録会社
ベンチ オカー ブ・シ メトリ ン・メ トキシ フェノ ン除草 剤 (つぎ)				稚苗移 植水稻		全域の普 通期およ び早期裁 培地帯。	壤土 ～埴土 〔漏水田 を除く〕	移植後8 ～15日 (ノビエ 2.5葉 期, 但 し寒地 は2葉 期まで)	3 kg		
							砂壤土 ～埴土 〔漏水田 を除く〕	移植後15 ～25日 (ノビエ 2葉期ま で) 〔移植前 後の初期 除草剤で の土壌処 理との体 系で使用 〕	3 kg		
MCP B・シ メトリ ン・ベ ンチオ カーブ ・メト キシフ ェノン 除草剤	ケイク ミリー ドSM 粒剤	2-メチル-4 -クロルフェノ キシ酪酸エチル ……0.8% 2-メチルチオ -4,6-ビス(エ チルアミノ)-s -トリアジン ……1.5% S-(4-クロル ベンジル)-N,N -ジエチルチオ カーバメート ……10.0% 3,3'-ジメチル -4-メトキシ -ベンゾフェノ ン ……3.0%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエそ の他一年 生雑草お よびマツ バイ・ウ リカワ・ ホタルイ ・ミズガ ヤツリ	全域の普 通期栽培 地帯およ び関東・ 東海の早 期栽培地 帯。	壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	移植後10 ～20日, (ノビエ の3葉期 まで。但 し, 暖地 は3.5葉 期まで)。	3～4 kg	湛水散布 〔茎葉兼 土壌処 理〕	クミアイ 化学工業 (株)
				稚苗移 植水稻	〔九州・ 南四国 を除く〕 ヘラオモ ダカ 〔関東・ 東海以 北〕	東海・北 陸以北の 普通期裁 培地帯お よび関東 ・東海の 早期栽培 地帯。		移植後15 ～20日, (ノビエ の3葉期 まで。但 し, 寒地 は2.5葉 期まで)。 〔移植後 の初期 除草剤に よる土 壌処 理〕			
								移植後20 ～30日, (ノビエ の3葉期 まで。但 し, 寒地 は2.5葉 期まで)。 〔移植後 の初期 除草剤に よる土 壌処 理〕			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当り〕	使用方法	登録会社
MCP B・シ メトリ ン・ベ ンチオ カーブ ・メト キシフ ェノン 除草剤 (つづき)								理との 体系で 使用			
						近畿以西 の普通期 栽培地帯		移植後20 ～25日、 (ノビエ の3葉期 まで)、 〔移植前 後の初期 除草剤に よる土壌 処理との 体系で 使用〕			
ホサミ ンアン モニウム 除草剤	クレナ イト液 剤	カルバモイルホ スホン酸エチル アンモニウム ……41.0%	液 剤	造林地 (地ご しらえ)	落葉雑か ん木			8月～落 葉1カ月 前まで、	1.0 l 〔散布 液量 100 l〕	茎葉散布	デュポン ・ファー イースト 日本支社

農薬は正しく使って、適正な保管管理をして下さい。

実力ある 水田中期除草剤



●水田の中期除草に アピロサンはスイス国、チバガイギー・リミテッドの登録商標

アピロサン®粒剤

●広範囲の水田雑草に効果がきわめて優れた、実力のある中期除草剤です。

●水田雑草の総合防除に

ワイダー®粒剤

●1年生雑草と多年生雑草を同時に防除できる、水田雑草の総合防除剤です。

※アピロサン粒剤・ワイダー粒剤ともに、低温時に使用しても薬害の心配がなく安全です。