

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和 57 年 2 月 1 日 ～ 5 月 31 日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適 用 地 帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10a 当り〕	使 用 方 法	登録会社
ピラゾ レート ・ブタ クロール 粒剤	クサカ リン粒 剤35	4-(2,4-ジクロロベンゾイル) 1,3-ジメチル -5-ピラゾリ ル-p-ートルエ ンスルホネート …… 8% 2-クロル-2, 6-ジエチル-N-(ブトキシメ チル)アセトアニ リド …… 3.5%	粒 剤	稚苗移 植水稻	ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ, ホタルイ, ヘラオモ ダカ, ヒ ルムシロ.	北海道.	壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	植代後～ 移植前3 日または 移植後3 ～10日. 〔ノビエ 1.5葉 期まで〕	3 kg	湛水散 布 〔土壌 処理〕	三共(株), 北海三共 (株), 日 本モンサ ント(株)
					ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ, ホタルイ, ウリカワ, ヘラオモ ダカ, ヒ ルムシロ, ミズガヤ ツリ.	東海, 北陸以 北の普 通期裁 培地帯.	砂壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕				
					ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ, ホタルイ, ウリカワ, ヒルムシ ロ, ミズ ガヤツリ.	近畿以 西の普 通期裁 培地帯.		移植後3 ～10日. 〔ノビエ 2葉期 まで〕			
ナプロ アニリ ド・ベ ンチオ カーブ 粒剤	グラノ ック粒 剤	α-(2-ナフト キシ)プロピオン アニリド …… 10% S-(4-クロル ベンジル)-N,N- ジエチルチオ カーバメート …… 7.0%	粒 剤	普通移 植水稻	ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ, ホタルイ, ウリカワ.	全域の 普通期 栽培地 帯およ び関東 ・東海 の早期 栽培地 帯.	砂壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	移植後2 ～15日. 〔ノビエ 2葉期 まで〕	3 kg	湛水散 布 〔茎葉 兼土 壌処 理〕	クミアイ 化学工業 (株), 三 井東圧化 学(株).
				稚苗移 植水稻	ノビエそ の他水田	全域の 普通期					

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適 用 地 帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当り〕	使 用 方 法	登録会社
ナプロ アニリ ド・ベ ンチオ カーブ 粒剤 (つづき)					一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ、 ウリカワ。 ヘラオモ ダカ。 〔東北、 北陸以 北〕 ミズガヤ ツリ。 〔北海道 除く〕	栽培地 帯およ び関東 以西の 早期栽 培地帯。					
					ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ、 ウリカワ。 ヘラオモ ダカ。 〔東北、 北陸以 北〕 オモダカ、 ミズガヤ ツリ。 〔関東、 東山、 東海。〕	全域の 普通期 栽培地 帯（九 州、南 四国な どの暖 地を除 く）お よび関 東、東 海の早 期栽培 地帯。	壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	移植後15 ～20日。 〔ノビエ 2葉期 まで。 但し、 寒地は 1.5葉 期まで〕 〔移植前 後の初 期除草 剤によ る土壌 処理と の体系 で使用〕			
ナプロ アニリ ド・ブ タクロ ール粒 剤	オーザ 粒剤	α-(2-ナフト キシ)プロピオン アニリド ……7.0% 2-クロロ-2, 6-ジエチル- N-(ブトキシメ チル)アセトアニ リド ……3.5%	粒 剤	稚苗移 植水稻	ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ、 ヘラオモ ダカ。	北海道。	壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	移植後3 ～10日。 〔ノビエ 1.5葉 期まで〕	3～4 kg	湛水散 布 〔土壌 処理〕	三井東圧 化学(株)、 日本モン サント(株)
					ノビエそ の他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ、 ウリカワ、 ヘラオモ ダカ、ミ	東海・ 北陸以 北の普 通期お よび早 期栽培 地帯。					

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適 用 地 帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10 a 当り〕	使 用 方 法	登録会社
ナプロ アニリ ド・ブタ クロール 粒剤 (つづき)					ズガヤツ リ。						
					ノビエ その他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ、 ウリカワ、 ミズガヤ ツリ。	近畿以 西の普 通期裁 培地帯。					
オキサ ジアゾ ン・ナ プロア ニリド 粒剤	ストッ プラン 粒剤	5-ターシャリ -ブチル-3- (2,4-ジクロル -5-イソプロ ポキシフェニル) -1,3,4-オキ サジアゾリン- 2-オン …… 1.5 % α-(2-ナフト キシ)プロピオン アニリド …… 10.0 %	粒 剤	稚苗移 植水稻	ノビエ その他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ウリカワ、 ホタルイ。	全域の 普通期 栽培地 帯(北 海道お よび九 州・南 四国な どの暖 地を除 く)お よび関 東・東 海の早 期栽培 地帯。	壤土 ～埴土 〔減水深 1.5cm /日以 下〕	移植後3 ～7日。 〔ノビエ 1葉期 まで〕	3～4 kg	湛水散 布 〔土壌 処理〕	昭和ロー ディア化 学(株)、 三井東圧 化学(株)、 日産化学 工業(株)。
					ノビエ その他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ウリカワ。	九州・ 南四国 などの 暖地の 普通期 栽培地 帯。					
ベンチ オカー ブ・メ トキシ フェノ ン粒剤	クリー ンカー ブ粒剤	S-(4-クロル ベンジル)-N,N -ジエチルチオ カーバメート …… 5.0 % 3,3'-ジメチル -4-メトキシ ベンゾフェノン …… 6.0 %	粒 剤	稚苗移 植水稻	ノビエ その他水田 一年生雑 草および マツバイ、 ホタルイ。	東北・ 北陸。	壤土 ～埴土 〔減水深 2cm/ 日以下〕	移植前3 ～移植後 10日。 〔ノビエ 2葉期 まで〕	3～4 kg	湛水散 布 〔土壌 処理〕	日本化薬 (株)、ク ミアイ化 学工業(株)。
					ノビエ その他水田 一年生雑 草および マツバイ。	関東・ 東山・ 東海の 普通期 および 早期裁 培地帯。		移植直後 ～移植後 10日。 〔ノビエ 2葉期 まで〕			
						近畿以 西の普 通期裁	壤土 埴土 〔減水深〕	移植後2 ～7日。 〔ノビエ〕			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適 用 作物名	適用雑草	適 用 地 帯	適用土壌	使用時期	使用量 〔10a 当り〕	使 用 方 法	登録会社
ベンチ オカー ブ・メ トキシ フェノ ン粒剤 (つづき)						培地帯、	1.5cm ／日以 下、	〔2葉期〕 まで			

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和57年2月1日～6月10日

種 類 名	商 品 名	有効成分の種 類・含有量	剤 型	適用作物	使 用 目 的	使用時期	使用 回数	希 積 倍 数	10アール 当り 散布液量	使 用 方 法	登録会社
ジクロル ブロッ 液剤	ストップ ール液剤	トリエタノー ルアミン＝2 －(2,4-ジク ロロフェノキ シ)プロピオン 酸塩 ……4.5%	液 剤	りんご 〔つがる デリシ ャス系〕	収穫前 落果防 止、	収穫開始 予定日の 25日前、	1回	1,000 ～ 1,500 倍	300～ 600 l	立木全 面散布	長瀬産業 (株), 日 産化学工 業(株), 三笠産業 (株)。
MCPB 乳剤	マデック	2-メチル- 4-クロロフ ェノキシ酢酸 エチル ……20.0%	乳 剤	りんご 〔デリシ ャス系〕	収穫前 落果防 止、	収穫開始 予定日の 25日およ び15日前、	2回	6,000 倍	300～ 600 l	立木全 面散布	兼商化学 工業(株)。
				日本なし		収穫開始 予定日の 7日前、	1回		200～ 300 l		

・1982年版・

除草剤・生育調節剤使用基準

■編集／(財)日本植物調節剤研究協会 ■発行／植調編集印刷事務所(全国農村教育協会内)

B5判／704頁／定価8,000円(送料350円)

1978年版発行以来4年が経過し、その間登録除草剤や都道府県の使用基準も大幅に変わりました。本書は、1982年2月現在登録されている除草剤・生育調節剤について、その登録内容・作用特性・理化学的性状を解説するとともに、各都道府県別の採用状況とその使用基準および注意事項を紹介しました。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) ☎03(833)1821 振替・東京1-97736