

区 分	薬 剤 名	処理法	処理時期	使 用 量	適用土壌	適用地帯	使 用 上 の 注 意
(4) 水稲刈跡	グリホサート 液 (つづき)		水稲刈取後、 セリ生育期.	33～50 m/a 〔150～100〕 倍液を 5 l /a 散布.	全 土 壌	温暖地.	1) 茎葉によく附着する ように散布する。 2) 対象雑草：セリ.
	MW-801 液	茎葉処理	水稲刈取後、 ミズガヤツ リ塊茎形成 始期まで (9月下旬 まで).	m/a 100～150	全 土 壌	温暖地東部 ・暖地の早 期栽培.	1) 茎葉によく附着する ように散布する。 2) 対象雑草：ミズガヤ ツリ.

第 3 表 昭和 56 年度冬作関係実用化生育調節剤使用基準一覧表

区 分	薬 剤 名	処理法	処理時期	使 用 量	適用土壌	適用地帯	使用上の注意・目的
(1) 小 麦	C C C 液	茎葉処理	出穂前20～ 10日.	50 m/a	全 土 壌	寒地（秋播 小麦）.	倒伏軽減効果.

注 1) アンダーライン(実線)は本年度拡大、追加された部分。なお、薬剤名のアンダーラインは本年度はじめて使用基準の作成されたものである。

注 2) アンダーライン(点線)はその一部が拡大されたもの。

昭和54年度非農耕地用 除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和57年7月29日、農林水産省農薬検査所では、「除草剤（いわゆる非農耕地用）の農薬登録申請について」の取扱方針を公表した。したがって、当協会としては昭和54年度より「非農耕地用除草剤の連絡試験」を実施してきたが、今回、農林水産省農薬検査所よりその取扱方針が公表されるに及び、非農耕地用除草剤の試験成績の概要を、昭和54年度より順次紹介することとした。

昭和54年度非農耕地用除草剤試験成績検討会

は、昭和55年8月18日(月)、当協会研究所（茨城県稲敷郡牛久町柏田 860）において、試験場関係者および委託関係者81名参集のもとに開催された。

この検討会では、非農耕地用除草剤93試験（209点）について、試験担当者より報告があり、活発な討議の後に慎重な審議が行なわれた。

試験成績に対する判定結果は、次表の通りである。

昭和54年度 非農耕地用除草剤試験供試薬剤および判定結果一覧表

〔作用性試験〕

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(1) BAYMET -1486 水和 (ウスチラン)	エチアジメロン: 1- (5-エチルスルホニ ル-1,3-チアジ ゾール-2-イル)- 1,3-ジメチルウレ ア……………70%	日本特殊 農業製造	植調研. (1)	〔ヨモギ・セイタカアワダ チソウ・ヨシ・チガヤ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 茎葉処理; 生育期(草丈 50cmまで); 50, 100 g.	継	適用性試験に移し て検討.
(2) MW-801 液 (ハービエー ス)	ピアラホス: 2-アミノ -4-〔(ヒドロキシ) (メチル)ホスフィノ イル〕ブチル-アラニ ルアラニン ナトリ ウム塩……………32%	明治製菓	植調研. (1)	〔ススキ・チガヤ等多年生 雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, 中 期, 後期; 50, 100 ml.	継	適用性試験に移し て検討.
(3) MW-802 液	未 公 開 ……………30%	同 上	植調研. (1)	〔ススキ・チガヤ等多年生 雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, 中 期, 後期; 50, 100 ml.	継	適用性試験に移し て検討.
(4) SW-792 水和	テトラピオン: 2,2,3, 3-テトラフルオロ プロピオン酸アンモ ニウム……………3.7% スルファミン酸塩: ス ルファミン酸アンモ ニウム……………80%	三 共	植調研. (1)	〔ヨモギ・クズ・セイタカ アワダチソウ・スギナ・ス スキ・ササ・ヨシ等多年生 雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期; 750, 1000, 1500 g.	継	適用性試験に移し て検討.
(5) VEL-26・ 2,4-D 粒 (ラベージ PA)	ブチダゾール: 1-(5- ターシャリーブチ ル-1,3,4-チアジ アゾール-2-イル)- 3-メチル-5- ハイドロキシ-2- イミダゾリジノン ……………5% 2,4 PA: 2,4-ジクロ ロフェノキシ酢酸ナ トリウム……………2.5%	武田薬品 工業	植調研. (1)	〔ヨモギ・セイタカアワダ チソウ・ススキ・チガヤ等多 年生雑草および一年生雑 草全般〕 土壌処理; 生育中期; 1000, 2000 g.	継	適用性試験に移し て検討.

〔適用性試験〕

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(1) AC-100 液 (ニココー ソ)	パラコート: 1,1'-ジ メチル-4,4'-ビピ リジリウム ジメチ ルサルフェート ……………38%	旭化学工 業	果試興津支場, 四国農試. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 30, 50 ml.	実	実: 〔一年生雑草 全般〕 生育初期~中期, 30~50 ml, 茎葉 処理.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(2) ametryne 乳 (プリマトールZ)	アメトリン: 2-メチルチオ-4-エチル アミノ-6-イソプロピルアミノ-s- トリアジン 22.5%	プリマトール普及会	植調研, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期; 200, 400 ml.	実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 200~400 ml, 茎葉処理. 継: 処理時期の検討.
(3) ametryne 乳 (プリマトールZ)	アメトリン ... 22.5%	同上	豊田 G. C., 玄海 G. C. (2)	〔芝地; 一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 100, (150), 200 ml.	実・ 継	実: 〔芝地; 一年生雑草全般〕 生育初期, 100~200 ml. 茎葉処理. 継: 薬量・薬害の検討.
(4) AMS 水溶 (ジョソーウイド)	スルファミン酸塩 (NH ₄)97%	日産化学工業	果試興津支場, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 600, 900 g (初期), 900, 1200 g (中期).	実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 900~1200 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期の検討.
(5) AMS・2, 4-D 水溶 (ジョソー)	スルファミン酸塩 (NH ₄)92% 2,4 PA (Na) 5%	同上	愛知農総試, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 750, 1000 g (初期), 1000, 1250 g (中期).	実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 1000~1250 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期の検討.
(6) atrazine・2,4-D・dalapon 粒 (プリマトールAD)	DPA: 2,2-ジクロロプロピオン酸ナトリウム.....10% アトラジン: 2-クロル-4-エチルアミノ-s-トリアジン 4% 2,4 PA (Na) 5%	プリマトール普及会	愛知農総試, 福岡農試豊前分場. (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期または中期; 1000, 1500 g (初期), 1500, 2000 g (中期).	実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 1000~2000 g, 茎葉・土壌処理. 継: 処理時期・草種の検討.
(7) atrazine・simazine 水和 (プリマトールSA)	CAT: 2-クロル-4, 6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン45% アトラジン.....10%	同上	植調研, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前(~始期); 100, 200 g.	実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生前~始期, 100~200 g. 土壌処理. 継: 草種の検討.
(8) atrazine・simazine 水和	CAT45% アトラジン.....10%	同上	日本ライン G. C., 玄海 G. C. (2)	〔芝地; 一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前; 50, 100 g.	実・ 継	実: 〔芝地; 一年生雑草全般〕 発生前, 50~100

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(8) atrazine ・ simazine 水和 (プリマトールSA) (つづき)						g, 土壌処理. 継: 薬量・草種の検討.
(9) atrazine ・ simazine 粒 (プリマトールSA)	CAT 3% アトラジン..... 2%	プリマトール普及会	植調研, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前〜始期; 1500, 2000 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生前〜始期, 1500〜2000 g, 土壌処理. 継: 草種の検討.
(10) bromacil ・ borate 粒 (ボロシル4)	ブロマシル: 5-プロム-3-セカンダリ- ブチル-6-メチルウラシル..... 4% 硼酸塩: 硼酸ナトリウム (Na ₂ B ₄ O ₇ の5H ₂ O および10H ₂ O)94%	中外貿易, 東光化工	果試興津支場, 植調研. (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期または中期; 1000, 1200, 1500 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生前〜始期, 800〜1200 g, 土壌処理. 継: 処理時期・草種の検討.
(11) 2,4-D・sweep 水和 (プラスコン)	2,4 PA (Na)80% MCC: メチル-N-(3,4-ジクロロフェニル)カーバメート 5%	日産化学工業	にのみやC.C., 豊田C.C. (2)	〔芝地; 一年生広葉および多年生広葉雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 50, 75g(初期), 75〜100g(中期).	実・継	実: 〔芝地(日本芝); 一年生雑草全般〕 生育初期, 50〜75g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期の検討.
(12) DDX® 水和 (クサダウNDX)	DCMU: 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチルウレア.....10% DCPA: 3,4-ジクロロプロピオンアニリド.....40% XMC: 3,5-キシリル-N-メチルカーバメート..... 3%	北興化学工業	果試興津支場, 四国農試, 植調研, 愛知農総試, 福岡農試鉾害試験地 (5)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(草丈30cm以下時); 100, 150 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期(草丈30cm以下時), 100〜150 g, 茎葉処理. 継: 薬量・草種の検討.
(13) diquat 液 (レグロックス)	ジクワット: 1,1'-エチレン-2,2'-ビス(4-ジクロロフェニル)ジプロピド30%	アイ・シー・アイ・ジャパン	宮城畜試, 福岡農試豊前分場. (2)	〔一年生広葉雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(草丈30cm以下時); 50, 80 ml.	実・継	実: 〔一年生広葉雑草全般〕 生育初期, 50〜80 ml, 茎葉処理. 継: 薬量・草種の検討.
(14) DMD 粒 (ニワエース)	DPA 3.3% MCP: 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸ナトリウム一水	石原産業	果試興津支場, 北海道滝川畜試. (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 1000, 2000, 3000 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生前〜始期, 2000〜3000 g,

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
14 DMD 粒 (つづき)	リウムー水化物 ……………2% DCMU ……………2.7%					土壌処理。 継: 薬量・処理時期の検討。
15 DX 粒 (ニワクリン)	ブロマシル ……1.3% MCP (Na) ……………2% DPA ……………3.3%	石原産業	果試興津支場, 北海道滝川畜試, (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 1000, 2000, 3000 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生前〜始期, 2000~3000 g, 土壌処理。 継: 薬量・処理時期の検討。
16 HW-211 水和 (シトメル)	DCPA ……………25% α-NAC: 1-ナフチル-N-メチルカーバメート……………5%	保土谷化学工業, 三明ケミカル	北海道中央農試, 宮城畜試, 植調研, 愛知農総試, 大阪農枝センター, 福岡農試鉾害試験地, (6)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期 (草丈30 cm以下時), 200, 300 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期 (草丈30 cm以下時), 200~300 g, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期の検討。
17 HW-422 乳 (クサノン, クサダウンA)	DCPA ……………25% α-NAC ……………5%	保土谷化学工業	植調研, 福岡農試畑作試験地, (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期 (草丈30 cm以下時), 200, 300 ml.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育中期 (草丈30~50 cm時), 200~300 ml, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期の検討。
18 IDD 粒 (アイピックス)	DCMU……………15% DPA ……………45%	石原産業	植調研, 福岡農試豊前分場, (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生盛期 (草丈10 cm以下時); 500, 750 g.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 発生盛期まで (草丈10 cm以下時), 500~750 g, 土壌処理。 継: 薬量・草種の検討。
19 K-102 液 (ナックス, ドリグラ)	パラコート (ジメチルサルフェート) ……………22%	小西安, 三菱商事	茨城園試, 福岡農試畑作試験地, (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 30, 50 ml.	実	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期〜中期; 35~50 ml, 茎葉処理。
20 MW-801 液 (ハービエース)	ピアラホス……………32%	明治製菓	北海道中央農試, 宮城畜試, 茨城園試, 愛知農総試, 大阪農枝センター, 福岡農試	〔ススキ, チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, 中期, 後期; 50, 100 ml.	実・継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期〜中期, 50~100 ml, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
020 MW-801 液 (つづき)			鉋害試験地. (6)			検討.
021 OK-621 液 (パラゼット)	パラコート(ジメチルサルフェート)38%	大塚化学 薬品	茨城園試, 福岡農試豊前分 場. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 30, 50 ml<15 l>.	実	実:〔一年生雑草 全般〕 生育初期~中期, 30~50ml, 茎葉 処理.
022 oxadia- zon 水和 (ロンスター)	オキサジアゾン: 5- ターシャリーブチル -3-(2,4-ジクロ ル-5-イソプロポ キシフェニル)-1,3, 4-オキサジアゾリ ン-2-オン50%	日産化学 工業	日本ラインG. C., 玄海G.C. (2)	〔芝地; 一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前; 20, 30 g.	実・ 継	実:〔芝地; 一年 生雑草全般〕 発生前, 20~30 g, 土壌処理. 継: 薬量・草種の 検討.
023 oxadia- zon・si- mazine 水和 (シマジン・ ロンスター)	オキサジアゾン25% CAT.....25%	同 上	程ヶ谷C.C., 日本ラインG. C. (2)	〔芝地; 一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前; 30, 40g.	実・ 継	実:〔芝地; 一年 生雑草全般〕 発生前, 30~40 g, 土壌処理. 継: 薬量・草種の 検討.
024 paraqu- at 液 (パラグリーン A)	パラコート: 1,1'-ジ メチル-4,4'-ビピ リジリウム ジクロ リド.....24%	森村商事	植調研, 福岡 農試畑作試験 地. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 20, (30), 40 ml.	実	実:〔一年生雑草 全般〕 生育初期~中期, 20~40 ml, 茎葉 処理.
025 RH-2915 ・D 水和 (ゴールD)	オキシフロフェン: 2-クロロ-4-トリ フルオロメチルフェニ ル-3'-エトキシ-4'- ニトロフェニルエー テル.....30% DCMU.....30%	三洋貿易	植調研, 大阪 農技センター, 福岡農試豊前 分場. (3)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(草 丈 30cm以下時); 30, 60g (展着剤サーファクタント WK 0.5%加用).	実・ 継	実:〔一年生雑草 全般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 30~60g, 茎葉 処理. 継: 薬量・草種の 検討.
026 SDMU 粒 (シントー草 取剤, 宝除 草剤)	DPA.....10% 2,4 PA (Na)5% DCMU.....4%	石原産業	果試興津支場, 北海道滝川畜 試. (2)	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 1000, 2000, 3000 g.	実・ 継	実:〔一年生雑草 全般〕 発生前~始期, 2000~3000 g, 土壌処理. 継: 薬量・草種の 検討.
027 simazi- ne 水和	CAT.....50%	ブリマト ール普及	植調研, 福岡 農試豊前分場.	〔一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前; 100,	実・ 継	実:〔一年生雑草 全般〕

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
27 simazine 水和 (つづき) (プリマトールS)		会	(2)	200 g.		発生前, 100 ~ 200 g, 土壌処理. 継: 薬量の検討.
28 YH-108 液 (クサタイジ)	パラコート(ジメチルサルフェート)38%	山本農業	茨城園試, 福岡農試畑作試験地. (2)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 30, 50 ml.	実	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 30~50 ml, 茎葉処理.
29 ADD 水溶 (キルジン, ノングラス)	ATA: 3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール17% 2, 4 PA (Na)25% DPA40%	2, 4-D 協議会	北海道中央農試, 福岡農試 鉦害試験地. (2)	〔ススキ・ヨシ・セイタカアワダチソウ・ギンギシ・イタドリ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 200, 300 g (初期), 300, 500 g (中期).	実・継	実: 〔カモガヤ・ギョウギンバ・ヨモギ・イタドリ・セイタカアワダチソウ・オオハンゴンソウ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 300~500 g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
30 amitrol・atrazine 水和 (ドマトール)	アトラジン.....38% ATA19%	日産化学工業	植調研, 四国農試. (2)	〔クローバー等多年生広葉雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 50, 75, 100 g.	実・継	実: 〔クローバー等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草〕 生育初期, 75~100 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期, 草種の検討.
31 AMS 水溶 (ジョソーウイド)	スルファミン酸塩(NH ₄)97%	同上	北海道農試, 果試興津支場. (2)	〔ヨモギ・クローバー・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 900, 1200 g (初期), 1200, 1500 g (中期).	実・継	実: 〔コスカグサ・コウボウ・スイバ・オオバコ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 1200~1500 g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
32 AMS・2, 4-D 水溶 (ジョソー)	スルファミン酸塩(NH ₄)92% 2, 4-PA (Na)5%	同上	北海道農試, 愛知農総試. (2)	〔ヨモギ・クローバー・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 1000, 1250 g (初	実・継	実: 〔チガヤ・コスカグサ・ヨモギ・ギンギシ・クローバー等多年生雑草および一

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
32 AMS・ 2,4-D 水溶 (つづき)				期), 1250, 1500 g(中期).		年生雑草全般) 生育初期~中期, 1000~1500 g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期の検討.
33 asulam 液 (アージラン)	アシュラム: N'-メト キシカルボニルスル ファニルアミド37%	塩野義製 薬	北海道中央農 試, 大阪農技 センター. (2)	〔ヨモギ・スギナ・ギンギ シ・セイタカアワダチソウ ・チガヤ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 300, 500 ml(展着剤加用).	実・ 継	実: 〔ススキ・チ ガヤ・ヨモギ・ ギンギシ・セイ タカアワダチソ ウ・スギナ等多 年生雑草および 一年生雑草全般〕 生育初期, 300 ~500 ml, 茎葉 処理. 継: 葉量・草種の 検討.
34 atrazine ・2,4-D・ dalapon 水和 (プリマトー ルAD)	DPA.....35% アトラジン.....18% 2,4 PA(Na)15%	プリマト ール普及 会	北海道中央農 試, 愛知農総 試. (2)	〔クズ・イタドリ・ギンギ シ・セイタカアワダチソウ ・ススキ・ササ・ヨシ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 200, 300 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・イ タドリ等多年生 雑草および一年 生雑草全般〕 生育初期, 200 ~300 g, 茎葉処 理. 継: 葉量(増量)・ 処理時期・草種 の検討.
35 atrazine ・2,4-D・ dalapon 粒 (プリマトー ルAD)	DPA.....10% アトラジン.....4% 2,4 PA(Na)5%	同 上	愛知農総試, 福岡農試豊前 分場. (2)	〔クズ・ギンギシ・セイタ カアワダチソウ・ススキ・ ササ・ヨシ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 3000, 4000 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・チ ガヤ・ギンギシ ・セイタカアワ ダチソウ・シダ 等多年生雑草お よび一年生雑草 全般〕 生育初期, 3000 ~4000 g, 茎葉 ・土壌処理. 継: 葉量・草種の 検討.
36 AX 水和 (ノンカル)	ATA.....50% プロマシル.....33.4%	石原産業	宮城畜試, 大 阪農技センタ ー. (2)	〔ヨモギ・スギナ・イタド リ・ヤブガラシ・チガヤ等 多年生雑草および一年生雑 草全般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 100, 150 g(初期), 150, 200 g(中期).	実・ 継	実: 〔ススキ・チ ガヤ・ヨモギ・ ギンギシ・セイ タカアワダチソ ウ・ヤブガラシ ・フキ・スギナ 等多年生雑草お

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
36 AX 水和 (つづき)						よび一年生雑草全般) 生育初期～中期 (草丈20～50cm時), 100～200g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
37 BAYMET - 1486 水和 (ウスチラン)	エチアジメロン…70%	日本特殊 農業製造	北海道農試, 宮城畜試, 福岡農試 鉾害試験地. (3)	〔ヨモギ・セイタカアワダチソウ・ヨシ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期(草丈50cm以下時); 50, 100g.	継	試験年次・例数不足(薬量・処理時期・草種の検討).
38 bromacil 粒 (ハイパーX)	ブロマシル……5%	丸和バイオケミカル	北海道農試, 果試興津支場, 四国農試. (3)	〔スギナ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育中期; 1500, 3000g.	実・継	実: 〔ススキ・チガヤ・シバムギ・ヨモギ・スイバ・クズ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 1500～3000g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・処理時期・草種の検討.
39 buthida- zol・2,4-D 粒 (ラベージP)	ブチダゾール……5% 2,4 PA (Na) …2.5%	日本農薬	北海道滝川畜試, 大阪農技センター. (2)	〔ヨモギ・クズ・ギンギン・セイタカアワダチソウ・スギナ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 1500, 2000g(クズ, チガヤ, ササ類が主対象になる場合 2000, 3000g).	実・継	実: 〔ススキ・ササ・ヨモギ・ギンギン・セイタカアワダチソウ・ワラビ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 1500～3000g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・草種の検討.
40 CS-1 水和 (タンデックスD)	カーブチレイト: メタ (3,3-ジメチルウレイド)フェニルターシャリーブチルカーバメート……56% 2,4 PA (Na) ……27%	日本チバガイギー, 昭和電工	北海道農試, 四国農試. (2)	〔ヨモギ・セイタカアワダチソウ・ススキ・ササ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 75, 100, 150g.	実・継	実: 〔シバムギ・ヨウボウ・ササ・ヨモギ・イタドリ・クズ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期(草丈20～30cm時), 100～150g, 茎葉処理.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(40) CS-1 水和 (つづき)						継: 薬量・草種の検討.
(41) CS-2 水和 (タンデックス80)	カーブチレート ……………80%	日本チバ ガイギー, 昭和電工	北海道農試, 四国農試. (2)	〔ヨモギ・セイタカアワダ チソウ・ススキ・ササ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 茎葉処理, 生育初期, 75, 100, 150 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・シ バムギ・ササ・ ヨモギ・スイバ 等多年生雑草お よび一年生雑草 全般〕 生育初期(草丈 20~30 cm時), 75~150 g, 茎葉 処理. 継: 薬量・草種の 検討.
(42) 2,4-D 水溶 (2,4-Dソー ダ塩)	2,4 PA (Na) ……………95%	2,4-D 協議会	四国農試, 茨 城園試. (2)	〔ヨモギ・クローバー・イ タドリ・ヤブガラシ等多年 生雑草および一年生雑草全 般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 40, 80 g (初期), 80, 100 g (中期).	実・ 継	実: 〔ヨモギ・ハ マスゲ等多年生 雑草および一年 生広葉雑草全般〕 生育初期(草丈 10~30 cm時), 80~100 g, 茎葉 処理. 継: 薬量・草種(と くに多年生雑草) の検討.
(43) 2,4-D・ dalapon ・diuron 水和 (デストラル)	2,4 PA……………9.8% DCMU……………19.5% DPA……………41.7%	中外貿易, 東光化工	北海道農試, 大阪農技セン ター. (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・スス キ・チガヤ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 150, 300 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・ヨ モギ・セイタカ アワダチソウ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育初期~中期, 150~300 g, 茎 葉処理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.
(44) 2,4-D・ dalapon ・diuron sodium- cyanate 水和 (クイットリ ー)	2,4 PA (Na) ……………3.5% DCMU……………7.5% DPA……………9% シアン酸塩: シアン酸 ナトリウム……………40%	保土谷化 学工業	北海道農試, 四国農試. (2)	〔ヨモギ・スイバ・ギンギ シ・スギナ・ススキ等多年 生雑草および一年生雑草全 般〕 茎葉処理; 生育初期(草 丈30 cm以下時); 1000, 1500 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・サ サ・ヨモギ・ス イバ・スギナ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育初期(草丈 20~30 cm時), 1000~1500 g, 茎葉処理.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
44) 2,4-D・dalapon・diuron sodium-cyanate 水和 (つづき)						継: 処理時期・草種の検討.
45) 2,4-D・swep 水和 (プラスコン)	2,4 PA (Na・H ₂ O) 80% MCC 5%	日産化学工業	四国農試, 愛知農総試. (2)	〔一年生広葉雑草および多年生広葉雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, 中期; 50, 75g (初期), 75, 100g (中期).	実・継	実: 〔ヨモギ・ギンギン・オオバコ等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草全般〕 生育初期, 75~100g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期・草種の検討.
46) dalapon 粒 (ダウボン)	DPA 15%	日産化学工業, 石原産業	茨城園試, 福岡農試鉈害試験地. (2)	〔ヨシ等イネ科多年生雑草〕 土壌処理; 枯草期~翌春; 7500, 10000g.	実・継	実: 〔チガヤ・ヨシ・ヨモギ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 枯草期~翌春, 7500~10000g, 土壌処理. 継: 葉量・草種の検討.
47) dalapon・dichlobenil 粒 (ハダスン)	DBN: 2,6-ジクロルベンゾニトリル 3% DPA 12%	兼 商	果試興津支場, 宮城畜試. (2)	〔ヨモギ・スギナ・ギンギン・ヤブガラシ・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前~生育初期; 2000~2500g.	実・継	実: 〔ススキ・ヨモギ・ギンギン・ヒルガオ・ヤブガラシ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 発生前~生育初期, 2000~2500g, 土壌処理. 継: 葉量・処理時期・草種の検討.
48) dalapon・diuron 水和 (クサプランカHS)	DCMU 30% DPA 53%	保土谷化学工業	北海道農試, 愛知農総試. (2)	〔ヨモギ・スギナ・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期 (草丈30~50cm時); 250, 400g.	実・継	実: 〔ススキ・チガヤ・コウボウ・ヨモギ・スイバ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期 (草丈20~40cm時). 400g, 茎葉

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
48 dalapon ・diuron 水和 (つづき)						処理。 継: 薬量・草種の検討。
49 dichlo- benil 粒 (カソロン)	DBN 6.7%	兼 商	果試興津支場, 宮城畜試。 (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・スギナ・ヤブガラシ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前〜生育初期; 1000, 1500 g.	実・継	実: 〔ヨモギ・ギンギシ・ヤブガラシ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 発生前〜生育初期, 1000〜1500 g, 土壌処理。 継: 薬量・草種の検討。
50 chlorth- iamid 粒 (プレフィックス)	DCBN: 2,6-ジクロ ルチオベンザミド 3%	塩野義製 薬	四国農試, 茨 城園試。 (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・ヤブガラシ等多年生広葉雑草〕 土壌処理; 生育初期; 1500, 2000, 2500 g.	実・継	実: 〔ヨモギ等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草全般〕 生育初期, 2000〜2500 g, 土壌処理。 継: 薬量・処理時期・草種の検討。
51 Dowco- 233 液 (ザイトロン)	トリクロピル: 3, 5, 6 -トリクロルピリジ ルオキシ酢酸トリエ チルアミン 43.8%	ダウケミ カルジャ パン, 日 産化学工 業, 保土 谷化学工 業	果試興津支場, 四国農試。 (2)	〔クズ・セイタカアワダチソウ・クローバー等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 50, 75 ml/(初期), 75, 100 ml/(中期)。	実・継	実: 〔ヨモギ・ギンギシ・クローバー・クズ等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草〕 生育初期〜中期, 75〜100 ml, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期・草種の検討。
52 Dowco- 233 液 (ザイトロン)	トリクロピル 43.8%	同 上	にのみやC.C., 西日本グリー ン研。 (2)	〔芝地; クズ・セイタカアワダチソウ・クローバー等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 40, 60 ml/(初期), 60, 100 ml/(中期)。	実・継	実: 〔芝地; ヨモギ・ギンギシ・クローバー・ムラサキカタバミ・(クズ)等多年生広葉雑草および一年生広葉雑草〕 生育初期〜中期, 40〜100 ml, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期・草種の検討。

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
53 DPX-3674 水和 (ベルノパー)	ヘキサジノン: 3-シクロヘキシル-6-(ジメチルアミノ)-1-メチル-2,4(1H,3H)-ジオン 90%	デュボン・ファーマー・イースト 日本支社	北海道農試, 果試興津支場. (2)	〔クズ・ギシギシ・セイタカアワダチソウ・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期; 100, 150 g.	実・継	実: 〔ススキ・シバムギ・コウボウ・スイバ・オオバコ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 100~150 g, 茎葉処理. 継: 薬量・草種の検討.
54 DSMA・mecoprop 液 (DSCP)	DSMA: メタンアルソン酸ナトリウム 13% MCPP: α-(2-メチル-4-クロルフェノキシ)プロピオン酸 5%	クミアイ化学工業	四国農試, 宮城畜試. (2)	〔クズ・イタドリ〕 茎葉処理; 生育初期(クズ2~3葉展開時); 400, 500, 600 ml.	実・継	実: 〔クズ・ヨモギ等多年生雑草〕 生育初期, 500~600 ml, 茎葉処理. 継: 薬量・草種の検討.
55 EL-103 水和 (ハービック)	テブチウロン: 1-(5-ターシャリーブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチルウレア..... 80%	武田薬品工業	四国農試, 宮城畜試, 福岡農試鉾害試験地. (3)	〔ヨモギ・クズ・セイタカアワダチソウ・ススキ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, または中期, または後期; 50, 100 g (イネ科多年生雑草が多い場合は 100, 120 g).	実・継	実: 〔ススキ・(チガヤ)・ササ・ヨモギ・イタドリ・セイタカアワダチソウ・クズ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期 (草丈20~50cm時), 100~120 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期の検討.
56 EL-103 粒 (ハービック)	テブチウロン 5%	同上	四国農試, 宮城畜試, 福岡農試鉾害試験地. (3)	〔ヨモギ・クズ・セイタカアワダチソウ・ススキ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期, または中期, または後期; 1000, 1500 g (イネ科多年生雑草が多い場合は 1500, 2000 g).	実・継	実: 〔ススキ・チガヤ・ササ・ヨモギ・イタドリ・セイタカアワダチソウ・クズ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期 (草丈20~50cm時), 1500~2000 g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・処理時期の検討.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
57 HW-45A 水和 (クサブラン カ、ゼスト、 他)	2,4 PA (Na)……10% DCMU……………20% DPA ……………35%	保土谷化 学工業	北海道農試, 四国農試. (2)	〔ヨモギ・スイバ・スギナ ・セイタカアワダチソウ・ ススキ・チガヤ・ヨシ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 茎葉処理; 生育中期(草 丈30~50cm時); 300, 450g(セイタカアワダチ ソウ・ススキ・チガヤ・ ヨシなどが主対象の場合 450, 600g).	実・ 継	実:〔ススキ・チ ガヤ・ササ・ヨ モギ・スイバ・ クローバー・ク ズ等多年生雑草 および一年生雑 草全般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 450~600g, 茎 葉処理. 継: 薬量・草種・ 処理時期の検討.
58 HW-45C 粒 (クサブラン カ、ゼスト、 他)	2,4 PA (Na)……5% DCMU……………4% DPA ……………10%	同 上	北海道農試, 四国農試. (2)	〔ヨモギ・スイバ・スギナ ・セイタカアワダチソウ・ ススキ・チガヤ・ヨシ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 土壌処理; 生育初期(草 丈20cm以下時); 1500, 2000g(セイタカアワダ チソウ・ススキ・チガヤ ・ヨシなどが主対象の場 合2000, 3000g).	実・ 継	実:〔ススキ・チ ガヤ・ササ・ヨ モギ・スイバ・ クローバー・ク ズ等多年生雑草 および一年生雑 草全般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 1500~3000g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・草種の 検討.
59 M & B- 9057 液 (アーザラン)	アシュラム………37%	ローヌ・ プーラン ・ジャパ ン	北海道中央農 試, 福岡農試 豊前分場, (2)	〔ヨモギ・ギンギン・シダ 類・セイタカアワダチソウ ・スギナ・チガヤ等多年生 雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; (150), 300, 500ml.	実・ 継	実:〔ススキ・チ ガヤ・ヨモギ・ ギンギン・セイ タカアワダチソ ウ・カモガヤ・ イタドリ等多年 生雑草および一 年生雑草全般〕 生育初期, 300 ~500ml, 茎葉 処理. 継: 薬量・草種の 検討.
60 MCP 液 (MCPソー ダ塩)	MCP (Na) ……………19.5%	2,4-D 協議会	四国農試, 茨 城園試. (2)	〔ヨモギ・クローバー・イ タドリ・ヤブガラシ等多年 生雑草および一年生広葉雑 草全般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 200, 400g.	実・ 継	実:〔ヨモギ・ク ローバー等多年 生広葉雑草およ び一年生広葉雑 草〕 生育初期, 200 ~ 400g, 茎葉処理. 継: 処理時期・草 種の検討.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
61) mecoprop 液 (MCPP)	MCPP 50%	ローヌ・ブーラン・ジャパン	四国農試, 植調研. (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・スギナ・クローバー・カタバミ等多年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(温度20℃以上); 100, 200 ml(ギンギシ・カタバミ・ヨモギなどが主対象の場合 200, 300 ml).	実・継	実:〔ヨモギ・セイタカアワダチソウ・クローバー・スギナ等多年生雑草および一年生広葉雑草〕 生育初期, 100~200 ml, 茎葉処理. 継: 葉量・草種の検討.
62) MIX-731 水和 (QQ ₃ Z)	2,4 PA (Na) 23.5% DCMU 32.5% DCBN 16.5%	石原産業	にのみやC.C., 豊田C.C. (2)	〔芝地; ヨモギ・スギナ・ギンギシ・ヤブガラシ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前(2月下旬~3月上旬); 80, 100, 150 g.	実・継	実:〔芝地; ヨモギ・ギンギシ・スイバ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 発生前~始期, 100~150 g.(茎葉)・土壌処理. 継: 葉量・処理時期・草種の検討.
63) MIX-734 水和 (QZQ ₃)	2,4 PA (Na) 42.5% DCMU 28.5% DCBN 9%	同上	程ヶ谷C.C., 西日本グリーン研. (2)	〔芝地; ヨモギ・スギナ・ギンギシ・ヤブガラシ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 80, 100, 150 g.	実・継	実:〔芝地; ヨモギ・ギンギシ・スイバ・ヤブガラシ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 80~150 g, 茎葉処理. 継: 葉量・草種およびシバに対する葉害の検討.
64) MIX-740 水和 (Q C Q Z)	DPA (Na) ... 42.5% 2,4 PA (Na) 19% DCMU 23.5%	同上	四国農試, 北海道滝川畜試. (2)	〔ヨモギ・イタドリ・スギナ・ススキ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 100, 200 g(初期), 200, 300 g(中期).	実・継	実:〔ススキ・カモガヤ・ササ・ヨモギ・オオバコ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 200~300 g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期・草種の検討.
65) MIX-832 水和	ATA 22% 2,4 PA (Na) 23%	同上	宮城畜試, 大阪農技センター. (2)	〔ヨモギ・イタドリ・スギナ・ヤブガラシ・セイタカアワダチソウ等多年生雑草〕	実・継	実:〔ヨモギ・ギンギシ・イタドリ・クローバー

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
65 MIX-832 水和 (つづき) (QNZ)	DCMU……………39%			および一年生雑草全般) 茎葉処理; 生育初期または中期; 60, 80g (初期), 80, 120g (中期).		・ヤブガラシ・スギナ等多年生雑草および一年生広葉雑草) 生育中期(草丈30~50cm時), 80~120g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期・草種の検討.
66 MIX-850 乳	MCP: 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸-n-ブチルエステル……………48% C1-IPC: イソプロピル-N-(3-クロロフェニル)カーバメート……………11%	石原産業	程ヶ谷C.C., 西日本グリーン研. (2)	〔芝地; チドメグサ・クロバー等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 発生前(12月下旬~3月上旬); 70, 100 ml.	実・継	実:〔芝地:チドメグサ・クロバー・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 発生前, 70~100 ml, 土壌処理. 継: 薬量・処理時期・草種の検討.
67 MN-1 微粒 (ミカロック, アトキレー)	DPA……………10% 2,4 PA (Na) ……3% DCMU……………5%	三笠化学工業, 日本農薬	北海道滝川畜試, 福岡農試 鉾害試験地. (2)	〔ヨモギ・イタドリ・ギンギシ・セイタカアワダチソウ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期(草丈20cm以下時)または中期(草丈20cm以上時); 1350, 2250g (初期), 2250, 3000g (中期).	実・継	実:〔チガヤ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 2250~3000g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・草種の検討.
68 MON-39 液 (ラウンドアップ)	グリホサート: N-(ホスホノメチル)グリシン イソプロピルアミン塩……………41%	ラウンドアップ研究会 〔クミアイ化学工業, 三共, 日本モンサント〕	北海道滝川畜試, 福岡農試 鉾害試験地. (2)	〔ヨモギ・ギンギシ・クズ・セイタカアワダチソウ・ススキ・ササ・ヨシ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 5~6月頃, 7~8月頃; 100 ml (5~6月頃), ササ類主対象の場合50倍, 他草の場合100倍液散布(7~8月頃).	実・継	実:〔ススキ・チガヤ・ササ・ヨモギ・セイタカアワダチソウ・ワラビ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育中期~後期(草丈30~80cm時), 100 ml, 茎葉処理. 継: 処理時期・草種・処理法の検討.
69 MW-802 液	未 公 開……………30%	明治製菓	北海道中央農試, 宮城畜試, 茨城園試, 愛知農総試, 大	〔ススキ・チガヤ等多年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期, 中期, 後期; 50, 100 ml.	継	試験年次不足. 成分未公開.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
69 MW-802 液 (つづき)			阪農技センター, 福岡農試 鉦害試験地. (6)			
70 NC-021 -HG 粒 (ハイジョソ -V, 他)	ブチダゾール……5% 2,4 PA (Na) ……5%	日本カー リット	北海道滝川畜 試, 福岡農試 鉦害試験地. (2)	〔ヨモギ・ギシギシ・スギ ナ・セイタカアワダチソウ ・ススキ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期〜中 期; 1200, 2500 g.	実・ 継	実:〔ススキ・ヨ モギ・ワラビ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育初期〜中期, 1200〜2500 g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.
71 NC-022 -HW 水和 (ハイジョソ -V)	ブチダゾール……50% 2,4 PA (Na) ……20%	同 上	北海道滝川畜 試, 福岡農試 鉦害試験地. (2)	〔ヨモギ・ギシギシ・セイ タカアワダチソウ・スギナ ・ススキ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期〜中 期; 100, 200 g.	実・ 継	実:〔ススキ・チ ガヤ・ササ・ヨ モギ・セイタカ アワダチソウ・ ワラビ等多年生 雑草および一年 生雑草全般〕 生育初期〜中期 (草丈20〜50cm 時), 100〜200 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.
72 NC-411 -HG 粒 (ゲルパーK X, カレタ ー)	TCA: トリクロル酢酸 カルシウム ……………20% DCMU ……………4% 2,4 PA (Na) ……5%	同 上	北海道滝川畜 試, 福岡農試 鉦害試験地. (2)	〔ヨモギ・ギシギシ・セイ タカアワダチソウ・スギナ ・ススキ・チガヤ等多年生 雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期, 萌 芽伸長前(11月〜4月); 2000, 3000 g (初期), 2500, 4000 g (萌芽伸長 前).	実・ 継	実:〔ヨシ・ヨモ ギ・セイタカア ワダチソウ等多 年生雑草および 一年生雑草全般〕 生育初期または 萌芽伸長前, 4000 g, 土壌処 理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.
73 NC-412 -HW 水和 (ゲルパーK X, クサタ イジW)	TCA (Ca) ……45% DCMU ……………30% 2,4 PA ……………5%	同 上	北海道滝川畜 試, 福岡農試 鉦害試験地. (2)	〔ヨモギ・ギシギシ・セイ タカアワダチソウ・スギナ ・ススキ・チガヤ等多年生 雑草および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期, 萌 芽伸長前; 300, 400 g (初 期), 350, 500 g (萌芽伸長 前).	実・ 継	実:〔ヨモギ・チ ドメグサ・スギ ナ等多年生雑草 および一年生雑 草全般〕 生育初期または 萌芽伸長前, 350〜500g, (茎 葉・)土壌処理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
74 NHS-50 粉 (クサトール FP, クロレ ートS, デゾ レートAZ)	塩素酸塩: 塩素酸ナトリウム……………50% 炭酸塩: 炭酸ナトリウム……………50%	三 草 会 〔昭和電 工, 日 本カー リット, 保土谷 化学工 業〕	北海道中央農 試, 大阪農技 センター。 (2)	〔ヨモギ・イタドリ・フキ ・ススキ・ササ等多年生雑 草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期〜中 期; 1500, 2500 g.	実・ 継	実: 〔ササ・ヨモ ギ・イタドリ・ チドメグサ・ワ ラビ等多年生雑 草および一年生 雑草全般〕 生育初期〜中期, 1500〜2500 g, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の 検討。
75 NHS-60 水溶 (クサトール FP, クロレ ートSL, デ ゾレートA, 他)	塩素酸塩(Na) ……60% セスキ酸塩: セスキ酸 ナトリウム……………30%	同 上	北海道中央農 試, 大阪農技 センター。 (2)	〔ヨモギ・イタドリ・フキ ・ススキ・ササ等多年生雑 草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期〜中 期, 1000, 2500 g.	実・ 継	実: 〔チガヤ・サ サ・ヨモギ・ギ シギシ・イタド リ・ワラビ・ス ギナ等多年生雑 草および一年生 雑草全般〕 生育初期〜中期, 1000〜2500 g, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の 検討。
76 NKG-1 水和 (カヤパンチ)	アメトリン……………20% MCPB ……………15% DPA ……………30%	日本化薬	北海道中央農 試, 宮城畜試, 茨城園試, 大 阪農技センタ ー, 福岡農試 鉾谷試験地。 (5)	〔ヨモギ・ギシギシ・スイ バ・セイタカアワダチソウ ・ススキ・チガヤ等多年生 雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(草 丈15〜20cm)または中期 (草丈30〜40cm); 200, 300 g(初期), 300, 400 g (中期)。	実・ 継	実: 〔チガヤ・ヨ シ・ヨモギ・ギ シギシ・イタド リ・セイタカア ワダチソウ等多 年生雑草および 一年生雑草全 般〕 生育初期〜中期, 200〜400 g, 茎 葉処理。 継: 薬量の検討。
77 PO-DM 水和 (ボミカルD M)	MCP(Na) …… 15% DCMU…………… 15% DPA…………… 45%	石原産業	茨城園試, 福 岡農試豊前分 場。 (2)	〔ヨモギ・イタドリ・セイ タカアワダチソウ・スギナ 等多年生雑草および一年生 雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期また は中期; 100, 200 g(初期), 200, 300 g(中期)。	実・ 継	実: 〔ススキ・ヨ モギ・スギナ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育初期(草丈 5〜30cm時), 200〜300 g, 茎 葉処理。 継: 薬量・処理時 期・草種の検討。
78 SK-FA 水和	2,4 PA(Na)……………15%	昭和電工	愛知農総試,	〔ヨモギ・ギシギシ・セイ	実	実: 〔ギョウギシ

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
78) SK-FA 水和 (ファンタックスA) (つづき)	メチルダイムロン: 1 -(α , α -ジメチル ベンジル)-3-メチ ル-3-フェニルウ レア……………25% DCMU……………30%		福岡農試豊前 分場, (2)	タカアワダチソウ・スギナ 等多年生雑草および一年生 雑草全般〕 土壌処理; 生育初期; 200, 400 g.	・ 継	バ・ヨモギ・ギ シギシ・セイタ カアワダチソウ ・スギナ等多年 生雑草および一 年生雑草全般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 200~400 g, 茎 葉処理. 継: 葉量・草種の 検討.
79) SL-501 液 (ラズドー)	ピリフェノップ: 2- [4-(3,5-ジクロ ルピリジン-2-イ ルオキシ)フェノキシ] プロピオン酸ナトリ ウム……………35%	石原産業	果試興津支場, 茨城園試, (2)	〔ススキ・ヨシ・チガヤ・ キシウスズメノヒエ等多 年生イネ科雑草および一年 生イネ科雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期(草 丈30~40cm時); 200, 300 ml.	実・ 継	実: 〔ススキ・チ ガヤ・ヨシ等多 年生イネ科雑草 および一年生イ ネ科雑草全般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 200~300 ml, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時 期の検討.
80) SR-9P 粒 (タンデックス)	カーブチレイト…4%	日本チバ ガイギー, 昭和電工	北海道農試, 四国農試, (2)	〔ヨモギ・セイタカアワダ チソウ・ススキ・ササ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 土壌処理; 生育初期; 2000, 3000 g.	実・ 継	実: 〔シバムギ・ ササ・ヨモギ・ スイバ・クズ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育初期(草丈 20~30cm時), 2000~3000 g, 土壌処理. 継: 葉量・草種の 検討.
81) SSH-43 水和 (イソキシール50)	イソウロン: 1-(5- ターシャリーブチル イソオキサゾール- 3-イル)-3,3-ジ メチルウレア…50%	塩野義製 薬	北海道中央農 試, 大阪農技 センター, (2)	〔ヨモギ・クズ・セイタカ アワダチソウ・ススキ等多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 茎葉処理; 生育初期; 100, 150, 200 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・ヨ モギ・ギシギシ ・セイタカアワ ダチソウ・フキ 等多年生雑草お よび一年生雑草 全般〕 生育初期, 150 ~200 g, 茎葉処 理. 継: 葉量・草種の 検討.

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
82 SSH-43 粒 (イソキシール4.0)	イソウロン……4%	塩野義製薬	北海道中央農試, 大阪農技センター. (2)	〔ヨモギ・クズ・セイタカアワダチソウ・ススキ等多年生雑草〕 土壌処理; 生育初期(ススキは株直径30cm以内); 1500, 2000, 2500 g.	実・ 継	実: 〔ヨモギ・ギシギシ・セイタカアワダチソウ・フキ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 1500~2500 g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量の検討.
83 SSH-50 水溶	2,4 PA(NH ₄): 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアンモニウム……95%	同上	四国農試, 茨城園試. (2)	〔ヨモギ・スギナ等多年生雑草および一年生広葉雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 50, 100, 150 g(展着剤加用).	実・ 継	実: 〔ヨモギ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期, 50~150 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期・草種の検討.
84 SW-792 水溶	テトラピオン…3.7% スルファミン酸塩 (NH ₄) ……80%	三共	北海道中央農試, 宮城畜試, 茨城園試, 植調研, 大阪農技センター, 福岡農試鉾害試験地. (6)	〔ヨモギ・クズ・セイタカアワダチソウ・スギナ・ススキ・ヨシ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育中期; 750, 1000, 1500 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・チガヤ・ヨシ・ササ・ヨモギ・イタドリ・クズ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育中期, 1000~1500 g, 茎葉処理. 継: 薬量・処理時期・草種の検討.
85 thiazfluron 水和 (エルボタン)	チアザフルロン: 1,3-ジメチル-3-(5-トリフルオロメチル-1,3,4-チアジアゾリル-2)ウレア ……80%	プリマトール普及会	北海道農試, 大阪農技センター. (2)	〔クズ・イタドリ・セイタカアワダチソウ・ススキ・ササ・ヨシ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期または中期; 100, 150 g.	実・ 継	実: 〔シバムギ・コウボウ・ヨモギ・ギシギシ・セイタカアワダチソウ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 100~150 g, 茎葉処理. 継: 薬量・草種の検討.
86 thiazfluron 粒 (エルボタン)	チアザフルロン…5%	同上	北海道農試, 大阪農技センター. (2)	〔クズ・イタドリ・セイタカアワダチソウ・ススキ・ササ・ヨシ・チガヤ等多年生雑草および一年生雑草全般〕	実・ 継	実: 〔シバムギ・コウボウ・ヨモギ・ギシギシ・イタドリ・セイタカアワダチソウ等多年生雑草および一年生雑草全般〕

薬剤名・剤型 (商品名)	有効成分および含有率	委託者名	試験実施場所	〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a <水量> 等	判定	判定内容・理由・その他
86 thiazfl-uron 粒 (つづき)				土壌処理; 生育初期または中期; 1500, 2000 g.		ウ・クズ・ワラビ等多年生雑草および一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 1500～3000 g, 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・草種の検討.
(87) VEL-26 水和 (ラベージ)	ブチダゾール……75%	ベルシコ ール・パ シフィッ ク・リミ テッド	北海道滝川畜 試, 茨城園試. (2)	〔ヨモギ・クズ・セイタカ アワダチソウ・スギナ・ス スキ・チガヤ等多年生雑草 および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 90, 120 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・チ ガヤ・ササ・ヨ モギ・ワラビ等 多年生雑草およ び一年生雑草全 般〕 生育中期(草丈 30～50 cm時), 90～120 g, 茎葉 処理. 継: 処理時期・草 種の検討.
(88) VEL-26 ・2,4-D 粒 (ラベージ PA)	ブチダゾール……5% 2,4 PA (Na) ……………2.5%	武田薬品 工業	植調研, 福岡 農試鉦害試験 地. (2)	〔ヨモギ・セイタカアワダ チソウ・ススキ・チガヤ等 多年生雑草および一年生雑 草全般〕 土壌処理; 発生前～生育 初期; 1000, 2000 g.	実・ 継	実: 〔ススキ・ヨ モギ等多年生雑 草および一年生 雑草全般〕 発生前～生育初 期, 2000 g, 土 壌処理. 継: 薬量・処理時 期・草種の検討.

植 調 協 会 だ よ り

◎ 会議開催日程のお知らせ

- ・昭和57年度水稻・畑作関係除草剤試験および
展示圃試験成績地域別検討会

地域名	部門	日 時	場 所
東北・ 北陸	水稻 安全 畑作 展示	11月4日(木) 9:30～17:00	福島県飯坂温泉 ホテル「聚楽」会 議室, 〒960-02 福島市飯坂町字 西滝ノ町27, TEL0245-42 -2201
		5日(金) 9:00～16:00	
		4日(木) 15:00～17:00	
		4日(木) 9:30～17:00	
		5日(金) 9:00～15:00	
近畿・	水稻	11月11日(木) 9:30～17:00	島根県玉造温泉

地域名	部門	日 時	場 所
中国・ 四国	水稻 安全 畑作 展示	11月12日(金) 8:30～15:00	ホテル「松の湯」 会議室, 〒699- 02 島根県八束 郡玉湯町玉造温 泉, TEL.08526 -2-0611.
		11日(木) 16:00～18:00	
		12日(金) 10:00～10:30	
		12日(金) 10:30～14:30	
関東・ 東山・ 東海	水稻 安全	11月15日(月) 10:00～17:00	協和銀行秋葉原 支店4階会議室 〒101 千代田区 神田和泉町1番 地, TEL.03- 866-1171.
		16日(火) 10:00～17:00	
		15日(月) 16:00～18:00	
	畑作 展示	15日(月) 10:00～17:00	植調会館3階会 議室, 〒110台東 区台東1-26-6, TEL.03-832- 4188.
		16日(火) 10:00～15:00	
北海道	水稻	11月18日(木) 9:30～17:00	札幌市中央区自