

昭和55年度非農耕地用 除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和55年度非農耕地用除草剤試験成績検討会は、昭和56年8月5日当協会研究所（茨城県稲敷郡牛久町柏田860）において、試験場関係者および委託関係者66名参集のもとに開催された。

この検討会では、非農耕地用除草剤37薬剤、43試験（121点）について、試験担当者より報告があり、活発な討議の後に慎重な審議が行われた。

試験成績に対する判定結果は、次表の通りである。

昭和55年度 非農耕地用除草剤適用性試験供試薬剤および判定結果一覧表

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含 有 率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法；処理時期；使用量/a <水量>等	判定	判定内容・理由・その他
(1) AH-501㊼ 液 〔パラパス24〕	パラコート：1, 1'-ジメチル -4,4'-ジピ リジリウムジ クロリド ……24%	旭化成工業	北海道中央農 試，愛知農総 試園研，香川 農試府中分場。 (3)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理；生育初期～生育期(できれば草丈40cm以下時)；30, 45 ml<20～30 l>。 比較：グラモキソン液剤	実・ 継	実：〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期，30～45 ml，茎葉処理。 継：効果の確認。
(2) AH-501㊽ 液 〔パラパス8〕	パラコート（ジ クロリド） ……7.7%	同上	北海道滝川畜 試，植調研， 福岡農総試豊 前分場。 (3)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理；生育初期～生育期(できれば草丈40cm以下時)；100, 150 ml<20～30 l>。 比較：グラモキソン液剤。	実・ 継	実：〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期，100～150 ml，茎葉処理。 継：効果の確認。
(3) AH-502 水和 〔パラパスD〕	DCMU：3- (3,4-ジクロ ルフェニル)- 1,1-ジメチ ルウレア ……23.5% パラコート（ジ クロリド） ……15.6%	同上	宮城畜試，大 阪農枝センタ ー，福岡農総 試鉦吉試験地。 (3)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理；生育初期～生育期(できれば草丈40cm以下時)；30, 45 g<20～30 l>。 比較：グラモキソン液剤。	実・ 継	実：〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期，50～75 g，茎葉処理。 継：効果の確認。
(4) HW-211 水和 〔シメトル〕	DCPA：3,4- ジクロルエー ブ	保土谷化学工業，	北海道中央農 試，宮城畜試，	〔メヒシバ・イヌタデ・アレ チノギク・キツネノマゴ・	実・ 継	実：〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期，200

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
(4) HW-211 水和 〔シトメル〕 (つづき)	ロピオンアニ リド……25% α-NAC: 1- ナフチル-N -メチルカー バイド ……5%	三明ケミ カル	植調研, 愛知 農総試, 大阪 農枝センター, 福岡農総試鉦 害試験地. (6)	エノコログサ・スズメノカ タビラ・ハコベ等の一年生 雑草] 茎葉処理; 生育期(草丈30 cm時); 200, 300 g <20 l>, 展着剤加用.		～300 g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期(草 丈等)の検討.
(5) HW-422 乳 〔クサノン, クサダウ ンA〕	DCPA … 50% α-NAC ……10%	保土谷化 学工業	植調研, 福岡 農総試豊前分 場. (2)	〔メヒシバ・イヌタデ・アレ チノギク・キツネノマゴ・ エノコログサ・スズメノカ タビラ・ハコベ等の一年生 雑草] 茎葉処理; 生育中期(草丈 30cm位); 200, 300 ml/ <15～30 l>, 展着剤加 用.	実・ 継	実: [一年生雑草全般] 生育初期～中期; 200 ～300 ml, 茎葉処理. 継: 処理時期・草種の検 討.
(6) MW-801 液 〔ハービエ ース〕	ピアラホス: (2 -アミノ-4 -メチルホス フィノ-ブチ リル)-アラニ ルアラニンモ ノナトリウム 塩……32%	明治製菓	北海道中央農 試, 宮城畜試, 植調研, 愛知 農総試, 大阪 農枝センター, 福岡農総試鉦 害試験地. (6)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 50, 100 ml.	実・ 継	実: [一年生雑草全般] 生育初期～中期, 50～ 100 ml, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
(7) NH-507 水和 〔グラトリ ン〕	CAT: 2-クロ ル-4,6-ビス エチルアミ ノ-s-トリ アジン……40% DCMU……10%	日本農業	北海道滝川畜 試, 福岡農総 試鉦害試験地. (2)	〔メヒシバ・イヌビユ・スベ リヒユ・イヌタデ・アカザ ・エノコログサ等一年生雑 草〕 茎葉兼土壌処理; 発生前; 30, 50 g <15 l>.	継	継: 試験年次・例数不足.
(8) OK-621 液 〔パラゼッ ト〕	パラコート(ジメ チルサルフェー ト) ……38%	大塚化学 薬品	植調研, 福岡 農総試豊前分 場. (2)	〔メヒシバ・オヒシバ・スズ メノカタビラ・シロザ・ツ ユクサ等一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 30, 50 ml.	実	実: [一年生雑草全般] 生育初期～中期, 30～ 50 ml, 茎葉処理.
(9) RH-2915 乳 〔ゴール〕	オキシフローフ ェン: 2-クロ ル-4-トリ フルオロメチ ルフェニル- 3-エトキシ -4-ニトロ フェニルエー テル……24%	三洋貿易, ロームア ンドハ ースジ ャパン	植調研, 大阪 農枝センター, 福岡農総試豊 前分場. (3)	〔一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 体系処 理…生育初期～中期, グ ラモキソン 30ml→2週間 後(草丈5 cm以内) RH- 2915 20, 40 ml <20 l>. 混合処理…草丈30cm時; グラモキソン 30ml+RH -2915 20ml, グラモキ ソン 30ml+RH-2915 40ml(展着剤: サーファ クタントWK 0.2%加用).	継	継: 試験年次・例数不足.

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
(10) RH-2915 ・D 水和 〔ゴール・ D〕	オキシフロフ ェン……30% DCMU……30%	三洋貿易	北海道滝川畜 試, 宮城畜試, 植調研, 愛知 農総試, 大阪 農技センター, 福岡農総試豊 前分場. (6)	〔一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期～中 期(草丈30cm以下); 30, 60 g<15～20 l>(展着剤 : サーフエクトン WK 0.5%加用).	実 ・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 30～ 60g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
(11) YF-65 液 〔プリグロ ックス〕	パラコート(ジ クロリド) ……10% ジクワット: 1, 1'-エチレン -2,2'-ビピ リジリウムジ プロミド ……14%	アイ シ ー アイ ジャパ ン	宮城畜試, 大 阪農技センタ ー, 福岡農総 試豊前分場. (3)	〔雑草全般(特に一年生)〕 茎葉処理; 生育期; 40, (50,) 60 ml.	実 ・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 40～ 60 ml, 茎葉処理. 継: 効果の確認.
(12) YF-97 水和 〔パラコー ル〕	パラコート(ジ クロリド) ……24% DCMU……20%	同 上	北海道滝川畜 試, 愛知農総 試, 福岡農総 試鉦害試験地. (3)	〔雑草全般(特に一年生)〕 茎葉処理; 生育期; 30, 40, 50 ml.	実 ・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 生育初～中期, 30～50 g, 茎葉処理. 継: 効果の確認.
(13) BAYM- ET-1486 水和 〔ウスチラ ン〕	エチアジメロン : 1-(5-エチ ルスルホニル -1,3,4-チ アジアゾール -2-イル)- 1,3-ジメチ ルウレア ……70%	日本特殊 農薬製造	北海道農試, 宮城畜試, 植 調研, 福岡農 総試鉦害試験 地. (4)	〔ヨモギ・セイタカアワダチ ソウ・クズ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期(草丈20 ～30cm); 50, 75, 100 g.	実 ・ 継	実: 〔ススキ・シバムギ・ ヨモギ・セイタカアワ ダチソウ・フキ・ヤブ ガラシ・スギナ等多年 生雑草および一年生雑 草全般〕 生育初期～中期, 50～ 100 g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
(14) bromo- cil 水和 〔ハイパー X〕	ブロマシル: 5 -プロモ-3 -セカンダリ -ブチル-6 -メチルウラ シル……80%	デュボン ファイ ースト 日 本支社	北海道中央農 試, 愛知農総 試, 福岡農総 試豊前分場. (3)	〔スギナ・チガヤ・ヨモギ・ タンポポ等多年生雑草およ び一年生雑草〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期～中期; 100, 200 g(展 着剤: サーフエクトン WK 0.2%加用).	実 ・ 継	実: 〔チガヤ・ヨモギ・ギ ンギン・クローバー・ スギナ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 100 ～200 g, 茎葉処理. 継: 効果の確認.
(15) bromo- cil 粒 〔ハイパー X〕	ブロマシル ……5%	丸和バイ オケミカ ル	香川農試府中 分場. (1)	〔スギナ・チガヤ・ヨモギ・ タンポポ等多年生雑草およ び一年生雑草〕 茎葉処理; 生育初期～中 期; 800, 1500, 3000 g.	実 ・ 継	実: 〔ススキ・チガヤ・シ バムギ・ヨモギ・セイ タカアワダチソウ・ク ズ・スギナ等多年生雑 草および一年生雑草全 般〕 生育初期～中期, 1500 ～3000 g, 茎葉・土壌

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
(15) bromacil 粒 (つづき)						処理。 継: 薬量・草種の検討。
(16) CS-1 水和 〔タンデッ クスD〕	カーブチレイト : メタ(3,3-ジ メチルウレイ ド)フェニルタ ーシャリーブ チルカーバメ イト……56% 2,4 PA: 2,4- ジクロルフェ ノキシ酢酸ナ トリウム ……27%	日本チバ ガイギー, 昭和電工	香川農試府中 分場。 (1)	{ ススキ・ササ・セイタカア ワダチソウ・ヨモギ等多年 生雑草および一年生雑草全 般} 茎葉兼土壌処理; 生育初 期; 100, 150 g.	実・ 継	実: {シバムギ・コウボウ ・ササ・ヨモギ・イタ ドリ・セイタカアワダ チソウ・クズ等多年生 雑草および一年生雑草 全般} 生育初期~中期, 100 ~150 g, 茎葉処理。 継: 草種の検討。
(17) CS-2 水和 〔タンデッ クス80〕	カーブチレイト ……80%	同 上	同 上 (1)	{ ススキ・ササ・セイタカア ワダチソウ・ヨモギ等多年 生雑草および一年生雑草全 般} 茎葉兼土壌処理; 生育初 期; 75, 100, 150 g.	実・ 継	実: {ススキ・チガヤ・サ サ・ヨモギ・セイタカ アワダチソウ等多年生 雑草および一年生雑草 全般} 生育初期~中期, 100 ~150 g, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の検討。
(18) 2,4-D・ dalapon ・diuron 水和 〔クイット リー〕	DPA ……9% DCMU ……7.5% 2,4 PA (Na) ……3.5%	同 上	北海道農試, 香川農試府中 分場。 (2)	{ ススキ・ヨモギ・タンポポ ・スギナ・スイバ・ギンギ シ・オオバコ等多年生雑草 および一年生雑草全般} 茎葉処理; 生育初期(スス キ草丈30cm以下時); 1000, 1500 g <20 l>.	実・ 継	実: {ススキ・チガヤ・サ サ・ヨモギ・セイタカ アワダチソウ・スギナ 等多年生雑草および一 年生雑草全般} 生育初期~中期, 1000 ~1500 g, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の検討。
(19) dalap- on・di- uron 水和 〔クサブラ ンカHS〕	DPA: 2,2-ジ クロルプロピ オン酸ナトリ ウム……53% DCMU ……30%	保土谷化 学工業	愛知農総試。 (1)	{ ススキ・チガヤ・タンポポ ・ヨメナ・ヨモギ・スギナ ・オオバコ等多年生雑草お よび一年生雑草全般} 茎葉兼土壌処理; 生育初 期~盛期(草高30~50cm); 250, 400 g.	実・ 継	実: {ススキ・チガヤ・カ ルカヤ・ヨモギ・スイ バ・スギナ等多年生雑 草および一年生雑草全 般} 生育初期~中期, 250 ~400 g, 茎葉処理。 継: 薬量・草種の検討。
(20) diuron 水和 〔カーメッ クスD〕	DCMU ……78.5%	デュボン ファーイ ースト 日 本支社	北海道中央農 試, 愛知農総 試, 福岡農総 試豊前分場。 (3)	{ ヨモギ・アレチノギク等の キク科多年生雑草および一 年生雑草全般} 茎葉兼土壌処理; 生育初 期; 100, 200 g, (展着剤: サーファクタントWK 1.5 cc/l 加用)。	実・ 継	実: {ヨモギ・セイタカア ワダチソウ等多年生雑 草および一年生雑草全 般} 生育初期~中期, 100 ~200 g, 茎葉処理。 継: 効果の確認。

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含 有 率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
21) DPX- 3674 水和 〔ベルパー〕	ヘキサジノン: 3-シクロヘ キシル-6- (ジメチルアミ ノ)-1-メチ ル-s-トリ アジン-2,4 -(1H, 3H) -ジオン ……90%	デュポン ファーイ ースト 日 本支社	大阪農技セン ター. (1)	〔ススキ・クズ・セイタカア ワダチソウ・イタドリ・ヨ シ・チガヤ等多年生および 一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 ～中期; 100, 150 g, (展着 剤: サーフアクタントW K 2cc/l 加用).	実・ 継	実:〔ススキ・チガヤ・シ バムギ・スイバ・セイ タカアワダチソウ・ス ギナ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 100 ～150 g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
22) EL-103 水和 〔ハービック〕	テブチュウロン : 1-(5-ター シャリ-ブチル -1,3,4-チ アジアゾール -2-イル)- 1,3-ジメチ ルウレア ……80%	武田薬品 工業	宮城畜試, 福 岡農総試験害 試験地. (2)	〔ススキ・ヨモギ・セイタカ アワダチソウ・ギンギン・ スギナ等多年生雑草および 一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期および中期; 50, 100, 120 g.	実・ 継	実:〔ススキ・ササ・ヨモ ギ・ギンギン・セイタ カアワダチソウ・クズ ・スギナ等多年生雑草 および一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 100 ～120 g, 茎葉処理. 継: 葉量・草種の検討.
23) EL-103 粒 〔ハービック〕	テブチュウロン ……5%	同 上	宮城畜試, 香 川農試府中分 場. (2)	〔ススキ・ヨモギ・セイタカ アワダチソウ・ギンギン・ スギナ等多年生および一年 生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期, 1000, 1500 g; 生育中 期, 1500, 2000 g.	実・ 継	実:〔ススキ・チガヤ・ヨ モギ・ギンギン・セイ タカアワダチソウ・ク ズ・スギナ等多年生雑 草および一年生雑草全 般〕 生育初期～中期, 1000 ～2000 g, 茎葉・土壌 処理. 継: 葉量・草種の検討.
24) HW-45A 水和 〔クサブラ ンカ, ゼ スト〕	DPA ……35% DCMU ……20% 2,4 PA (Na) ……10%	保土谷化 学工業	北海道農試, 香川農試府中 分場. (2)	〔ヨモギ・スイバ・セイタカ アワダチソウ・スギナ・ス スキ・チガヤ・ヨシ等多年 生雑草および一年生雑草全 般〕 茎葉処理; 生育中期～最 盛期(草丈30～50cm); 300, 450 g (セイタカア ワダチソウ・ススキ・チガ ヤ・ヨシ等主対象の場合 450, 600 g).	実・ 継	実:〔ススキ・チガヤ・サ サ・ヨモギ・スイバ・ セイタカアワダチソウ ・クズ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 300 ～600 g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期の検 討.
25) HW-45C 粒 〔クサブラン カ, ゼスト, クサダウ, クサノ, キンチョー カット〕	DPA ……10% 2,4 PA (Na) ……5% DCMU ……4%	同 上	同 上 (2)	〔ヨモギ・ギンギン・タンポ ポ・イタドリ・オオバコ・ クローバー・ヤブガラシ・ スイバ・セイタカアワダチ ソウ・アゼガヤ・ギョウギ シバ・カモジグサ・スギナ ・ススキ・チガヤ・ヨシな	実・ 継	実:〔ススキ・チガヤ・サ サ・ヨモギ・スイバ・ セイタカアワダチソウ ・クズ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 発生前～生育初期, 1500～3000 g, (茎葉・)

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
25 HW-45C 粒 (つづき)				ど〕 茎葉兼土壌処理; 発生前 ～草丈20cm位, セイタカ アワダチソウ・ススキ・ チガヤ・ヨシ等の場合は 2000, 3000 g; その他の 場合は 1500, 2000 g.		土壌処理. 継: 薬量・処理時期・草 種の検討.
26 同 上	DPA ……10% 2,4 PA (Na) ……5 % DCMU …4 %	保土谷化 学工業	香川農試府中 分場. (1)	〔ススキ・セイタカアワダチ ソウ・オオアワダチソウ〕 スポット・茎葉兼土壌処 理; 生育中期; 株直径30 cm 当り 30, 40 g.	実・ 継	実: 〔セイタカアワダチソ ウ等多年生雑草〕 生育中期, 株直径30cm 当り 30～40 g, スポット 茎葉・土壌処理. 継: 薬量・処理時期 (株 の大きさ)・草種の検 討.
27 HW-45H 粒 〔スーパー〕 〔ゼスト〕	DPA ……20% DCMU …10% アトラジン: 2 ークロルー 4 ーエチルアミ ノー 6ーイソ プロピルアミ ノー sートリ アジン ……10% テトラピオン: 2, 2, 3, 3ーテ トラフルオル プロピオン酸 ナトリウム ……3 %	同 上	同 上 (1)	〔セイタカアワダチソウ・オ オアワダチソウ・タンポポ ・スギナ・ヨモギ・チガヤ ・ススキなどの多年生雑草 および一年生雑草全般〕 土壌処理; 生育初期 (草 丈20cm以下); 1000, 1500, (2000) g.	実・ 継	実: 〔ススキ・チガヤ・ヨ モギ・セイタカアワダ チソウ・スギナ等多年 生雑草および一年生雑 草全般〕 生育初期～中期, 1000 ～2000 g, 茎葉・土壌 処理. 継: 効果の確認.
28 MN-1 微粒 〔ミカロッ ク, アト キレー〕	DPA ……10% DCMU …5 % 2,4 PA (Na) ……3 %	日本農薬, 三笠化学 工業	北海道滝川畜 試, 福岡農総 試鉦害試験地. (2)	〔セイタカアワダチソウ・タ ンポポ・スギナ・ヨモギ・ ギンギン・イタドリ・スイ バ等多年生雑草および一年 生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期 (草 丈20cm以下); 1350, 2250 g; 生育中期 (草丈20 cm以上); 2250, 3000 g.	実・ 継	実: 〔チガヤ・セイタカア ワダチソウ・スギナ等 多年生雑草および一年 生雑草全般〕 生育初期～中期, 2250 ～3000 g, 茎葉・土壌 処理. 継: 薬量・処理時期・草 種の検討.
29 MW-801 液 〔ハービエ ース〕	ビアラホス ……32%	明治製菓	北海道中央農 試, 宮城畜試, 植調研, 愛知 農総試, 大阪 農技センター, 福岡農総試鉦 害試験地. (6)	〔多年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育期; 100, 150, 200 ml.	実・ 継	実: 〔チガヤ・カルカヤ・ ギンギン・セイタカア ワダチソウ・ヤブガラ シ・スギナ等多年生雑 草および一年生雑草全 般〕 生育初期～中期, 100

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量> 等	判 定	判定内容・理由・その他
29) MW-801 液 (つづき)						～200 g, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期・草 種の検討。
30) NC-411 -HG 粒 〔ゲルバー KX, カ レター〕	TCA-Ca: ト リクロル酢酸 カルシウム ……20% DCMU ……4% 2,4 PA (Na) ……5%	日本カー リット	北海道滝川畜 試, 福岡農総 試鉾吉試験地。 (2)	〔セイタカアワダチソウ・ス ギナ・ヨモギ・ギンギシ・ イタドリ・ススキ・チガヤ ・クローバー等多年生雑草 および一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期(草丈20～30cm); 2000, 3000 g, 萌芽伸長前(11～ 4月ススキ・チガヤ); 2500, 4000 g.	実 ・ 継	実: 〔ススキ・ヨシ・ヨモ ギ・セイタカアワダチ ソウ・スギナ等多年生 雑草および一年生雑草 全般〕 発生前～生育初期, 3000～4000 g, 土壌処 理。 継: 薬量・処理時期・草 種の検討。
31) NC-412 -HW 水和 〔ゲルバー KX, ク サタイジ〕	TCA-Ca ……45% 2,4 PA ……30% DCMU ……5%	同 上	同 上 (2)	〔セイタカアワダチソウ・ス ギナ・ヨモギ・ギンギシ・ イタドリ・ススキ・チガヤ ・ツメクサ等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期(4月～5月中旬); 300, 400 g. 萌芽伸長前(11～ 3月); 350, 500 g.	実 ・ 継	実: 〔ススキ・ヨモギ・セ イタカアワダチソウ・ タンポポ・スギナ等多 年生雑草および一年生 雑草全般〕 発生前～生育初期, 300～500 g, 茎葉・土 壌処理。 継: 薬量・処理時期・草 種の検討。
32) NHS-50 粉 〔クサト ー ルFP, デゾレ ー トAZ, クロレ ー トS〕	塩素酸塩: 塩素 酸ナトリウム ……50% 炭酸塩: 炭酸ナ トリウム等 ……50%	三 草 会 〔昭和電 工, 日 本カー リット, 保土谷 化学工 業〕	北海道中央農 試, 大阪農技 センター。 (2)	〔多年生雑草全般および雑 草〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期～中期; 1500, 2500 g.	実 ・ 継	実: 〔チガヤ・ササ・ヨモ ギ・イタドリ・ワラビ ・スギナ等多年生雑草 および一年生雑草全般〕 生育初期～中期, 1500 ～2500 g, 茎葉処理。 継: 草種の検討。
33) NHS-60 水溶 〔クサト ー ルFP, デゾレ ー トA, ク ロレ ー トSL〕	塩素酸塩(Na) ……60% セスキ酸塩: セ スキ酸ナトリ ウム……30%	同 上	同 上 (2)	〔多年生雑草全般および雑 草〕 茎葉処理; 生育中期～後 期; 1000, 2500 g.	実 ・ 継	実: 〔ススキ・チガヤ・サ サ・ヨモギ・ギンギシ ・セイタカアワダチソ ウ・スギナ等多年生雑 草および一年生雑草全 般〕 生育初期～後期, 1000 ～2500 g, 茎葉処理。 継: 薬量・処理時期・草 種の検討。
34) NKG-1 水和 〔カヤパン チ〕	DPA ……30% アメトリン: 2 -メチルチオ -4-エチル アミノ-6-	日本化薬	北海道中央農 試, 宮城畜試, 植調研, 大阪 農技センター, 香川農試府中	〔セイタカアワダチソウ・タ ンポポ・ヨモギ・ススキ・ チガヤ・スイバ等多年生雑 草および一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期(草	実 ・ 継	実: 〔チガヤ・ヨシ・ヨモ ギ・ギンギシ・セイタ カアワダチソウ・スギ ナ等多年生雑草および 一年生雑草全般〕

薬剤名・剤型 〔商品名〕	有効成分および 含有率	委託者名	試験実施場所 (場所数)	〔対象雑草〕処理法; 処理時 期; 使用量/a <水量>等	判 定	判定内容・理由・その他
34 NKG-1 水和 (つづき)	イソプロピル アミノ- <i>s</i> - トリアジン ……20% MCPB ……15%		分場, 福岡農 総試験害試験 地. (6)	丈15~20cm位); 200, 300 g; 生育中期(草丈30 ~40cm位); 300, 400g.		生育初期~中期, 200 ~400 g, 茎葉処理. 継: 葉量・処理時期・草 種の検討.
35 SK-FA 水和 〔ファンタ ックスA〕	DCMU…30% メチルダイムロ ン: 1-(α , α - ジメチルベン ジル)-3- <i>フ</i> ェニルウレア ……25% 2,4 PA (Na) ……15%	昭和電工	愛知農総試. 福岡農総試豊 前分場. (2)	〔セイタカアワダチソウ・ヨ モギ・スギナ・ギンギン・ ハルジオン等多年生雑草お よび一年生雑草全般〕 茎葉処理; 生育初期; 200, 400 g.	実・ 継	実: 〔ヨモギ・ギンギン・ セイタカアワダチソウ ・スギナ等多年生雑草 および一年生雑草全般〕 生育初期, 200~400g, 茎葉処理. 継: 草種の検討.
36 SR-9P 粒 〔タンデッ クス〕	カーブチレイト ……4%	日本チバ ガイギー, 昭和電工	香川農試府中 分場. (1)	〔ススキ・ササ・セイタカア ワダチソウ・ヨモギなど多 年生雑草および一年生雑草 全般〕 土壌処理; 生育初期; 2000, 3000 g.	実・ 継	実: 〔シバムギ・ササ・ヨ モギ・セイタカアワダ チソウ・クズ・スギナ 等多年生雑草および一 年生雑草全般〕 生育初期, 2000~3000 g, 土壌処理. 継: 草種の検討.
37 VEL-26 ・2,4-D 粒 〔ラベージ PA〕	ブチダゾール: 1-(5-ター シャリーブチ ル-1,3,4- チアジャゾー ル-2-イル)- 3-メチル- 5-ハイドロ キシ-2-イ ミダゾリジノ ン……5% 2,4 PA (Na) ……2.5%	武田薬品 工業	北海道滝川畜 試, 大阪農技 センター. (2)	〔ススキ・チガヤ・ハルジオ ン・ヨモギ・セイタカアワ ダチソウ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 茎葉兼土壌処理; 生育初 期; 1000, 1500 g.(生育中 期; 1500, 2000 g).	実・ 継	実: 〔ススキ・チガヤ・ヨ モギ・ギンギン・セイ タカアワダチソウ・ス ギナ等多年生雑草およ び一年生雑草全般〕 生育初期~中期, 2000 ~3000 g, 茎葉・土壌 処理. 継: 葉量・処理時期・草 種の検討.

・1982年版・

除草剤・生育調節剤使用基準

■編集／(財)日本植物調節剤研究協会 ■発行／植調編集印刷事務所(全国農村教育協会内)

B5判／704頁／定価8,000円(送料350円)

1978年版発行以来4年が経過し、その間登録除草剤や都道府県の使用基準も大幅に変わりました。本書は、1982年2月現在登録されている除草剤・生育調節剤について、その登録内容・作用特性・理化学的性状を解説するとともに、各都道府県別の採用状況とその使用基準および注意事項を紹介しました。

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) ☎03(833)1821 振替・東京1-97736