

# 昭和56年度非農耕地用 除草剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和56年度非農耕地用除草剤試験成績検討会は、昭和57年9月21日(火)、植調会館3階会議室(東京都台東区台東1-26-6)において、試験場関係者および委託関係者87名参集のもと開催された。

試験9薬剤29試験(9点)、適用性試験20薬剤22試験(64点)について、試験担当者より報告があり、活発な討議の後に慎重な審議が行なわれた。

試験成績に対する判定結果は、次表のとおりである。

この検討会では、非農耕地用除草剤作用性試

昭和56年度 非農耕地用除草剤試験供試薬剤および判定結果一覧表

〔作用性試験〕

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                    | 有効成分および含有率                                                    | 委託者名                | 試験実施場所(場所数) | 〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/ha<水量>等                                         | 判定 | 判定内容・理由・その他  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| (1) HOE-866<br>液                   | グルホシネートアンモニウム; アンモニウム-(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)-メチルホスフィート……………20%   | ヘキスト<br>ジャパン        | 植調研<br>(1)  | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・ギシギシ〕<br>茎葉処理; 生育初期, 盛期, 後期; 100, 200 ml/10㎡。           | 継  | 適用性試験に移して検討。 |
| (2) MW-801<br>液<br>〔ハービーエース〕       | ピアラホス: 2-アミノ-4-[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフィノイル]ブチルアラニルアラニンナトリウム塩……………32% | 明治製菓                | 植調研<br>(1)  | 〔チガヤ・ヨモギ・ギシギシ・スギナ・ハマスゲ〕<br>茎葉処理; 生育初期, 盛期, 後期; 100, 150, 200 ml/10㎡。 | 継  | ハマスゲについて検討。  |
| (3) OK-180<br>乳                    | 成分未公開……………50%                                                 | 大塚化学<br>薬品          | 植調研<br>(1)  | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・ギシギシ〕<br>茎葉処理; 生育初期, 盛期, 後期; 100, 200 ml/10㎡。           | 継  | 薬量・処理時期の検討。  |
| (4) VEL-26<br>水和<br>〔ラベージ, ハイジョソー〕 | ブチダゾール: 3-(5-ターシャリ-ブチル-3,4-チアジアゾール-2-イル)-4-ハイドロキシ-            | ベルシコール パシフィック リミテッド | 植調研<br>(1)  | 〔ススキ・(ヨモギ・ギシギシ)・セイタカアワダチソウ〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育初期, 盛期; 80, 120 g          | 継  | 適用性試験に移して検討。 |

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                           | 有効成分および含有率                                                                                    | 委託者名              | 試験実施場<br>所(場所数) | 〔対象雑草〕処理法; 処理<br>時期; 使用量/a<水量>等                                                                                                                    | 判<br>定 | 判定内容・理由・その他  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| (4) VEL-26<br>水和<br>(つづき)                 | 1-メチル-2-イ<br>ミダゾリドン…75%                                                                       |                   |                 | g (展着剤 0.2% 加用).                                                                                                                                   |        |              |
| (5) GS-<br>29696<br>水和<br>〔エルボタ<br>ン〕     | チアザフルロン: 1,3<br>-ジメチル-3-(5<br>-トリフルオロメチ<br>ル-1,3,4-チアジ<br>アゾリル-2)-ウレ<br>ア……………80%             | プリマト<br>ール普及<br>会 | 植調研<br>(1)      | 〔チガヤ・ヨモギ〕<br>茎葉兼土壌処理; 萌芽<br>期, 生育初期, 盛期;<br>75, 100, 150 g <15~<br>20 l> (樹木の付近お<br>よび砂地での使用は避<br>ける).                                             | 継      | 適用性試験に移して検討. |
| (6) EL-103<br>水和<br>〔ハービッ<br>ク〕           | テブチュウロン: 3-<br>(5-(1,1-ジメチル<br>エチル)-1,3,4-チ<br>アジアゾール-2-イ<br>ル)-1,3-ジメチ<br>ルウレア……………80%       | 武田薬品<br>工業        | 植調研<br>(1)      | 〔セイタカアワダチソウ・<br>(スギナ)〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育<br>初期, 盛期; 50, 70g.<br>生育後期; 75, 100 g<br><15~20 l>.                                                         | 継      | 適用性試験に移して検討. |
| (7) BAYM-<br>ET-1486<br>水和<br>〔ウスチラ<br>ン〕 | エチアジムロン: 1-<br>(5-エチルスルホニ<br>ル-1,3-チアジア<br>ゾール-2-イル)-<br>1,3-ジメチルウレ<br>ア……………70%              | 日本特殊<br>農薬製造      | 植調研<br>(1)      | 〔ヨモギ・ギンギン・セイ<br>タカアワダチソウ・イタ<br>ドリ〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育<br>初期; 50, 75, 100 g.<br>生育盛期; 75, 150 g.<br><15~20 l>.                                          | 継      | 適用性試験に移して検討. |
| (8) SSH-43<br>水和<br>〔イソキシ<br>ール〕          | イソウロン: 3-(5-<br>ターシャリーブチル<br>-イソキサゾール-<br>3-イル)-1,1-ジ<br>メチルウレア…50%                           | 塩野義製<br>薬         | 植調研<br>(1)      | 〔ススキ・セイタカアワダ<br>チソウ〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育<br>初期, 盛期, 後期; ス<br>スキ…200, 300 g. セイ<br>タカアワダチソウ……<br>100, 200 g.                                             | 継      | 適用性試験に移して検討. |
| (9) NP-55<br>乳<br>〔ナブ〕                    | セトキシジム: 2-(N<br>-エトキシブチリジ<br>ル)-5-(2-エチ<br>ルプロピル)-3-ハ<br>イドロキシ-2-シ<br>クロヘキセン-1-<br>オン……………20% | 日本曹達              | 植調研<br>(1)      | 〔ススキ・チガヤ〕<br>茎葉処理; 生育初期・<br>ススキ…30 cm, チガヤ<br>…20cm および生育盛期<br>・ススキ…50 cm, チガ<br>ヤ…40 cm; 50, 100 ml<br><10~20 l>, マシン<br>油乳剤ラピサンスプレ<br>ー 0.4% 加用. | 継      | 使用方法について検討.  |

〔適用性試験〕

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕          | 有効成分および含有率               | 委託者名          | 試験実施場<br>所(場所数) | 〔対象雑草〕処理法; 処理<br>時期; 使用量/a<水量>等 | 判<br>定 | 判定内容・理由・その他                  |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| (1) bromac-<br>il-borate | ブロマシル: 5-プロ<br>ム-3-セカンダリ | 中外貿易,<br>東光化工 | 北海道農試,<br>茨城園試. | 〔一年生雑草全般〕<br>土壌処理; 生育初期(～       | 実      | 実: (一年生雑草全般)<br>生育初期(草丈30cm以 |

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                                   | 有効成分および含有率                                                                       | 委託者名                         | 試験実施場所<br>(場所数)                                             | 〔対象雑草〕処理法: 処理<br>時期; 使用量/ha < 水量 > 等                                                                                                          | 判定      | 判定内容・理由・その他                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) bromac-<br>il・borate<br>粒<br>〔ボロシル4〕<br>(つづき) | ーブチル-6-メチ<br>ルウラシル……4%<br>硼酸塩: 硼酸ナトリウ<br>ム……………94%                               |                              | (2)                                                         | 中(盛)期, (草たけ30<br>cm以下時); 800, 1000,<br>1200 g.                                                                                                |         | 下時), 800 ~ 1000 g,<br>土壌処理.<br>有用植物への薬害を出<br>す恐れのある場所での<br>使用は避ける.                                                             |
| (2) K-102<br>液<br>〔ナックス,<br>ドリグラ<br>ン〕            | パラコート: 1,1'-ジ<br>メチル-4,4'-ビピ<br>リジリウムジメチル<br>サルフェート<br>……………22.8%                | 小西安,<br>三菱商事                 | 北海道滝川<br>畜試, 茨城<br>園試, 愛知<br>農総試, 福<br>岡農総試豊<br>前分場.<br>(4) | 〔一年生雑草全般〕<br>茎葉処理: 生育初期;<br>40, 50 ml / < 15 l 前後 >.                                                                                          | 実       | 実: 〔一年生雑草全般〕<br>生育初期~中期, 35~<br>50 ml, 茎葉処理.                                                                                   |
| (3) MW-801<br>液<br>〔ハービエ<br>ース〕                   | ピアラホス……………32%                                                                    | 明治製菓                         | 北海道滝川<br>畜試, 茨城<br>園試, 福岡<br>農総試豊前<br>分場.<br>(3)            | 〔一年生雑草全般〕<br>茎葉処理: 生育初期~<br>中(盛)期(草たけ50cm<br>以下時); 30, 50, 75 ml /<br>< 10 ~ 15 l >.                                                          | 実       | 実: 〔一年生雑草全般〕<br>生育初期~中期, 50~<br>75 ml, 茎葉処理.                                                                                   |
| (4) RH-2915<br>乳<br>〔ゴール〕                         | オキシフローフェン<br>……………24%                                                            | 東京有機<br>化学工業                 | 北海道滝川<br>畜試, 愛知<br>農総試.<br>(2)                              | 〔一年生雑草全般〕<br>土壌処理: 生育初期(パ<br>ラコート30ml/haで処理<br>し, その14日後草丈5<br>cm以内); 20, 40 ml /<br>(展着剤: サーファクタ<br>ントWK 0.5%加用).                            | 実・<br>継 | 実: 〔一年生雑草全般〕<br>生育初期, 20~30 ml,<br>茎葉処理.<br>(イネ科優占地での使<br>用が望ましい).<br>継: 薬量の検討.                                                |
| (5) RH-2915<br>・D<br>水和<br>〔ゴールD〕                 | オキシフローフェン<br>……………30%<br>DCMU: 3-(3,4-<br>ジクロロフェニル)<br>-1,1'-ジメチルウ<br>レア……………30% | 三洋貿易                         | 北海道滝川<br>畜試, 愛知<br>農総試,<br>(2)                              | 〔一年生雑草全般(試験区<br>内にススキ・スギナがあ<br>れば観察調査)<br>茎葉処理: 生育初期~<br>中(盛)期(草たけ30cm<br>以下時); 30, 60 g / < 15<br>~ 20 l > (展着剤: サ<br>ーファクタントWK 0.5<br>%加用). | 実・<br>継 | 実: 〔一年生雑草全般〕<br>生育初期(草丈30cm以<br>下時), 30~50g, 茎葉<br>処理.<br>継: 処理時期・草種の検<br>討.                                                   |
| (6) bromac-<br>il<br>水和<br>〔ハイパー<br>X〕            | ブロマシル……………80%                                                                    | デュボン<br>ファーイ<br>ースト 日<br>本支社 | 北海道農試,<br>香川農試府<br>中分場, 福<br>岡農総試豊<br>前分場.<br>(3)           | 〔多年生雑草および一年生<br>雑草全般〕<br>茎葉兼土壌処理: 生育<br>初期~中(盛)期(草た<br>け50cm以下時); 100,<br>200 g / < 20 l >.                                                   | 実・<br>継 | 実: 〔チガヤ・ササ・ヨモ<br>ギ・ギンギシ・クロ<br>バー・スギナ等多年生<br>雑草および一年生雑草<br>全般〕<br>生育初期~中期(草丈<br>50cm以下時), 100 ~<br>200 g, 茎葉処理.<br>継: 薬量・草種の検討. |
| (7) bromac-<br>il・diuron                          | ブロマシル……………40%<br>DCMU……………40%                                                    | 同 上                          | 愛知農総試<br>香川農試府                                              | 〔多年生雑草および一年生<br>雑草全般〕                                                                                                                         | 実<br>継  | 実: 〔チガヤ・ヨモギ・ギ<br>ンギシ・セイタカアワ                                                                                                    |

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                                 | 有効成分および含有率                                                         | 委託者名              | 試験実施場所(場所数)                                     | 〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/畝<水量>等                                                                              | 判定  | 判定内容・理由・その他                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7) bromacil・diuron<br>水和<br>〔クローバー-I〕<br>(つづき) |                                                                    |                   | 中分場, 福岡農総試験地.<br>(3)                            | 茎葉兼土壌処理; 生育初期〜中(盛)期(草たけ50cm以下時); 100, 200 g <20 l>, (展着剤: サーフアクタント WK 加用).                               |     | ダチソウ等多年生雑草および一年生雑草全般) 生育初期〜中期(草丈50 cm以下時, 100 ~ 200 g, 茎葉処理.<br>継: 効果の確認(薬量・草種の検討).                                  |
| (8) bromacil・borate<br>粒<br>〔ボロシル4〕             | ブロマシル……………4 %<br>硼酸塩(Na) ……94%                                     | 中外貿易,<br>東光化工     | 大阪農技センター, 福岡農総試験地.<br>(2)                       | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・ギシギシ等多年生雑草全般〕<br>土壌処理; 生育初期〜中(盛)期(草たけ60cm以下時); 1200, 1500, 2000 g.                          | 実・継 | 実: 〔チガヤ・スイバ・クローバー・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期〜中期(草丈60 cm以下時), 1200 ~ 2000 g, 土壌処理.<br>継: 薬量・草種・土壌の種類と効果の検討.         |
| (9) 2,4-D・dalapon・diuron<br>水和<br>〔デストラール〕      | DPA……………41.7 %<br>2,4 PA (Na) ……9.8 %<br>DCMU ……19.5 %             | 同上                | 北海道農試, 大阪農技センター, 香川農試府中分場.<br>(3)               | 〔多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育初期〜中(盛)期; 150, 300 g <15~20 l>.                                          | 実・継 | 実: 〔ススキ・ヨモギ・スイバ・セイタカアワダチソウ・フキ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期〜中期, 150 ~ 300 g, 茎葉処理.<br>継: 草種の検討.                       |
| (10) dalapon・dichlobenil<br>粒<br>〔ハダスン〕         | DBN : 2,6-ジクロルベンゾニトリル……………3 %<br>DPA : 2,2-ジクロルプロピオン酸ナトリウム……………12% | 兼 商               | 北海道滝川畜試, 茨城園試, 愛知農総試, 香川農試府中分場, 福岡農総試験地.<br>(5) | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・スイバ・タンポポ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>土壌処理; 生育初期(草たけ30cm以下時, 土壌水分が多い時が望ましい); 1500, 2000, 2500 g. | 実・継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・ギシギシ・ヤブガラシ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>発生前〜生育初期(草丈30cm以下時), 1500 ~ 2500 g, 土壌処理.<br>継: 効果の変動要因, 散布方法の検討. |
| (11) diuron<br>水和<br>〔カーメックスD〕                  | DCMU……………78.5%                                                     | デュボン<br>ファースト日本支社 | 茨城園試, 香川農試府中分場, 福岡農総試験地.<br>(3)                 | 〔多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育初期〜中(盛)期(草たけ50cm以下時); 100, 200 g <20~30 l>. (展着剤: サーフアクタント WK 0.2%加用).   | 実・継 | 実: 〔ヨモギ・ギシギシ・セイタカアワダチソウ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期〜中期(草丈50 cm以下時), 100 ~ 200 g, 茎葉処理.<br>継: 草種の検討.                 |
| (12) DPX-3674<br>粒<br>〔ベルパー〕                    | ヘキサジノン : 3-シクロヘキシル-6-(ジメチルアミノ)-1-メチル-s-トリ                          | 丸和バイ<br>オケミカル     | 北海道滝川畜試, 茨城園試, 愛知農総試, 大                         | 〔ススキ・チガヤ・セイタカアワダチソウ・イタドリ等多年生雑草および一年生雑草全般〕                                                                | 実・継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・カモガヤ・ヨモギ・ギシギシ・セイタカアワダチソウ・クローバー等                                                                          |

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                         | 有効成分および含有率                                                                                                                    | 委託者名         | 試験実施場所(場所数)                               | 〔対象雑草〕処理法; 処理時期; 使用量/a<水量>等                                                                                                                                                 | 判定  | 判定内容・理由・その他                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (12) DPX-3674 粒<br>(つづき)                | アジン-2,4-(1H, 3H)-ジオン<br>……………4.5%                                                                                             |              | 阪農技センター, 香川農試府中分場, 福岡農総試鉦害試験地.<br>(6)     | 土壌処理; 発生初期～中(盛)期; 500, 1000, 2000 g.                                                                                                                                        |     | 多年生雑草および一年生雑草全般)<br>生育初期～中期, 1000 2000 g, 茎葉・土壌処理.<br>継: 効果の確認.                                                                                                                                        |
| (13) HOE-866 液                          | グルホシネートアンモニウム……………20%                                                                                                         | ヘキスト<br>ジャパン | 北海道農試, 愛知農総試, 香川農試府中分場, 福岡農総試豊前分場.<br>(4) | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>茎葉処理; 生育中(盛)期まで; 100, 200 ml<10 l>.                                                                                                        | 継   | 試験年次・例数不足.                                                                                                                                                                                             |
| (14) HW-45 H <sup>Ⓔ</sup> 粒<br>〔ブッシュロン〕 | アトラジン: 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-s-トリアジン……………5%<br>DCMU……………5%<br>DPA……………10%<br>テトラピオン: 2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム……………1.5% | 保土谷化学工業      | 植調研, 香川農試府中分場, 福岡農総試鉦害試験地.<br>(3)         | 〔ススキ・セイタカアワダチソウ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>土壌処理; 生育初期～中(盛)期(草丈50cm以下時); 800, 1500, 2000 g.<br><br>〔ススキ・チガヤ・ササ・クズ・ハマスゲ等多年生雑草(スポット処理)〕<br>土壌処理; 生育初期～中(盛)期(草丈50cm以下時); 2500, 3500 g. | 実・継 | 実: 〔ヨモギ・スイバ・セイタカアワダチソウ・クサイ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期～中期(草丈50cm以下時), 1500～2000 g, 茎葉・土壌処理.<br>継: 効果の確認.<br><br>実: 〔チガヤ・ヨモギ・スギナ・クサイ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期～中期, 2500～3500 g, スポット, 茎葉・土壌処理.<br>継: 効果の確認. |
| (15) MW-801 液<br>〔ハービーエース〕              | ビアラホス……………32%                                                                                                                 | 明治製菓         | 北海道農試, 大阪農技センター, 福岡農総試鉦害試験地.<br>(3)       | 〔多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>茎葉処理; 生育初期～中(盛)期; 100, 150, 200 ml<10～15 l>.                                                                                                           | 実・継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ・ギンギン・セイタカアワダチソウ・ヤブガラシ・フキ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕<br>生育初期～中期, 150～200 ml, 茎葉処理.<br>継: 薬量・草種の検討.                                                                                            |
| (16) NC-021-HG 粒<br>〔ハイジョーソ- V〕         | ブチダゾール……………5%<br>2,4 PA (Na)……………5%                                                                                           | 日本カーリット      | 北海道滝川畜試, 香川農試府中分場, 福岡農総試鉦害試験地.            | 〔ススキ・セイタカアワダチソウ・ヨモギ・ギンギン・カタバミ・スギナ等多年生雑草および一年生雑草全般〕                                                                                                                          | 実・継 | 実: 〔ススキ・カモガヤ・ヨモギ・スイバ・セイタカアワダチソウ・ワラビ等多年生雑草および一年生雑草全般〕                                                                                                                                                   |

| 薬剤名・剤型<br>〔商品名〕                            | 有効成分および含有率                                          | 委託者名        | 試験実施場<br>所(場所数)                                                                                  | 〔対象雑草〕処理法: 処理<br>時期; 使用量/畓<水量>等                                                                                          | 判<br>定  | 判定内容・理由・その他                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (16) NC-021<br>-HG<br>粒<br>(つづき)           |                                                     |             | 験地.<br>(3)                                                                                       | 土壌処理; 生育初期～<br>中期; 1200, 2500 g.                                                                                         |         | 生育初期～中期, 1200<br>～2500 g, 茎葉・土壌<br>処理.<br>継: 薬量・草種の検討.                                                                                       |
| (17) NC-022<br>-HW<br>水和<br>〔ハイジョ<br>ソ-V〕  | ブチダゾール……50%<br>2,4 PA (Na)……20%                     | 日本カー<br>リット | 北海道滝川<br>畜試, 愛知<br>農総試, 福<br>岡農総試鉦<br>害試験地.<br>(3)                                               | 〔ススキ・セイタカアワダ<br>チソウ・ヨモギ・ギンギ<br>シ・カタバミ・スギナ等<br>多年生雑草および一年生<br>雑草全般〕<br>茎葉兼土壌処理; 生育<br>初期～中期; 100, 200<br>g <15～20 l>.     | 実・<br>継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・サ<br>サ・ヨモギ・ギンギシ<br>・セイタカアワダチソ<br>ウ・ワラビ等多年生雑<br>草および一年生雑草全<br>般〕<br>生育初期～中期, 100<br>～200 g, 茎葉処理.<br>継: 草種の検討.                    |
| (18) OK-180<br>乳                           | 成分未公開……50%                                          | 大塚化学<br>薬品  | 植調研, 大<br>阪農技セン<br>ター.<br>(2)                                                                    | 〔チガヤ・ギンギシ等多年<br>生雑草および一年生雑草<br>全般〕<br>茎葉処理; 生育初期～<br>中(盛)期(草たけ30cm<br>前後); 50, 100 ml <10<br>～15 l>.                     | 継       | 成分未公開.<br>試験年次・例数不足.                                                                                                                         |
| (19) SW-792<br>水溶                          | テトラピオン…3.7%<br>スルファミン酸塩: ス<br>ルファミン酸アンモ<br>ニウム……80% | 三 共         | 北海道滝川<br>畜試, 茨城<br>園試, 愛知<br>農総試, 大<br>阪農技セン<br>ター, 香川<br>農試府中分<br>場, 福岡農<br>総試鉦害試<br>験地.<br>(6) | 〔ススキ・ヨシ・ヨモギ・<br>セイタカアワダチソウ・<br>スギナ等多年生雑草およ<br>び一年生雑草全般〕<br>茎葉処理; 生育後期(開<br>花初期～上長生長完了<br>期); 1000, 1500 g <5<br>～7.5 l>. | 実・<br>継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・ヨ<br>シ・ササ・ヨモギ・イ<br>タドリ・セイタカアワ<br>ダチソウ・クズ・スギ<br>ナ等多年生雑草および<br>一年生雑草全般〕<br>生育後期, 1000～1500<br>g, 茎葉処理.<br>継: 薬量・水量・処理時<br>期・草種の検討. |
| (20) VEL-26<br>・2,4-D<br>粒<br>〔ラベージ<br>PA〕 | ブチダゾール……5%<br>2,4 PA (Na)<br>……2.5%                 | 武田薬品<br>工業  | 北海道滝川<br>畜試, 大阪<br>農技センタ<br>ー.<br>(2)                                                            | 〔ススキ・チガヤ・ヨモギ<br>・セイタカアワダチソウ<br>・ハルジオン等多年生雑<br>草および一年生雑草全般〕<br>土壌処理; 生育初期;<br>1000, 2000 g. 生育中<br>期; 1500, 3000 g.       | 実・<br>継 | 実: 〔ススキ・チガヤ・ヨ<br>モギ・ギンギシ・セイ<br>タカアワダチソウ・ス<br>ギナ等多年生雑草およ<br>び一年生雑草全般〕<br>生育初期～中期, 2000<br>～3000 g, 土壌処理.<br>継: 薬量・草種の検討.                      |

### 本誌掲載原稿の募集

本誌を愛読されている皆様より, 原稿を募集しておりますので, ご寄稿下さい。内容は, 除  
草剤・生育調節剤に関する記事であればよく, 400字詰原稿用紙で20～30枚位, 図・写真の挿  
入も可。原稿料は, 当協会の規程によりお支払いいたします。