

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 ○商品名	有効成分および 含有率(%)	委託者名	試験実施 場所 (場所数)	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品 /a)等; 処理方法	新継 の別	判定理由 または内容
						今回 判定	
2. メロン (ノーネット 系品種) 〔ハウスト ンネル促 成など〕 (S.57春夏)	(1) KT-30 液	N-(2-クロル -ピリジル)-N -フェニル尿素 …… 0.4	協和醗酵 工業	千葉農試砂 地野菜研 (1)	適用性〔着果増進〕 開花前日, 当日, 翌日; 〔塗布〕200~1000 ppm. 〔散布〕10~100 ppm; 果 梗部塗布または子房部散 布処理.	継続 実・継	実: (プリンス 系メロン; ハ ウスまたは トンネル(マ ルチを含む); 着果促進) (1)果梗部塗 布処理; 開 花前~当日; 500 ppm (2)子房部散 布; 開花前 ~当日; 10 ~50 ppm 継: 処理濃度, 処理時期, 品 種について
3. ショウガ 〔露地普通〕 (S.57春夏)	(1) ethephon 液 ○エスレル 〔ACP-68 -250〕	エテホン …… 10	2,4-D 協 議 会	千葉農試砂 地野菜研 (1)	適用性〔種の休眠打破によ る萌芽促進および増収〕 種ショウガ掘り取り後 (休眠中); 500, 1000 ppm; 20~30分間 浸漬 処理.	継続 継	・効果の確認, 混合処理に ついて.
4. カーネ ーショ ン 〔ハウス〕 (S.57春夏)	(1) MGC-1 液	過酸化水素 …… 35	三菱瓦斯 化学	神奈川園試, 兵庫農総セ ンター農試 (2)	適用性〔活着および生育促 進〕 定植時より採花完了まで の灌水時1週間毎; 2000, 1000, 500倍液 10 /m ² ; 土壌灌注処理.	継続 継?	・試験結果不 一致, 効果 不十分.

編 集 後 記

失なわれる前に願いたいものだ。

今年の梅雨も陽性型。ここ数年陽性型が続いているが、これは異常気象を物語っているのかも知れぬ。昨年の梅雨あけの頃、山陰地方を襲った集中豪雨は大きな被害をもたらし、尊い人命を多数奪うという悲劇を招いてしまった。今年も、同じように集中豪雨が各地を襲うであろうが、悲劇を二度と繰り返すことのないように祈るのみである。ことに農業は自然に支配されるので、自然の営みに抗することはできないが、人間の知恵はこれを征服してきた。しかし、そのための土木事業には金をともなうが、人命の

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都台東区台東1丁目26番6号

電話 東京(03) 832-4188 (代)

昭和59年6月発行

植調第18巻第3号 ￥300(送料170)

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉沢長人

発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03) 833-1821 番(代)