

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和58年3月1日～59年7月14日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 場所	作 物 名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	適用土壌	使用 方法	適用地帯	登録会社
プレチ ラクロ ール粒 剤	ソルネ ット粒 剤	2-クロロ-2, 6'-ジエチル- N-(2-プロポ キシエチル)アセ トアニリド ……2.0%	粒 剤		移 植 水 稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ヘラオモダ カ・ミズガ ヤツリ	移植直後～ 移植後10日 〔ノビエの 1.5葉期 まで〕	3kg	壤土～埴 土（減水深 2cm/日 以下） 〔ただし、 東北・ 北陸で は砂壤 土（減 水深1 cm/日 以下） も含む〕	湛 水 散 布	九州・南 四国の暖 地を除く 全域の普 通期およ び早期栽 培地帯	日本チバ ガイギー、 クミアイ 化学工業、 武田薬品 工業。
						水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ミズガヤツ リ	移植直後～ 移植後7日 〔ノビエの 1.5葉期 まで〕				九州・南 四国の暖 地の普通 期および 早期栽培 地帯	
ナプロ アニリ ド・プ レチラ クロー ール粒 剤	ヨート ル粒剤	α-(2-ナフト キシ)プロピオン アニリド ……7.0% 2-クロロ-2, 6'-ジエチル- N-(2-プロポ キシエチル)アセ トアニリド ……2.0%	粒 剤		移 植 水 稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ヘラオモダ カ・ウリカ ワ・ミズガ ヤツリ	移植後3～ 10日 〔ノビエの 1.5葉期 まで〕	3～4 kg	壤土～埴 土（減水 深2cm /日以下） 〔ただし、 東北・ 北陸で は砂壤 土（減 水深1 cm/日 以下） を含む〕	湛 水 散 布	九州・南 四国の暖 地を除く 普通期お よび早期 栽培地帯	武田薬品 工業、三 井東圧化 学、日本 チバガイ ギー
							移植後3～ 7日 〔ノビエの 1.5葉期 まで〕				九州・南 四国の暖 地の普通 期および 早期栽培 地帯	
ピラゾ レート ・プレ チラク ロール 粒剤	クサホ ープ粒 剤	4-(2,4-ジク ロロベンゾイル) -1,3-ジメチ ル-5-ピラゾ リル-P-トル エンスルホネー ト……6.0% 2-クロロ-2, 6'-ジエチル- N-(2-プロポ キシエチル)アセ トアニリド ……1.5%	粒 剤		移 植 水 稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ウリカワ・ ヘラオモダ カ・ミズガ ヤツリ・ヒ ルムシロ	移植直後～ 移植後10日 〔ノビエ1.5 葉期まで〕	3～4 kg	砂壤土～ 埴土（減 水深2cm /日以下）	湛 水 散 布	近畿以西 の普通期 を除く全 域の普通 期および 早期栽培 地帯	三共、北 海三共、 九州三共、 日本チバ ガイギー、 クミアイ 化学工業
							移植直後～ 移植後7日 〔ノビエ1.5 葉期まで〕				近畿以西 の普通期 栽培地帯	

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 場所	作物 名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	適用土壌	使用 方法	適用地帯	登録会社
グルホ シネー ト液剤	バスタ 液剤	アンモニウム＝ DL－ホモアラ ニン－4－イル (メチル)ホスフ ィナート …… 18.5%	液 剤		桑	一年生雑草	春期萌芽前 および夏切 後萌芽前(雑 草生育期)	500 ml を10a 当り 100～ 150 l 散布		雑 草 茎 葉 散 布		ヘキスト ジャパン
					鉄道 ・公園 ・庭園 ・堤 とう ・駐 車場 ・道 路 ・運 動 場 ・宅 地 ・の り 面 等	一年生雑草	雑草生育期	500～ 1000 mlを10 a当り 100～ 200 l 散布				
						多年生雑草		1000～ 2000 mlを10 a当り 100～ 200 l 散布				
ビアラ ホス液 剤	ハービ エース 液剤	L－2－アミノ －4－[(ヒドロ キシ)(メチル) ホスフィノイル] ブチリル－L－ アラニル－L－ アラニンのナト リウム塩 …… 32.0%	液 剤		花木	畑地一年生 雑草	雑草生育期 (草丈20cm 以下)	300～ 500ml を10a 当り 100～ 150 l 散布		雑 草 茎 葉 散 布		明治製菓
					桑		春期萌芽前 および夏切 後(雑草生 育期)					
					日本芝		休眠期(雑 草生育期)					

新登録生育調節剤一覽

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和58年3月1日～59年7月14日

種類名	商品名	有効成分の種類および 含有率	剤 型	作物名	使用目的	使用時期	10a当り 使用量	10a当り 散布液量	使用 方法	適用 地帯	登録会社
クロル メコー ト液剤	サイコ セル	2－クロロエチルトリ メチルアンモニウム＝ クロリド …… 46.0%	液 剤	小 麦 (春播)	茎稈の伸 長抑制	6葉期前後 (草丈30～ 40cm)	200 ml	100～ 120 l	茎葉 散布 (1回)	北海 道	日本サイ アナミッド、 北海三共