

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用 場所	作物 名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	適用土壌	使用 方法	適用地帯	登録会社
グルホ シネー ト液剤	バスタ 液剤	アンモニウム＝ DL－ホモアラ ニン－4－イル (メチル)ホスフ ィナート …… 18.5%	液 剤		桑	一年生雑草	春期萌芽前 および夏切 後萌芽前(雑 草生育期)	500 ml を10a 当り 100～ 150 l 散布		雑 草 茎 葉 散 布		ヘキスト ジャパン
					鉄道 ・公園 ・庭園 ・堤 とう ・駐 車場 ・道 路・ 運動 場・ 宅地 ・の り面 等	一年生雑草	雑草生育期	500～ 1000 mlを10 a当り 100～ 200 l 散布				
						多年生雑草		1000～ 2000 mlを10 a当り 100～ 200 l 散布				
ビアラ ホス液 剤	ハービ エース 液剤	L－2－アミノ －4－[(ヒドロ キシ)(メチル) ホスフィノイル] ブチリル－L－ アラニル－L－ アラニンのナト リウム塩 …… 32.0%	液 剤		花木	畑地一年生 雑草	雑草生育期 (草丈20cm 以下)	300～ 500ml を10a 当り		雑 草 茎 葉 散 布		明治製菓
					桑		春期萌芽前 および夏切 後(雑草生 育期)	100～ 150 l 散布				
					日本芝		休眠期(雑 草生育期)					

新登録生育調節剤一覽

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和58年3月1日～59年7月14日

種類名	商品名	有効成分の種類および 含有率	剤 型	作物名	使用目的	使用時期	10a当り 使用量	10a当り 散布液量	使用 方法	適用 地帯	登録会社
クロル メコー ト液剤	サイコ セル	2－クロロエチルトリ メチルアンモニウム＝ クロリド …… 46.0%	液 剤	小麦 (春播)	茎稈の伸 長抑制	6葉期前後 (草丈30～ 40cm)	200 ml	100～ 120 l	茎葉 散布 (1回)	北海 道	日本サイ アナミッド、 北海三共