

区 分	薬 剤 名	処理法	処理時期	使 用 量 製 品	適用土壌	適用地帯	使 用 上 の 注 意
いぐさ	<u>N⁶ベンジルアデ</u> <u>ニン</u> 液	茎 葉	長い茎 発生初期 ～盛期	15 m/a	砂壤土～埴 土	温暖地西部 暖地	① 落水して50 l/aを如露で全面 散布.

注) ① アンダーライン(実線)は、本年度拡大または追加された部分である。なお、薬剤名のアンダーラインは、本年度はじめて使用基準の作成されたものである。

② アンダーライン(点線)は、その一部が拡大されたものである。

昭和57年度常緑果樹関係除草剤・生育調節剤 一部判定保留分の判定結果について

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和58年2月24日に開催された昭和57年度常
緑果樹関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会
において、「判定保留」となっていた除草剤1
剤、生育調節剤8剤について、昭和58年8月5

日、福岡県「博多グリーンホテル会議室」にお
いて、試験場関係者45名、委託関係者40名出席
のもとに慎重に検討し審議した結果、下記の通
り判定されたので、ここに報告する。

昭和57年度常緑果樹関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤(判定保留分)の判定結果一覧表

I. 除 草 剤

対象果樹 〔品種名〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (場所数)	試験の種類(ねらい, 対象雑草) 処理時期; 散布薬量(製品/a); <水量/a>; 処理方法等	新 継 の 別 今 回 判 定	判定理由または内容
カンキツ 類	(1) KH-212 粒 (カッター) 〔兼 商〕	DBN: 2,6-ジ クロロベンゾ ニトリル…3 DCMU: 3-(3, 4-ジクロロ フェニル)-1, 1-ジメチル 尿素………2	神奈川園試根 府川分場, 愛 知農総試蒲郡 支所, 佐賀果 試. (3)	適用性〔早春期処理による効果, 被害の検討, 雑草全般〕 12～2月頃, 雑草発生前～始 期(草丈5cmまで); 600, 900, 1200 g; 土壌処理.	継続 実・継	実:〔柑きつ類; 雑草 全般〕 12～2月, 雑草発 生前～始期(草丈 5cm以下), 0.9～ 1.2kg, 土壌処理. (但し処理後の中 耕はしない). 継: 処理時期, 薬量 の検討.
<自主試 験>	• DPX- 5648 ドライフロ アブル • bromacil 水和 (ハイパーX)		果樹試口之津 支場			

Ⅱ. 生 育 調 節 剤

対象果樹 〔品種名〕	薬剤名・剤型 〔商品名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 〔場所数〕	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a); ＜水量/a＞; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
カンキツ 類 〔晩柑類〕	(1) CS-1 水和 〔白石カルシ ウム〕	カルシウム塩類 ……………95 その他……………5	果樹試口之津 支場, 四国農 試, 静岡柑試 伊豆分場, 三 重農技センタ ー紀南柑橘セ ンター, 和歌 山果園試紀北 分場, 広島果 試柑橘試験地, 愛媛果試, 高 知果試, 福岡 農総試園研, 熊本果試, 宮 崎総農試亜熱 帯作物支場, 鹿児島果試. (12)	適用性〔品質向上〕 100～50倍; 立木全面処理. ＜比較＞クレフノン50倍液. ＊詳細については試験成績集録 参照.	新規 継	・試験年次不足. 夏ミカン; 前期散 布の検討, ミズグ サレ対策. 八朔; 前期散布の検討. 伊予柑; 前期・後 期散布の検討. ネ ーブル; 前期散布 の検討, ヘタ枯れ について. ボンカ ン・セミノール・ 日向夏; 前期散布 の検討, ミズグサ レ対策.
〔晩柑類〕	(2) J-455 乳 〔フィガロン〕 〔日産化学工 業〕	エチクロゼート : エチル-5- クロロ-1 H -3-インダ ゾリルアセテ ート ……20	三重農技セン ター紀南柑橘 センター, 長 崎果試. (2)	適用性〔品質向上〕 ・満開後60～70日および80～ 90日(2回); 2000倍. ・満開後80～90日および110 ～120日(2回); 2000倍. ＊詳細については試験成績集録 参照.	継続 実・ 継	・判定済.
〔晩柑類〕	(3) AXF- 1072 液 〔ユニオンカー バイド日本〕	ジクロルプロッ プ: 2,4-ジク ロルフェノキ シ-2-プロ ピオニックア シッド トリ エタノールア ミン塩……………10	果樹試口之津 支場, 四国農 試, 広島果試 柑橘試験地, 愛媛果試, 熊 本果試. (5)	適用性〔冬期落下防止効果の適 用品種拡大〕 冬期収穫前; 200, 300 ppm; 立木全面処理.	継続 実・ 継	実:〔夏ミカン・伊予 柑・ネーブル・河 内晩柑; 冬期落果 防止, ヘタ落ち防 止〕 11月下旬～収穫20 日前まで, 200～ 300 ppm; 立木全 面散布. 継: 処理方法および 他の樹種について.
〔伊予柑〕	(4) GR-58 乳 〔マデック〕 〔兼商〕	MCPB: 2-メ チル-4-ク ロロフェノキ ン酪酸エチル ……………20	果樹試興津支 場, 同口之津 支場, 山口大 島柑試, 愛媛 果試. (4)	適用性〔冬期落下防止およびヘ タ落ち防止〕 収穫前20, 10日頃; 5000～ 3000倍〔30～40 l〕; 立木全 面処理.	継続 実・ 継	実:〔伊予柑: ヘタ落 ち防止〕 収穫20日前, 5000 ～3000倍液, 立木 全面散布. 継: 品種および濃度 について.
〔ネーブル〕	(5) GR-58 乳	同 上	静岡柑試西遠 分場, 山口大	適用性〔冬期落下防止およびヘ タ落ち防止〕	新規 継	・試験年次不足.

対象果樹 〔品種名〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (場所数)	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a); ＜水量/a＞; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
カンキツ 類 (つづき)	(5) GR-58 乳 (つづき) 〔兼商〕		島柑試, 愛媛 果試, 熊本果 試. (4)	収穫前20, 10日頃; 3000, 2000(, 1000)倍＜30~40l＞; 立木全面処理.		
〔甘夏柑〕	(6) GR-58 乳 〔兼商〕	MCPB: 2-メ チル-4-ク ロロフェノキ シ酪酸エチル ……………20	果樹試口之津 支場, 静岡柑 試伊豆分場, 和歌山果園試 試験地, 熊本 果試, 大分柑 試津久見分場. (5)	適用性〔冬期落下防止およびヘ タ落ち防止〕 収穫前20, 10日頃; 3000, 2000(, 1000)倍＜30~40l＞; 立木全面処理.	新規 継	・試験年次不足.
＜自主試 験＞ 〔甘夏柑〕 〔他〕	GR-58 乳 〔兼商〕	同 上	和歌山果園試 試験地, 山口 大島柑試, 熊 本果試.			
＜自主試 験＞ 〔日向夏〕	・AXF- 1072液 ・GR-58乳		高知果試.			
〔温州ミ カン他〕	(7) AP-80 水和 (アブロン) 〔日東粉化工 業〕	炭酸カルシウム ……………95 湿展剤……………5	鹿児島果試. (1)	適用性〔浮皮軽減および予措〕 10月下旬~収穫直前; 100~ 50倍, 1~2回; 立木全面処 理. ＜比較＞クレフノン.	継続 実	・判定済.
〔温州ミ カン〕	(8) 改良C- MH液 (エルノー) 〔日本ヒドラ ジン工業〕	マレイン酸ヒド ラジドコリン ……………39	鹿児島大学. (1)	作用性〔夏秋梢伸長抑制および 品質向上〕 ＊詳細については試験成績集録 参照.	新規 継	・判定済.
＜自主試 験＞ 〔伊予柑〕 〔他〕	GA ₃		果樹試口之津 支場, 愛媛果 試, 熊本果試.			

★新刊

日本原色アブラムシ図鑑

森津孫四郎/著

A5判・550頁・カラー写真600点・定価6,800円

★新刊

原色図鑑 衛生害虫と衣食住の害虫

安富和男・梅谷猷二/著

B6判・310頁・カラー写真317点・定価4,000円

全国農村教育協会

東京都台東区台東1-26-6(植調会館) 〒110 ☎03(833)1821