

薬剤名・剤型 (商品名) [旧試験名等] [委託者名]	有効成分および含有量(%)	試験実施場所 (場所数)	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a); 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
11. SSH-55 乳 (つづき) [塩野義製薬]	ルイジン …… 14 プロメトリン …… 6	(5)			100 ml, 土壌処理. 継: 薬量等について.
12. SSH-55 粒 [塩野義製薬]	トリフルラリン …… 2.1 プロメトリン …… 0.9	岩手蚕試, 群馬蚕試, 山梨蚕試, 鳥取蚕試, 熊本蚕試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 春期および夏期, 雑草発生前; 500, 600, 700 g; 土壌処理.	新規 実・ 継	実: 〔一年生雑草全般〕 春夏期, 桑発芽前, 雑草発生前, 600 ~700 g, 土壌処理. 継: 薬量等について.

B. 生育調節剤

薬剤名・剤型 (商品名) [旧試験名等] [委託者名]	有効成分および含有量(%)	試験実施場所 (場所数)	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a); 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
1. benzyladenine 液 (ヘルボス) [BA] [興人]	N ⁶ -ベンジルアデニン …………… 1.7	蚕糸試, 福島蚕試, 群馬蚕試. (3)	基礎〔「全芽育成法」等の再発促進効果〕 * 詳細については試験成績集録参照.	継続 継	・ 壮蚕用桑の再発芽促進について.
2. FR-6490 乳 [藤沢薬品工業]	未 公 開 …………… 85	蚕糸試. (1)	基礎〔側枝発生促進等について〕 * 詳細については試験成績集録参照.	継続 中止	・ 効果不明確, 薬害あり.

昭和59年度春夏作野菜花き関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和59年度春夏作野菜花き関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は, 昭和59年12月12~13日, 虎ノ門パストラル(東京都港区虎ノ門4-1-1)において開催された。

この検討会には, 試験場関係者80名, 委託関

係者等86名, 計166名が参集し, 20作物に対する除草剤60試験226点, 23作物に対する生育調節剤28試験66点および前回未検討除草剤5試験8点, 生育調節剤2試験3点について試験成績の報告後, 慎重な検討が行なわれた。

その判定結果については、次表に示すとおりである。

昭和59年度 春夏作野菜花き関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定表

I. 除 草 剤

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい、対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新 規 の 別 今 回 判 定	判定理由または内容 〔前回判定〕
1. 野菜一般 〔マルチ栽培〕	(1) pendimethalin 乳 (ゴーゴーサン) (ANK-553) 〔ゴーゴーサン普及会 (事:日本サイアナミッド)〕	ペンディメタリン: N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン …… 30	野菜試験岡山支場, 同久留米支場. (2)	基礎〔マルチ栽培での安全性の検討, 畑地一年生雑草全般〕は種または定植前後のマルチ前, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; 全面土壌処理.	新規 継	・タマネギ・ニンジン等他の登録作物および適用拡大作物について.
〔露地普通〕	(2) TM-362 乳 〔トーマン〕	未 公 開 …… 48	野菜試験岡山支場, 同久留米支場, 植調研. (3)	基礎〔処理時期・使用量・温度等と薬害との関係についての解析, 一年生イネ科雑草全般〕 ・は種または定植後, 一年生イネ科雑草 2~3 葉期; ・生育期, 一年生イネ科雑草 5~6 葉期; 5, 7.5, 10 ml; 全面茎葉処理. 〈比較〉 クサガード水溶剤 10, 15g.	継続 (継)	・適用性試験の実施.
2. キャベツ 〔春~夏まき露地移植〕	(1) Hoe-171 ①乳 〔ヘキストジャパン, 三共〕	フェノキサプロップエチル: エチル-2-(4-(6-クロロ-2-ベンゾキサゾリルオキシ)-フェノキシ) …… 90g/l	北海道中央農試, 同道南農試, 長野中農試, 新潟農試, 京都農総研, 福岡農総試験園. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 ・生育期, 一年生イネ科雑草 3~5 葉期; 15 ml; 全面茎葉処理. ・慣行土壌処理剤施用後, 生育期, 一年生イネ科雑草 3~5 葉期; 10, 15, 20 ml; 全面茎葉処理. 〈比較〉 クサガード水溶剤 10g.	新規 継	・試験年次不足.
〔春~夏まき露地移植〕	(2) Hoe-866 液 (パスタ) 〔ヘキストジャパン〕	グルホシネート: アンモニウム=DL-ホモアラニーノ-4-イル(メチル)ホスフィナート …… 18.5	岩手園試高冷地開発センター, 群馬園試, 長野中農試, (三重農技センター), 福岡農総試験園. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 ・定植前, 雑草生育初期; 75 ml; 全面茎葉処理. ・生育期, 雑草生育(初)期; 30, 50, 75 ml; うね間株間茎葉処理. 〈比較〉 パラコート液剤慣行量.	継続 実・継	実:〔春~夏まき露地移植; 一年生雑草全般〕生育期, 雑草生育初期, 30~75 ml, うね間茎葉処理. 継: 薬量, 定植前処理(薬量, 定植までの時間)および草丈と効果について.

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい、対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容 〔前回判定〕
2. キャベツ (つづき)	(3) MW-801 液 (ハービエ ース) 〔明治製菓〕	ピアラホス: L -2-アミノ -4-[(ヒド ロキシ)(メチ ル)ホスフィ ノイル)ブチル -L-アラ ニル-L-ア ラニンのナト リウム塩 32	北海道中央 農試, 同道 南農試. (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前, 雑草発生前期~生育 (初)期; 30, 40, 50ml; 全面茎 葉処理. 〈比較〉 パラコート液剤 30 ml.	継続 実	・〔春~夏まき露地 移植; 一年生雑草 全般〕 定植前, 雑草発生 前期~生育初期, 30~50 ml, 全面茎 葉処理.
〔春~夏まき 露地移植〕						
＜定植前処 理＞ 〔春~初夏 まき露地 移植〕	(4) pendime- thalin 乳 (ゴーゴーサ ン) 〔ANK-553〕 〔ゴーゴーサ ン普及会 (事: 日本サ イアナミッ ド)〕	ペンディメタリ ン 30	北海道中央 農試, 同道 南農試. (2)	適用性〔定植前処理における効 果および薬害の検討, キク科 ・ツユクサを除く一年生雑草〕 定植前, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; 全面土壌処理. 〈比較〉 トレファノサイド乳 剤 30 ml.	継続 実	・〔春~夏まき露地 移植; 一年生雑草 全般〕 定植前, 雑草発生 前, 20~40 ml, 全 面土壌処理.
＜定植後処 理＞ 〔春~初夏 まき露地 移植〕	(5) pendime- thalin 乳 (ゴーゴーサ ン) 〔ANK-553〕 〔ゴーゴーサ ン普及会 (事: 日本サ イアナミッ ド)〕	ペンディメタリ ン 30	北海道中央 農試, 同道 南農試, 群 馬園試, 新 潟園試, 広 島農試, 熊 本農試阿蘇 分場. (6)	適用性〔定植後処理における効 果および薬害の検討, キク科 ・ツユクサを除く一年生雑草〕 定植後, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; うね間土壌処理. 〈比較〉 トレファノサイド乳 剤 30 ml.	継続 実・継	実: 〔春~初夏まき 露地移植; 一年生 雑草全般〕 定植後, 雑草発生 前, 20~30 ml, う ね間土壌処理. 継: 薬害の発生要因 (土壌・苗令・処理 時の気温等)につ いて.
〔春~夏ま き露地移 植または 直播〕	(6) YF-65 液 (ブリグロッ クス) 〔アイ シー アイ ジャ パン〕	パラコート: 1, 1'-ジメチル -4,4'-ビピ リジリウムジ クロリド 10 ジクワット: 1, 1'-エチレン -2,2'-ビピ リジリウムジ プロミド 14	岩手園試高 冷地開発セ ンター, 長 野野菜花き 試, 福岡農 総試験研. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種または定植前, 雑草発生 前期~生育期; 30, 40, 50ml; 全面茎葉処理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 ml.	新規 実・継	実: 〔春~夏まき露 地移植; 一年生雑 草全般〕 定植前, 雑草発生 前期~生育初期, 30~50 ml, 全面茎 葉処理. 継: 作型・処理時期 ・薬量について.
3. ハクサイ	(1) CG-119・ P細粒	メトラクロール : 2-クロロ -2'-エチル	福島農試, 長野野菜花 き試, 愛知	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前; 300, 400,	新規 継	・試験年次不足.

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新規 の別 今回 判定	判定理由または内容
3. ハクサイ (つづき)	(1) CG-119・ P 細粒 (つづき)	—N—(2—メ トキシ—1— メチルエチル) —6'—メチル アセトアニリ ド …… 2 プロメトリン: 2—メチルチ オ—4,6—ビ スイソプロピ ルアミノ—s —トリアジン …… 1	農総試園研, 兵庫農総セ ンター農試 但馬分場, 福岡農総試 園研. (5)	500 g; 全面土壌処理. 〈比較〉 トレファノサイド粒 剤 600 g.		
〔春～夏まき 露地移植〕	〔日本チバガ イギー〕					
〔春～夏まき 露地移植〕	(2) MW-831 水溶	ピアラホス …… 20	北海道道南 農試, 岩手 園試, 長野 南信農試, 岐阜高冷地 農試, 鳥取 野菜試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前, 雑草発生前期～生育 初期; 30, 50, 75g; 全面茎葉 処理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 mL.	新規 実・ 継	実: 〔春～夏まき露 地移植; 一年生雑 草全般〕 定植前, 雑草生育 初期, 50～75g, 全 面茎葉処理. 継: 処理時期・薬量 について.
〔春～夏まき 露地移植〕	(3) pendime- thalin 乳 (ゴーゴーサ ン) 〔ANK-553〕 〔ゴーゴーサ ン普及会 (事: 日本サ イアナミッ ド)〕	ペンディメタリ ン …… 30	岩手園試, 長野野菜花 き試, 兵庫 農総センタ ー農試但馬 分場, 福岡 農総試園研. (4)	適用性〔定植前処理における効 果および薬害の検討, キク科 ・ツユクサを除く一年生雑草〕 定植前, 雑草発生前; 20, 30, 40 mL; 全面土壌処理. 〈比較〉 トレファノサイド乳 剤 30 mL.	新規 継	・試験年次・例数不 足.
〔春～夏ま き露地移 植または 直播〕	(4) YF-65 液 (プリグロッ クス) 〔アイ シー アイ ジャ パン〕	パラコート …… 10 ジクワット …… 14	長野南信農 試, 岐阜高 冷地農試, 鳥取野菜試. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種または定植前, 雑草発生 前期～生育(初)期; 30, 40, 50 mL; 全面茎葉処理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 mL.	新規 実・ 継	実: 〔春～夏まき露 地移植; 一年生雑 草全般〕 定植前, 雑草生育 初期, 30～50 mL, 全面茎葉処理. 継: 作型・処理時期 ・薬量について.
4. ネギ	(1) S-28 U 粒 (クレマート U)	ブタミホス: O —エチル—O —(3—メチル —6—ニトロ フェニル)—N —セカンダリ —ブチルホス	秋田農試, 埼玉園試, 三重農技セ ンター, 岡 山農試. (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植活着後, 雑草発生前; 400, 500, 600 g; うね間株間土壌処 理. 〈比較〉 トレファノサイド乳 剤 30 mL.	新規 実・ 継	実: 〔春まき露地移 植; 一年生雑草全 般〕 定植活着後, 雑草 発生前, 500～600 g, うね間土壌処理. 継: 薬量・処理法(全

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 〔商品名〕 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新規 の別 今回 判定	判定理由または内容
4. ネギ (つづき) 〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(1) S-28 U 粒 (つづき) 〔U-クレマ ート研究会 (事:住友化 学工業)〕	ホロチオアミ デート …… 3				面処理)等につい て。
5. タマネギ 〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(1) Hoe-171 ①乳 〔ヘキスト ジャパン, 三共〕	フェノキサプロ ップエチル …… 90g/4	北海道農試, 北海道中央 農試, 同北 見農試. (3)	適用性〔体系処理による効果お よび薬害の検討, 畑地一年生 イネ科雑草〕 慣行土壌処理剤施用後, 生育 期, 一年生イネ科雑草 3~5 葉期; 10, 15, 20ml; 全面茎葉 処理. 〈比較〉 クサガード水溶剤 10g.	新規 継	・試験年次不足. (特に薬量の検討)
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(2) HOK-833 水和 〔北興化学工 業〕	MCC: メチル -N-(3,4- ジクロロフェ ニル)カーバメ ート …… 40 DCMU: 3-(3, 4-ジクロロ フェニル)-1, 1-ジメチル ウレア …… 7	北海道農試, 北海道中央 農試, 同北 見農試. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前~始期; 50, 75, 100 g; 全面土壌処理. 〈比較〉 ハービサン水和剤 20 g.	新規 継	・試験年次不足. (特に薬量と効果 ・薬害について)
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(3) HOK-833 細粒 〔北興化学工 業〕	MCC …… 8 DCMU …… 1.5	北海道農試, 北海道中央 農試, 同北 見農試. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前~始期; 400, 500, 600 g; 全面土壌処 理. 〈比較〉 ハービサン水和剤 20 g.	新規 継	・試験年次不足. (特に薬量と効果 ・薬害について)
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(4) HOK-842 水和 〔北興化学工 業〕	2種混合剤 …… 25	北海道農試. (1)	作用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生始期; 20, 30 g; 全面処理.	新規 (継)	・適用性試験の実施.
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(5) HW-920 微粒 (ダイロン) 〔保土谷化学 工業〕	DCMU …… 3	北海道農試, 北海道中央 農試, 同北 見農試. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植活着後, 雑草発生盛期(草 丈15cmまで); 500, 750 g; 全 面処理.	新規 継	・試験年次不足. (処理時期, 薬量 と効果, 薬害につ いて)
	(6) MK-140 フロアブル	2-クロロ-6 -ニトロ-3-	北海道農試, 北海道中央	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕	新規 継	・試験年次不足. (特に薬量と効果

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (場所中) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
5. タマネギ (つづき) 〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(6) MK-140 フロアブル (つづき) 〔三菱化成工 業〕	フェノキシア ニン … 60 (W/V)	農試, 同北 見農試. (3)	定植活着後, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; 全面土壌処理. 〈比較〉 シマジン水和剤 10g		について)
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(7) NC-302 ① フロア ブル 〔日産化学工 業〕	エチル-2-(4 -(6-クロロ 2-キノキサリ ニロキシフェノ キシ)プロパノエ ート …… 10	北海道農試, 北海道中央 農試, 同北 見農試. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 定植活着後, イネ科雑草 2 ~ 6葉期; 7.5, 10, 15 ml; 全面 茎葉処理. 〈比較〉 クサガード水溶剤 15g.	新規 継	・試験年次不足.
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(8) pendime- thalin 細粒 (ゴーゴーサ ン) 〔ANK-553〕 〔ゴーゴーサ ン普及会 (事: 日本サ イアナミッ ド)〕	ペンディメタリ ン …… 2	北海道中央 農試, 同北 見農試. (2)	適用性〔効果および薬害の検討, キク科・ツユクサを除く一年 生雑草〕 定植後, 雑草発生前; 500, 600 g; 全面土壌処理. 〈比較〉 ゴーゴーサン乳剤 40 ml.	新規 継	・試験年次不足.
〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(9) SDH-84 乳 〔エス デイ ー エス バイオテッ ク〕	未 公 開 …… 20	北海道農試. (1)	作用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前; 50, 75, 100 ml; 全面土壌処理. 〈比較〉 ゴーゴーサン乳剤 40 ml.	新規 (継)	・適用性試験の実施.
	(10) SL-236 乳 + PP-021 液 〔現地混用〕	フルアジホップ : 2-(4-(5 -トリフルオ ロメチル-2 -ピリジルオ キシ)フェノキ シ)プロピオン 酸ブチル …… 35 フォメサフェン : 5-(2-クロ ロ-4-(トリ フルオロメチ ル)フェノキ シ)-N-メチ ルスルホニル -2-ニトロ	北海道中央 農試, 同北 見農試. (2)	適用性〔現地混用による効果お よび薬害の検討, 畑地一年生 雑草全般〕 定植活着後, 雑草発生始期; SL-236乳 7.5 ml + PP- 021液 10, 15, 20 ml; 全面処 理.	継続 継	・試験結果不一致. (処理時期, 薬量 と効果, 薬害の再 検討)

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
5. タマネギ (つづき) 〔春まき露 地移植・ 本畑〕	(10) SL-236 乳 + PP-021液 〔現地混用〕 (つづき) 〔石原産業〕	ベンザミド …… 25				
6. ニンニク 〔露地普通〕	(1) NP-55乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム: 2-[1-(エ トキシイミノ) ブチル]-5- (2-エチルチ オプロピル)- 3-ハイドロ キシ-2-シ クロヘキセン -1-オン …… 20	(北海道中 央農試, 青 森農試, (岩 手園試). (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉 期; 15, 20 ml/ および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml/; 全面茎葉処理.	新規 (保留)	・試験成績の提出後 判定.
7. ニラ 〔露地普通 ・苗畑〕	(1) NP-55 乳 〔日本曹達〕	同 上	(茨城園試, 千葉農試畑 作営農研, 東京農試, 京都農総研. (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉 期; 15, 20 ml/ および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml/; 全面茎葉処理.	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年 生イネ科雑草(スズ メノカタビラを除 く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15~20 ml/ 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期雑草 3 ~5 葉期, 15 ml/ 全面茎葉処理. 継: 薬量と体系処理 について.
8. アスパラ ガス 〔グリーン 露地・養 成圃〕	(1) alloxym- sodium 水溶 (クサガード) 〔NP-48Na〕 〔日本曹達〕	アロキシジム: 3-(1-アリ キルオキシア ミノブチリデ ン)-6,6-ジ メチル-2,4 -ジオキソシ クロヘキサン カルボン酸メ チルのNa塩 …… 75	北海道中央 農試. (1)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 2~5 葉 期; 10, 15g および体系区: 慣 行土壌処理剤慣行量→10g; 全面茎葉処理.	継続 実	・〔グリーン・露地普 通; 一年生イネ科 雑草(スズメノカタ ビラを除く)〕 単用; 生育期, 雑草 2~5 葉期, 10~15 g/ 体系; 慣行前(土 壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 2~ 5 葉期, 10g, 全面 茎葉処理.
	(2) benthio- carb-pr- ometryne 乳 (サターンバ)	ベンチオカーブ : S-(4-クロ ルベンジル)- N,N-ジエチ ルチオカーバ	岩手園試南 部分場, 秋 田農試, 長 野野菜花き 試, 広島農	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 萌芽前, 雑草発生前~始期; 60, 80, 100 ml/; 全面土壌処理 <比較> ロックス水和剤 20g.	継続 実・継	実:〔グリーン成圃・ 露地普通; 一年生 雑草全般〕 萌芽前, 雑草発生 前~始期, 60 ~

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい、対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新続 の別 今回 判定	判定理由または内容
8. アスパラ ガス (つづき) 〔グリーン 露地(養成圃を含む)〕	(2) benthio- carb-pro- metryne 乳(つづき) アロ) 〔B-3015・P〕 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	メート … 50 プロメトリン …… 5	試, 香川農 試三木分場. (5)			100 ml, 全面土壌 処理. 継: 養成圃での試験 について.
〔グリーン 露地(養成圃を含む)〕	(3) benthio- carb-pro- metryne 粒 (サターンバ アロ) 〔B-3015・P〕 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	ベンチオカーブ …… 8 プロメトリン …… 0.8	岩手園試南 部分場, 秋 田農試, 長 野野菜花き 試, 広島農 試, 香川農 試三木分場. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 萌芽前, 雑草発生前~始期; 400, 500, 600 g; 全面土壌処 理. 〈比較〉 ロックス水和剤 20g.	継続 実・ 継	実: 〔グリーン成圃・ 露地普通; 一年生 雑草全般〕 萌芽前, 雑草発生前~始期, 400 ~ 600 g, 全面土壌処 理. 継: 養成圃での試験 について.
〔グリーン 露地普通〕	(4) MK-140 フロアブル 〔三菱化成工 業〕	2-クロロ-6 -ニトロ-3- フェノキシアニ リン … 60(W/V)	北海道農試, 香川農試三 木分場. (2)	作用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 萌芽前, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; 全面土壌処理.	新規 継	・試験年次・例数不 足.
〔グリーン 露地普通〕	(5) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	北海道中央 農試, 同道 南農試, 岩 手園試南部 分場, 長野 南信農試, 三重農技セ ンター. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉 期; 15, 20ml および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理.	新規 実・ 継	実: 〔グリーン成圃・ 露地普通; 一年生 イネ科雑草(スズメ ノカタビラを除く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15~20 ml, 体系; 慣行前(土 壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15ml, 全面 茎葉処理. 継: 養成圃での試験 および効果・薬害 の年次変動につい て.
3. トマト 〔露地移植〕	(1) MK-140 フロアブル 〔三菱化成工 業〕	2-クロロ-6 -ニトロ-3- フェノキシアニ リン … 60(W/V)	北海道中央 農試, 青森 畑作園試, 栃木農試, 長野中信農 試, 三重農 技センター; 岡山農試. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; うね間(株間)土壌処 理. 〈比較〉 プラナビアン水和剤 20 g.	継続 実・ 継	実: 〔露地移植; 一年 生雑草全般〕 定植後, 雑草発生前, 30ml, うね間 土壌処理. 継: 薬量と効果・薬 害(土壌等との関 係)について.

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
9. トマト (つづき)	(2) MW-831 水溶	ビアラホス …… 20	青森畑作園 試, 秋田農 試, (東京農 試), 新潟高 冷地農技セ ンター, 広 島農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前, 雑草発生前期~生育 初期および生育期, 雑草生育 (初)期(2回処理); 30, 50, 75 g; 全面およびうね間茎葉処 理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 mL.	新規 実・ 継	実:〔露地移植; 一年 生雑草全般〕 定植前, 雑草生育 初期または生育期, 雑草生育(初)期の 1~2回, 30~75g, 雑草茎葉処理. 継: 薬量と効果・薬 害について.
〔露地普通〕	〔明治製菓〕					
	(3) S-28 U 粒 (クレマート U) 〔U-クレマ ート研究会 (事:住友化 学工業)〕	ブタミホス …… 3	栃木農試, 長野中信農 試. (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植活着後, 雑草発生前; 400, 500, 600 g; うね間・株間土 壌処理. 〈比較〉 トレファノサイド粒 剤 400 g.	継続 実	・〔露地移植; 一年生 雑草全般〕 定植活着後, 雑草 発生前, 500~600 g, うね間・株間土 壌処理.
〔露地移植〕						
10. スイカ	(1) CG-119・ P 細粒	メトラクロール …… 2 プロメトリン …… 1	青森農試, 同砂丘分場, 秋田農試, 鳥取野菜試, 熊本農試園 芸支場. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前マルチ前, 雑草発生前; 300, 400, 500 g; 全面土壌処 理. 〈比較〉 トレファノサイド粒 剤 400 g.	新規 継	・試験年次不足.
〔露地マル チ移植〕	〔日本チバガ イギー〕					
	(2) Hoe-866 液 (バスタ) 〔ヘキスト ジャパン〕	グルホシネート …… 18.5	青森農試, 同砂丘分場, 茨城園試, 石川砂丘地 農試, 香川 農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 生育期, 雑草生育期(発生前期 ~生育中期); 30, 50, 75 mL; う ね間茎葉処理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 mL.	新規 実・ 継	実:〔トンネルマルチ 移植; 一年生雑草 全般〕 生育期, 雑草生育 初期, 30~50 mL, う ね間茎葉処理. 継: 薬量・処理時期 等について.
〔露地(トン ネル)マル チ〕						
	(3) MW-831 水溶	ビアラホス …… 20	青森農試, 石川砂丘地 農試, 岐阜 農試, 鳥取 野菜試, 香 川農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草生育(初)期; 30, 50, 75 g; うね間茎葉処理. 〈比較〉 グラモキソン液剤 30 mL.	新規 実・ 継	実:〔露地マルチ移 植; 一年生雑草全 般〕 定植後, 雑草生育 初期, 30~50g, う ね間茎葉処理. 継: 薬量・処理時期 等について.
〔露地マル チ移植〕	〔明治製菓〕					
	(4) nitralin 微粒 (プラナビア ン) 〔SD-11831〕	ニトラリン: 4 -(メチルスル フォニル)-2, 6-ジニトロ -N, N-ジブ	青森農試, 秋田農試, 鳥取野菜試, 熊本農試園 芸支場. (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前マルチ前, 雑草発生前; 300, 400, 500 g; 全面土壌処 理.	継続 実・ 継	実:〔露地マルチ移 植; 一年生雑草全 般〕 定植前マルチ前, 雑草発生前, 300

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
10. スイカ (つづき) 〔露地マルチ移植〕	(4) nitralin 微粒 (つづき) 〔プラナビア ン普及会 (事: シェル 化学)〕	ロピルアニリ ン …… 2.5		<比較> プラナビアン水和剤 20g.		~500 g, 全面土壤 処理. 〔但し, 砂土を除く〕. 継: 処理時期・薬量 の検討.
〔露地マルチ移植〕	(5) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	北海道道南 農試, 青森 農試砂丘分 場, 岐阜農 試, 鳥取野 菜試, 香川 農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉 期; 15, 20ml および体系区; 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理.	継続 実	・〔露地マルチ移植; 一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15~20 ml. 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期, 雑草 3 ~5 葉期, 15ml, 全 面茎葉処理.
11. メロン 〔露地マルチ移植〕	(1) S-28 U 粒 (クレマート U) 〔U-クレマ ート研究会 (事: 住友化 学工業)〕	ブタミホス …… 3	秋田農試, 石川砂丘地 農試, 大分 農試センタ ー. (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植前マルチ前; 雑草発生前; 400, 500, 600g; 全面土壌処 理. <比較> トレファノサイド粒 剤 300g.	継続 実・継	実: 〔露地マルチ移 植; 一年生雑草全 般〕 定植前マルチ前, 雑草発生前, 500 ~600g, 全面土壌 処理. 継: 薬量と効果・薬 害について.
12. イチゴ 〔親株床露 地〕	(1) Hoe-171 ①乳 〔ヘキスト ジャパン, 三共〕	フェノキサプロ ップエチル …… 90g/l	北海道道南 農試, 山形 園試, 埼玉 園試, 岐阜 農試, 兵庫 農試センタ ー農試, 福 岡農試園 研. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 移植後慣行土壌処理剤施用後, 生育期, 一年生イネ科雑草 3 ~5 葉期; 10, 15, 20ml; 全面 茎葉処理. <比較> クサガード水溶剤 10g.	新規 継	・試験年次不足.
13. ダイコン 〔春~夏ま き露地直 播〕	(1) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	北海道道南 農試, 青森 畑作園試, 千葉農試東 総野菜研, 兵庫農試セ ンター農試 但馬分場, 宮崎総農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉 期; 15, 20ml および体系区; 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理. <比較> 慣行土壌処理剤のみ 等.	継続 実	・〔春~夏まき露地 直播; 一年生イネ 科雑草(スズメノカ タビラを除く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15~20 ml. 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期, 雑草 3 ~5 葉期, 15ml, 全 面茎葉処理.

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 〔商品名〕 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) 〔＝実施中〕	試験の種類〔ねらい、対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	継続 の別 今回 判定	判定理由または内容
13.ダイコン (つづき) 〔春(～夏) まき露地 直播〕	(2) SL-236 乳 (ワンサイド) 〔石原産業〕	フルアジホップ …… 35	千葉農試東 総野菜研, 新潟園試, 愛知農試 園研, 兵庫 農試センタ ー農試但馬 分場, 宮崎 総農試. (5)	適用性〔体系処理による効果お よび薬害の検討, 畑地一年生 イネ科雑草〕 は種後, 慣行土壌処理剤慣行 量→生育期, イネ科雑草 2～ 5葉期; 5, 7.5, 10 ml; 全面 茎葉処理. ＜比較＞前処理剤単用.	継続 実・ 継	実:〔春～秋まき露 地直播; 一年生イ ネ科雑草(スズメノ カタビラを除く)〕 は種後・慣行前(土 壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 2～ 5葉期, 5～10 ml, 全面茎葉処理＜体 系処理＞. 継:生育抑制等薬害 について.
14.ニンジン 〔春～夏ま き露地直 播〕	(1) benthio- carb・pro- metryne 乳 (サターンバ アロ) 〔B-3015・P〕 〔クミアイ化〕 学工業	ベンチオカーブ …… 50 プロメトリン …… 5	岩手園試高 冷地開発セ ンター, 新 潟高冷地農 技センター, 岐阜農試, 香川農試, 鹿児島農試 大隅支場. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種覆土後, 雑草発生前; 60, 80, 100 ml; 全面土壌処理. ＜比較＞ ゴーゴーサン乳剤 40 ml.	継続 実	・〔春～夏まき露地 直播; 一年生雑草 全般〕 播種(覆土)後, 雑 草発生前, 60～100 ml 全面土壌処理. 〔但し, 砂土・砂壌 土・鈣質酸性土 への施用および 過湿土壌への使 用は避ける〕
〔春～夏ま き露地直 播〕	(2) benthio- carb・pro- metryne 粒 (サターンバ アロ) 〔B-3015・P〕 〔クミアイ化〕 学工業	ベンチオカーブ …… 8 プロメトリン …… 0.8	岩手園試高 冷地開発セ ンター, 新 潟高冷地農 技センター, 岐阜農試, 香川農試, 鹿児島農試 大隅支場. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種覆土後, 雑草発生前; 400, 500, 600 g; 全面土壌処理. ＜比較＞ ゴーゴーサン乳剤 40 ml.	継続 実	・〔春～夏まき露地 直播; 一年生雑草 全般〕 播種(覆土)後, 雑 草発生前, 400～ 600 g, 全面土壌処 理. 〔但し, 砂土・砂壌 土・鈣質酸性土 への施用および 過湿土壌への施 用は避ける〕
〔春～夏ま き露地直 播〕	(3) Hoe-171 ①乳 〔ヘキスト ジャパン, 三共〕	フェノキサプロ ップエチル …… 90 g/l	北海道中央 農試, 同道 南農試, 岩 手園試高冷 地開発セン ター, 埼玉 園試鶴ヶ島 洪積畑支場, 岐阜農試, 鹿児島農試 大隅支場. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 は種直後慣行土壌処理剤施用 後, 生育期等, イネ科雑草 3～ 5葉期; 10, 15, 20 ml; 全面茎 葉処理. ＜比較＞ クサガード水溶剤 15 g.	新規 継	・試験年次不足.

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 〔商品名〕 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
14. ニンジン (つづき)	(4) MK-140 フロアブル 〔三菱化成工 業〕	2-クロロ-6 -ニトロ-3- フェノキシア ニン … 60(W/V)	青森畑作園 試, 埼玉園 試鶴ヶ島洪 積畑支場, 長野野菜花 き試, 愛知 農総試園研, 香川農試, 鹿児島農試 大隅支場. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種後, 雑草発生前; 20, 30, 40ml; 全面土壌処理. ＜比較＞ ロックス水和剤 20g.	継続 実・ 継	実:〔春～夏まき露 地直播; 一年生雑 草全般〕 播種後, 雑草発 生前, 20～40ml, 全 面土壌処理. 継:高薬量の安全性 について.
〔春～夏ま き露地直 播〕	(5) YH-44 乳 〔八洲化学工 業〕	フルオロクロ リドン: 1-(<i>m</i> - トリフルオ ロメチルフェ ニル)-3-クロ ロメチル- 4-クロロメ チル-2-ピ ロリドン …… 24	野菜試久留 米支場, 北 海道農試. (2)	作用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種前および種後, 雑草発 生前; 10, 20, 30ml; 全面土壌 処理.	新規 継	・試験年次不足.
〔春～夏ま き露地直 播〕						
15. ゴボウ	(1) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	青森畑作園 試, 千葉農 試畑作営農 研, 長野南 信農試, 鳥 取野菜試, 大分農技セ ンター. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3～5 葉 期; 15, 20ml および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理.	新規 実・ 継	実:〔春～夏まき露 地直播; 一年生イ ネ科雑草(スズメノ カタビラを除く)] 単用; 生育期, 雑草 3～5葉期, 15～20 ml. 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期, 雑草 3 ～5葉期, 15ml, 全 面茎葉処理. 継:効果・薬害の年 次変動について.
〔春～夏ま き露地直 播〕						
16. サトイ モ	(1) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	山形園試, 千葉農試畑 作営農研, 三重農技セ ンター, 鹿 児島農試大 隅支場. (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3～5 葉 期; 15, 20ml および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理.	新規 実・ 継	実:〔春植え露地普 通; 一年生イネ科 雑草(スズメノカタ ビラを除く)] 単用; 生育期, 雑草 3～5葉期; 15～20 ml. 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期, 雑草 3 ～5葉期, 15ml, 全 面茎葉処理. 継:効果・薬害の年 次変動について.
〔(春植え) 露地普通〕						

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
16. サトイモ (つづき) 〔春植え露地普通〕	(2) SL-236 乳 (ワンサイド) 〔石原産業〕	フルアジホップ …… 35	山形園試, 栃木農試, 千葉農試畑 作営農研, 愛知農総試 園研, 熊本 農試園芸支 場, 鹿児島 農試大隅支 場. (6)	適用性〔体系処理による効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 植付後, 慣行土壌処理剤慣行量→生育期, イネ科雑草 2~5 葉期; 5, 7.5, 10 ml; 全面茎葉処理. 〈比較〉慣行土壌処理剤のみ.	継続 実	・〔春植え露地普通; 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)〕 植付後, 慣行前(土壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 2~5 葉期, 5~10 ml, 全面茎葉処理〈体系処理〉.
17. ヤマノイモ 〔露地普通〕	(1) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	青森畑作園試, 埼玉園試, 三重農技センター, 鳥取野菜試 (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期, イネ科雑草 3~5 葉期; 15, 20 ml/ および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理.	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15~20 ml. 体系; 慣行前(土壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 3~5 葉期, 15 ml, 全面茎葉処理. 継: 効果・薬害の年次変動について.
(ナガイモ) 〔露地普通〕	(2) SL-236 乳 (ワンサイド) 〔石原産業〕	フルアジホップ …… 35	青森畑作園試, 長野野菜花き試, 鳥取野菜試. (3)	適用性〔体系処理による効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 植付後, 慣行土壌処理剤慣行量→生育期, イネ科雑草 2~5 葉期; 5, 7.5, 10 ml; 全面茎葉処理. 〈比較〉慣行土壌処理剤のみ.	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)〕 慣行前(土壌)処理剤施用後, 生育期, 雑草 2~5 葉期, 5~10 ml, 全面茎葉処理〈体系処理〉. 継: 効果・薬害の年次変動について.
18. トウモロコシ (スーパースイート系) 〔露地普通〕	(1) CG-119 乳 〔日本チバガ〕 〔イギー〕	メトラクロール …… 50	北海道農試, 北海道中央農試, (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種後, 雑草発生前; 20, 30, 40 ml; 全面土壌処理. 〈比較〉 ゴーゴーサン乳剤 30 ml.	新規(継) 実・継	実:〔露地普通; 一年生雑草全般〕 播種後, 雑草発生前, 20~40 ml, 全面土壌処理. 継: 品種・作型・栽培法について.
	(2) CG-119・P 水和 〔旧 HSW-803〕	メトラクロール …… 30 プロメトリン …… 20	北海道農試, 北海道中央農試. (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種後, 雑草発生前; 30, 40 g; 全面土壌処理. 〈比較〉ゲザプリム水和剤 20 g.	新規(継) 実・継	実:〔露地慣行; 一年生雑草全般〕 播種後, 雑草発生前, 30~40 g, 全面土壌処理.

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
18. トウモ ロコシ (つづき) 〔露地普通〕	(2) CG-119・ P 水和 (つづき) 〔日本チバガ イギー〕					継: 薬量および品種 ・作型・栽培法に ついて。
〔露地普通〕	(3) CG-123 フロアブル 〔日本チバガ イギー〕	アトラジン: 2 ークロル-4 ーエチルアミ ノ-6-イソ プロピルアミ ノ-8-トリ アジン …… 20 メトラクロール …… 30	北海道農試, 北海道中央 農試。 (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種後, 雑草発生前; 20, 30, 40ml; 全面土壌処理。 ＜比較＞ ゲザプリム水和剤 20g.	新規 (継) 実・継	実:〔露地慣行; 一年 生雑草全般〕 播種後, 雑草発 生前, 20~40ml, 全 面土壌処理。 継: 品種・作型・栽 培法について。
19. キ ク 〔露地普通〕	(1) NP-55 乳 (ナブ) 〔日本曹達〕	セトキシジム …… 20	埼玉園試, 三重農技セ ンター, 兵 庫農総セン ター農試, 福岡農総試 園研。 (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生イネ科雑草〕 生育期等, イネ科雑草 3~5 葉期; 15, 20ml および体系区: 慣行土壌処理剤慣行量 → 15 ml; 全面茎葉処理。 ＜比較＞慣行土壌処理剤のみ	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年 生イネ科雑草(ス ズメノカタビラを 除く)〕 単用; 生育期, 雑草 3~5葉期, 15~20 ml, 体系; 慣行前 (土壌)処理剤施用 後, 生育期, 雑草 3 ~5葉期, 15ml, 全面茎葉処理。 継: 効果・薬害の年 次変動について。
〔露地普通〕	(2) pendime- thalin 乳 (ゴーゴーサ ン) 〔ANK-553〕 〔ゴーゴーサ ン普及会 (事: 日本サ イアナミッ ド)〕	ペンディメタリ ン …… 30	山形園試, 埼玉園試, 長野野菜花 き試, 和歌 山農試, 香 川農試, 鹿 児島農試。 (6)	適用性〔定植前処理における効 果および薬害の検討, キク科 ・ツユクサを除く一年生雑草〕 定植前, 雑草発生前; 20, 30, 40ml; 全面土壌処理。	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年 生雑草全般〕 定植前, 雑草発 生前, 30~40ml, 全 面土壌処理。 継: 処理時期・薬量 および連用による 影響について。
20. 花木類 〔露地普通〕	(1) Hoe-866 液 (バスタ) 〔ヘキスト ジャパン〕	グルホシネート …… 18.5	埼玉園試, 福井園試, 福岡農総試 園研。 (3)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 生育期, 雑草生育(初)期; 30, 50, 75ml; うね間茎葉処理。 ＜比較＞ グラモキシロン液剤 30ml.	新規 実・継	実:〔露地普通; 一年 生雑草全般〕 生育期, 雑草生育 (初)期, 50~75ml, うね間茎葉処理。 継: 薬量・散布回数 および効果・薬害 の年次変動について。

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
20. 花木類 (つづき)	(2) MW-831 水溶	ビアラホス …… 20	野菜試久留 米支場, 山 形園試, 埼 玉園試, 福 井園試, 兵 庫農総セン ター農試. (5)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 生育期, 春期および夏期, 雑草 生育(初)期(2回処理); 30, 50, 75g; うね間茎葉処理. ＜比較＞ グラモキソン液剤 30mL.	新規 実・ 継	実:〔露地普通; 一年 生雑草全般〕 生育期, 春～夏期, 雑草生育(初)期, 1 ～2回, 30～75g, うね間茎葉処理. 継: 効果・薬害の年 次変動および薬量 ・回数と処理時の 雑草葉令との関係 について.
〔露地普通〕	〔明治製菓〕					
	(3) MD-DC 水和	ビアラホス …… 12 DCMU …… 18	野菜試久留 米支場, 山 形園試, 埼 玉園試, 千 葉農試花植 木研, 長野 野菜花き試, 兵庫農総セ ンター農試. (6)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 生育期, 春期および夏期, 雑草 生育(初)期(2回処理); 50, 75, 100g; うね間茎葉処理. ＜比較＞ グラモキソン液剤 30mL.	新規 実・ 継	実:〔露地普通; 一年 生雑草全般〕 生育期, 春～夏期, 雑草生育(初)期, 50～75g, うね間茎 葉処理. 継: 効果・薬害の年 次変動および薬量 ・回数等について.
〔露地普通〕	〔明治製菓〕					

Ⅱ. 前回未検討未提出分除草剤

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 前回 判定	判定理由または内容
1. ネギ	(1) benthio- carb+pr- ometryne 粒 (サターンバ アロ) (B-3015・P) 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	ベンチオカーブ …… 8 プロメトリン … 0.8	埼玉園試, 長野野菜花 き試, 三重 農技センタ ー, 鳥取野 菜試. (4)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 定植後, 雑草発生(前～)始期; 400, 500, 600g; 土壌処理.	新規 継	・試験年次不足.
〔秋まき露 地移植〕 (S.58秋冬)						
2. ニンジン	(1) MK-140 フロアブル 〔三菱化成工 業〕	2-クロロ-6 -ニトロ-3 -フェノキシ アニリン … 60(W/V)	埼玉園試鶴 ヶ島洪積畑 支場. (1)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種直後出芽前, 雑草発生前; 20, 30, 40mL; 全面土壌処理.	新規 継 (既判定)	・試験年次不足.
〔秋まきト ンネルマル チ直はん〕 (S.58秋冬)						
〔秋～春ま きトンネ ルマルチ	(2) MW-801 液 (ハービエース)	ビアラホス …… 32	埼玉園試鶴 ヶ島洪積畑 支場. (1)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 は種前, 雑草生育初期, 30, 40,	継続 実	・〔秋～春まきトン ネルマルチ直はん; 一年生雑草全般〕

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい, 対象雑草〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 前回 判定	判定理由または内容
2. ニンジン (つづき) 直はん] (S.58秋冬)	(2) MW-801 液 〔明治製菓〕			50ml; 全面茎葉処理.	〔既 判定〕	は種前, 雑草生育 初期, 30~50ml; 全面茎葉処理.
3. チューリ ップ 〔露地普通〕 (S.58秋冬)	(1) butami- fos 乳 (クレマト) 〔S-28〕 〔U-クレマ ート研究会 (事:住友化 学工業)〕	ブタミホス …… 50	新潟園試, 富山農試野 菜花き試. (2)	適用性〔効果および薬害の検討, 畑地一年生雑草全般〕 ・萌芽直後, 雑草発生前; ・展葉時, 雑草発生前; 30, 40 ml; 全面土壌処理.	継続 〔既 判定〕	・処理時期の検討.

Ⅲ. 生 育 調 節 剤

作物名 〔作型・栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
1. 野菜一般 〔露地普通〕	(1) SLF-W2 液 〔昭和電工〕	N: 16%, P ₂ O ₅ : 16%, K ₂ O: 12%, 他キレート金属 20~30 ppm	野菜試盛岡支場, 埼玉園試鶴ヶ島洪積畑支場. (2)	基礎〔収量増, 品質向上〕 生育初期より1~2週間毎(5回); 500~100倍液; 茎葉処理. *詳細は試験成績集録参照.	継続 (継)	・ニンジン等の根菜類で適用性試験の実施.
2. ホウレンソウ 〔露地普通〕	(1) TT-20, TT-100 液 〔東商トップス〕	未 公 開	岩手園試高冷地開発センター, 東京農試, 新潟園試. (3)	適用性〔生育促進, 早期収穫, 収量増, 品質向上等〕 出芽子葉展開時, 本葉展開時およびその後1週間毎収穫まで; 1000倍液 50 l/a. 〈比較〉糖液.	新規 継	・試験年次不足.
3. タマネギ 〔春まき露地移植〕	(1) BAS-083 液 (PIX) 〔ビー エー エス エフ ジャパン〕	メピコートクロライド …… 5	北海道農試. (1)	基礎〔球の肥大等〕 本葉4~5葉期等; 10, 20, 30, 40 ml; 全面茎葉散布. *詳細は試験成績集録参照.	新規 (継)	・適用性試験の実施.
4. トマト (加工・生食用) 〔ハウスまたはトンネルマルチ, 露地(マルチ)〕	(1) VPG-8401 乳 〔ベルシコー ル パシフィック リミテッド〕	未 公 開	加) 長野中 信農試. 生) 野菜試盛岡支場, 青森畑作園試, 福島農試, 広島農試. (5)	適用性〔果実の肥大促進および増収〕 第1花房開花期(第1段開花期); 50, 100, 150 ml <10 l/a>; 茎葉散布.	新規 継	・試験年次不足. (処理時期・濃度 ・回数の検討)

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
5. スイカ 〔ハウスま たはトン ネル〕	(1) KT-30 液 〔協和醗酵工 業〕	N-(2-クロロ -4-ピリジル) -N-フェニル 尿素 …… 0.4	青森農試砂 丘分場, 熊 本農試園芸 支場. (2)	適用性〔着果促進; 開花前日の処 理濃度の検討〕 開花前日; 100, 250, 500 ppm; 果梗部塗布, 人工受粉併用.	継続 実	•〔ハウスまたはトン ネル(マルチを 含む); 着果促進〕 開花前~当日, 100 ~500 ppm, 果梗 部塗布. 〔要受粉; 但し, 着 果しにくい条件 下では, より高 濃度を使用する〕
6. メロン (アールス 系) 〔温室慣行〕	(1) J-455 乳 〔日産化学工 業〕	エチクロゼート : エチル-5- クロロ-1H- 3-インダゾ リルアセテ- ート …… 1	千葉暖地園 試, 静岡農 試, 愛知農 総試園研. (3)	適用性〔ネット形成促進および 果実肥大促進〕 交配後20日および25日の2回; 5, 7.5, 10 ppm; 茎葉散布.	継続 実	•〔温室慣行; ネット 形成および果実肥 大促進〕 交配20日後および 25日後の2回, 7.5 ~10 ppm液, 50 ml/株, (着果部位 の上位葉への) 茎 葉散布.
(アムス) 〔ハウスま たはトン ネル〕	(2) KT-30 液 〔協和醗酵工 業〕	N-(2-クロロ -4-ピリジル) -N-フェニル 尿素 …… 0.4	青森農試, 秋田農試, 長崎総農試, 大分農技セ ンター. (4)	適用性〔着果促進; 処理濃度, 品 質への影響検討〕 開花前日, 当日; 10, 25, 50 ppm; 果梗部塗布または 1, 3, 5, 10 ppm; 子房部散布.	継続 継	• 処理法・濃度の検 討.
7. カボチャ 〔ハウスま たはトン ネル〕	(1) KT-30 液 〔協和醗酵工 業〕	同 上	千葉農試, 長野野菜花 き試. (2)	適用性〔着果促進; 処理時期, 濃 度の検討〕 開花前日, 翌日; 200, 500, 1000 ppm, 開花当日; 200 ppm; 果梗部塗布, 人工受粉併用.	継続 実・継	実:〔ハウスまたはトン ネル(マルチを含 む); 着果促進〕 開花前~当日, 500 ~1000 ppm液, 果 梗部塗布(要受粉). 継: 処理時期(日)・ 濃度について.
8. イチゴ (宝交早生) 〔親株床・ 本畑〕	(1) RF-81 水和 (リフレッシュ) 〔ソフトシリ カ〕	SiO ₂ 72.96, Al 9.92, Fe 4.95, Ca 3.27, K 0.13, Mg 痕 跡, 水 3.81, 秋田 県八沢木産 2: 1 型モンモリロ ナイト粘土	(野菜試盛 岡支場), (同 久留米支場), (奈良農試). (3)	適用性〔チッソ吸収抑制, 年内収 穫(花芽分化促進)] 親株移植時より 7 日毎, 本畑 収穫まで; 1000, 2000 倍; 葉面 散布.	新規 保留	• 試験成績の提出後 判定.
9. ヤマノ イモ 〔露地普通〕	(1) 改良C- MH液 (エルノー) 〔日本ヒドラ ジン工業〕	マレイン酸ヒド ラジドコリン塩 …… 39	(青森畑作 園試), (埼玉 園試), (長野 野菜花き試). (5)	適用性〔貯蔵中の萌芽防止〕 10月上旬および中旬(枯葉前 収穫前); 100, 80 倍; 茎葉全面 散布.	新規 保留	• 試験成績の提出後 判定.

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新規 の別 今回 判定	判定理由または内容
10. 花き一 般 〔普通〕	(1) KUH- 833 水和 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	未 公 開 …… 30	千葉暖地園 試. (1)	基礎〔伸長抑制; 処理時期, 濃度 の検討〕 300, 600, 1200 ppm等; 茎葉散 布.	継続 継	・適用性試験の実施
11. 花き・ 花木類 〔慣行〕	(1) S-07 液 (スミセブン) 〔山本農薬, 住友化学工 業〕	E-1-(4-クロ ロフェニル) -4,4-ジメチ ル-2-(1,2,4- トリアゾール -1-イル)-1- ペンテン-3- オール … 500 ppm	野菜試, 同 久留米支場. (2)	基礎〔矮化(伸長抑制)効果, 着ら い促進効果等〕 ※詳細は試験成績集録参照.	継続 継	・全般に継続検討.
12. ストッ ク 〔切花用慣 行〕	(1) S-07 液 〔山本農薬, 住友化学工 業〕	同 上	(千葉暖地 園試), 三重 農技センタ ー, (和歌山 農試). (3)	適用性〔花穂の伸長抑制〕 花が2~3輪開花した時; 5, 10, 20ppm; 茎葉散布. ※詳細は試験成績集録参照.	新規 保留	・試験成績の提出後 判定.
13. 宿根カ スミソ ウ 〔切花用慣 行〕	(1) S-07 液 〔山本農薬, 住友化学工 業〕	同 上	(千葉暖地 園試), (和歌 山農試), (鹿児島農 試). (3)	適用性〔花首の徒長防止〕 出ら以後1~2回; 25, 50, 75 ppm等 10~20ml/株; 葉面散 布. ※詳細は試験成績集録参照.	新規 保留	・試験成績の提出後 判定.
14. リンド ウ 〔鉢物普通〕	(1) KT-30 液 〔協和醗酵工 業〕	N-(2-クロル -4-ピリジル) -N-フェニル 尿素 …… 0.4	奈良農試, 福岡農総試 園研. (2)	適用性〔草姿改良, 品質向上〕 ・摘芯後7~10日1回散布; 20ppm; ・摘芯後7~10日および30日 の2回散布; 10, 20ppm; <10ml/3号鉢> 茎葉散布.	継続 実	・〔鉢物普通; 草姿 改良および品質向 上〕 摘芯7~10日後, 10~20ppm液, 1回 または摘芯7~10 日後および30日後, 10~20ppm液, 2 回, 茎葉散布.
15. キク (ポットマ ム) 〔鉢物〕	(1) KUH- 833 水和 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	未 公 開 …… 30	埼玉園試, 奈良農試, 香川農試. (3)	適用性〔矮化効果および薬害の 検討〕 ・摘芯後10日1回散布; 500, 250 倍; ・摘芯後10日および25日の2 回散布; 1000, 500 倍; 茎葉散布.	継続 継	・成分未公開. (濃度・回数等につ いて).
16. ハボタ ン 〔慣行〕	(1) KUH- 833 水和 〔クミアイ化〕 〔学工業〕	同 上	東京農試, 福井園試, 三重農技セ ンター, 兵庫 農総センタ ー農試. (4)	適用性〔節間伸長抑制〕 定植後10日頃; 500, 250 倍; 茎葉散布. ※詳細は試験成績集録参照.	新規 継	・試験年次不足.

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新規 の別 今回 判定	判定理由または内容
17. 球根類 〔春～夏植 え鉢物〕	(1) S-07 液 (スミセブン) 〔山本農業, 住友化学工 業〕	E-1-(4-クロロフェニル)- 4,4-ジメチル-2-(1,2,4- トリアゾール-1-イル)-1- ペンテン-3-オール …… 500 ppm	(千葉農試 花植木研), (神奈川園 試), 新潟園 試, 奈良農 試. (4)	適用性〔球根の薬液への浸漬に よる矮化, 葉害の検討〕 ※詳細は試験成績集録参照.	継続 保留	・試験成績の提出後 判定.
18. 花木・ 緑花木 (花木) 〔露地普通〕	(1) IBA 液 (オキシベロ ン) 〔塩野義製薬〕	インドール酪酸 …… 0.4	野菜試久留 米支場, 千 葉農試花植 木研, 和歌 山農試. (3)	適用性〔移植後の発根促進〕 移植時; 1000, 500倍 1~2 l /2~3年生花木; 土壌灌注処 理.	新規 継	・試験年次不足.
(生け垣) 〔露地普通〕	(2) damino- zide 水溶 (ビーナイン) 〔日本曹達〕	ダミノジッド: N-(ジメチル アミノ)-スク シンアミド酸 …… 80	野菜試, 千 葉農試花植 木研, 神奈 川園試相模 原分場, 長 野野菜花き 試, 福岡農 総試園研. (5)	適用性〔矮化による刈込み省略〕 5月上旬一斉刈込み後約20日 (サツキは6月上旬刈込み)およ び夏期再伸長時; 100倍液; 全 面茎葉散布.	継続 実・ 継	実:〔露地普通; 生垣 用花・緑花木(アベ リア・サツキ・ハ クチョウゲ); 矮化 による刈込み省略〕 5月上旬一斉刈込 み後約20日(サツキ 6月上旬刈込み)お よび夏期再伸長時, 100倍液, 1~2回, 全面茎葉処理. 継: 樹種等について.
(花木・緑 花木…低 木) 〔露地普通〕	(3) PP-333 フロアブル 〔アイシー アイジャパ ン〕	パクロブトラゾ ール: (2RS, 3RS)-1-(4-クロロフ ェニル)-4,4- ジメチル- 2-(1H-1,2, 4-トリアゾ ール-1-イ ル)-ペンタ ン-3-オール …… 25	野菜試, 同 久留米支場, 東京農試, 神奈川園試 相模原分場. (4)	適用性〔矮化効果による刈込み 軽減〕 刈込み後; 1000, 500, 250倍; 茎葉散布.	新規 継	・試験年次不足.
(緑花木… 中・高木) 〔露地〕	(4) PP-333 アルコール液 〔アイシー アイジャパ ン〕	パクロブトラゾ ール …… 1, 2, 4	東京農試, 神奈川園試 相模原分場. (2)	基礎〔整枝・せん定軽減効果(矮 化効果)〕 樹間注入または土壌処理. ※詳細は試験成績集録参照.	新規 継	・試験年次不足. (処理時期・処理 法について)

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
19. ハイビ スカス (赤花一重 咲) 〔鉢物〕	(1) C. C. C. 液 (サイコセル) 〔三共, 日本 サイアナミ ッド〕	クロルメコート : 2-クロロエ チルトリメチ ルアンモニウ ムクロリド …… 46	群馬園試, 千葉農試花 植木研, 東 京農試, 神 奈川園試, (4)	適用性〔矮化効果〕 摘芯(整枝)後, 側枝 5~10cm の時期; 500, 250, 125 倍; 茎葉 散布. * 詳細は試験成績集録参照.	新規 実・ 継	実:〔(赤花一重咲) 鉢物慣行; 矮化効 果〕 摘芯(整枝)後, 側 枝 5~10cm 時, 500~250 倍液, 茎 葉散布. 継: 効果確認, 品種 等について.
20. ポイン セチア 〔鉢物慣行〕	(1) PP-333 フロアブル 〔アイ シー アイジャパ ン〕	バクロブトラゾ ール …… 2	埼玉園試, (東京農試), (愛知農総 試験研), (三 重農枝セン ター), 奈良 農試, (広島 農試), (6)	適用性〔矮化効果, 着らい増進〕 ピンチ後; 50~100 ppm; 茎葉 散布, 0.5~1.0 mg (成分); 土 壌灌注. * 詳細は試験成績集録参照.	新規 継 (保 留)	• 試験年次不足. (試験成績の提出 後判定)
21. ツツジ 類 〔鉢物慣行〕	(1) PP-333 フロアブル 〔アイ シー アイジャパ ン〕	同 上	(埼玉園試), 新潟園試, 福井園試, 三重農枝セ ンター, (兵 庫農総セン ター農試), 福岡農総試 験研, (6)	適用性〔矮化効果, 着らい増進〕 ピンチ後; 100~200 ppm; 茎 葉散布, 1~2 mg (成分); 土 壌灌注. * 詳細は試験成績集録参照.	新規 継	• 処理時期・濃度・ 処理法および品種 について.
〔露地普通〕	(2) S-07 液 (スミセブン) 〔山本農薬, 住友化学工 業〕	E-1-(4-クロ ロフェニル)-4, 4-ジメチル- 2-(1,2,4-ト リアゾール-1 -イル)-1-ペ ンテン-3-オ ール …… 500 ppm	新潟園試, (兵庫農総 センター農 試), (福岡農 総試験研). (3)	適用性〔矮化および着花数増〕 新梢伸長初期; 10, 25, 50 ppm; 茎葉散布.	継続 (新) 保留	• 試験成績の提出後 判定.
22. アジサイ (ガクアジ サイ) 〔鉢物〕	(1) S-07 液 (スミセブン) 〔山本農薬, 住友化学工 業〕	同 上	(群馬園試), 奈良農試, (福岡農総 試験研). (3)	適用性〔矮化効果, 草姿改良等〕 * 詳細は試験成績集録参照.	新規 保留	• 試験成績の提出後 判定.
23. マ ツ	(1) benzyl-a denine ペースト (ヘルボス)	N ⁶ -ベンジルア デニン …… 0.5	神奈川園試 相模原分場, 香川農試府 中分場, 福	適用性〔腋芽発生促進により, 栽培年数の短縮と品質向上〕 4~5 月; 塗布処理. * 詳細は試験成績集録参照.	継続 実	• 〔盆栽仕立て; 腋芽 発生促進〕 新葉伸長初期, 新 梢頂部へ塗布.

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 — 今回 判定	判定理由または内容
23. マ ツ (つづき) 〔盆栽仕立〕	(1) benzyl- adenine ペースト (つづき) 〔BA〕 〔興人〕		岡農総試園 研.			

Ⅳ. 前回未検討未提出分生育調節剤

作物名 〔作型・ 栽培法〕	薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場 所(場所数) ()=実施中	試験の種類〔ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) 等; 処理方法	新継 の別 — 今回 判定	判定理由または内容
1. 野菜一般 〔ハウス促 成または 半促成〕 (S.58秋冬)	(1) TD-83 水溶 (ナルト) 〔筒井商会〕	ビタミンB ₁₂	野菜試久留 米支場. (1)	基礎〔果実肥大促進, 熟期促進 など〕 定植直後より7日毎, 収穫時 まで; 2g(2包)慣行希釈量; 土壌灌注または葉面散布. ※詳細は試験成績集録参照.	新規 — 継 (既判定)	・試験年次不足.
2. 花木類 (ツバキ) 〔鉢物〕 (S.58秋冬)	(1) S-07 液 (スミセブン) 〔住友化学工 業, 山本農 薬〕	E-1-(4-クロ ロフェニル)-4, 4-ジメチル- 2-(1,2,4-ト リアゾール-1 -イル)-1-ペ ンテン-3-オ ール … 500 ppm	神奈川県試 相模原分場, 福岡農総試 園研. (2)	適用性〔着蕾増加およびわい化〕 新梢伸長期; 茎葉散布; 12.5, 25, 50 ppm. ※詳細は試験成績集録参照.	継続 — 継	・試験例数不足. (処理時期・濃度 ・品種について)

植 調 協 会 だ よ り

◎ 第48回役員会開催す

昭和59年12月14日(金)10時より, 虎ノ門パストラル新館5階「蘭」(港区虎ノ門4-1-1)において開催し, 次の議案につき審議の上可決された。

第1号議案 予算更正の件

公益事業会計支出の部の固定資産購入支出を繰入金支出に改める。公益委託試験会計収入の部に繰入金収入を設け 60,000,000円を計上する。

公益委託試験会計支出の部に固定資産購入支出を設け 70,000,000円を計上する。公益委託試験会計支出の部の研究所費から 10,000,000円減額する。

第2号議案 設立二十周年記念表彰の件

植物調節剤開発利用普及二十年功労者表彰を337名, 協会設立特別功績者表彰を11名とする。

◎ 当協会創立二十周年記念式典ならびに祝賀会開催す

当協会が昭和39年11月12日に発足してから20周年を迎え, 昭和59年12月14日(金)に虎ノ門パストラルにおいて, 協会創立二十周年記念式典