

対象果樹 (品種名)	薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有率(%)	試験実施場所 (数)	試験の種類〔ねらい〕 処理時期；散布濃度＜水量／ a＞；処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
リンゴ ＜ひこばえ除去＞	(11) dichloroprop液 (ストッポール) 〔A-365〕 〔ユニオンカーバイド日本〕	ジクロロプロップ …… 4.5	岩手大学，青森りんご試，長野果試，山梨果試。 (4)	適用性〔ひこばえ除去効果の検討〕 ひこばえ伸長5～15cm時；50，25倍液；茎葉散布。	継続 実・継	実：〔ひこばえ除去〕 ひこばえ伸長5～15cm時，50倍液，茎葉散布。
＜発根促進＞ (わい性台木)	(12) isopropylthiolane 粒 (フジワノ) 〔日本農業〕	イソプロチオラン：ジソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンアロネート …… 12	果樹試盛岡支場。 (1)	作用性〔わい性台木の発根に及ぼす作用性について〕 ＊詳細は試験成績集録参照。	新規 継	・更に検討。
＜発根促進＞ (わい性台木)	(13) 同上	同上	青森畑作園試，岩手園試，秋田果試鹿角分場。 (3)	適用性〔わい性台木に対する発根促進効果の検討〕 苗木植え付け時；125，250，500g／樹；土壌湿処理(直径70～80cm，深さ30cmの植え穴に混和)。	新規 継	・試験年次不足。

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和59年7月15日～60年3月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録 会社
ピラゾキシフェン粒剤	バイサー粒剤	2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]アセトフェノン …… 10%	粒 剤	移植水稻	水田一年生雑草および マツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ウリカワ・ヒルムシロ	北海道	砂壤土～ 埴土(減水深2cm／日以下)	移植後3～7日(ノビエ1葉期まで)	3～4kg	灌水散布1回	石原産業(株)
					水田一年生雑草および マツバイ・	全域(北海道を除く)		移植直後～移植後7日(ノビエ1葉)			

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録 会社
ピラゾ キシフ ェン粒 剤(つ づき)					ホタルイ・ ヘラオモダ カ・ウリカ ワ・ヒルム シロ・ミズ ギャツリ			期まで。但 し九州はノ ビエ1.5葉 期まで)			
					水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ヘラオモダ カ・ウリカ ワ・ヒルム シロ・ミズ ギャツリ	全 域 (北海道 を除く)		移植後10～ 15日(ノビ エ1葉期ま で。但し九 州はノビエ 1.5葉期ま で) 〔移植前後〕 の初期土 壌処理剤 との体系 で使用	2.5～ 3 kg		
				湛水直播 水 稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ	東北・北 陸		播種前3日 ～播種後7 日(ノビエ発 生始期まで)	3kg		
					水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ウリカワ	関東以西		播種直後～ 播種後7日 (ノビエ1葉 期まで)			
ピラゾ キシフ ェン・ プレチ クロ ール粒 剤	ワンオ ール粒 剤	2-[4-(2,4- ジクロロベン ゾイル)-1,3- ジメチルピラゾ ール-5-イル オキシ]アセト フェノン ……6% 2-クロロ-2', 6'-ジメチル- N-(2-プロポ キシエチル)ア セトアニリド …1.5%	粒 剤	移植水稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ウリカワ・ ヘラオモダ カ・ミズガ ヤツリ・ヒ ルムシロ	全域の普 通期およ び早期栽 培地帯	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植後3～ 10日(ノビ エの2葉期 まで)	3～4 kg	湛 水 散 布	石原 産業 (株), 八洲 化学 工業 (株), 日本 チバ ガイ ギー (株)
ピラゾ キシフ ェノン ・プレ	ワンオ ール粒 剤8	2-[4-(2,4- ジクロロベン ゾイル)-1,3- ジメチルピラゾ	粒 剤	移植水稲	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・	北 海 道	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日	移植後3～ 10日(ノビ エの1.5葉 期まで)	3～4 kg	湛 水 散 布 1回	石原 産業 (株), 八洲

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録 会社
チラク ロール 粒剤		ールー5ーイル オキシ]アセト フェノン ……8% 2ークロロー2, 6'ージエチルー N-(2ープロポ キシエチル)ア セトアニリド …1.5%			ウリカワ・ ヘラオモダ カ・ミズガ ヤツリ・ヒ ルムシロ			以下)			化学 工業 (株), 日本 チバ ガイ ギー (株)
セトキ シジム 乳剤	ナブ乳 剤	(土)ー2ー(1ー エトキシイミノ ブチル)ー5ー (2ー(エチルチ オ)プロピル)ー 3ーヒドロキシ シクロヘキサ 2ーエノン ……20%	乳 剤	てんさい	畑地一年生 イネ科雑草 〔スズメノ カタビラ は除く〕	北 海 道		雑草生育期 〔イネ科雑 草3～5 葉期, 但 し収穫2 か月前ま で〕	150 ～ 200ml (散布 液量 100 ～ 150 l)	雑 草 茎 葉 散 布 1 回	日本 曹 達 (株)
				小 豆		全 地 域					
				大 豆							
				枝 豆							
				かんしょ							
				キャベツ ・にんじ ん							
				かんきつ	雑草生育期 〔草丈20～ 30cm, 但 し収穫2 か月前ま で〕	200 ～ 400ml (散布 液量 150 ～ 200 l)					
ススキ・チ	雑草生育期	500ml	局								

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録 会社
セトキシジム 乳剤 (つづ き)					ガヤ			[草丈40 cm. 但し 収穫2か 月前まで]	(散布 液量 150～ 200 l)	所散布(かんきつは2回以内)	
				桑	畑地一年生 イネ科雑草 (スズメノ カタビラは 除く)			雑草生育期 [草丈20～ 30 cm]	200～ 250ml (散布 液量 150～ 200 l)	雑 草 茎 葉 散 布	
				公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路 ・運動場 ・宅地等	一年生イネ 科雑草(ス ズメノカタ ビラは除く)	全 地 域		雑草生育期 [イネ科雑 草3～5 (葉期)]	150～ 400ml (散布 液量 100～ 200 l)	雑 草 茎 葉 散 布	
					ススキ・チ ガヤ			雑草生育期	500～ 1000 ml (散布 液量 150～ 200 l)	局 所 散 布	
ナプロ アニリ ド・プ レチラ クロ ール粒剤	ヨート ル粒剤 10	α-(2-ナフト キシ)プロピ オンアニリド 10% 2-クロロ-2', 6'-ジエチル- N-(2-プロポ キシエチル)ア セトアニリド 2%	粒 剤	移植水稻	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・ ヘラオモダ カ・ウリカ ワ・ミズガ ヤツリ	全域の普 通期栽培 地帯	壤土～埴 土(減水 深2cm/ 日以下)	移植後3～ 10日(ノビ エの2葉期 まで。ただ し東海以北 はノビエ1.5 葉期まで)	3～4 kg	湛 水 散 布 1 回	武田 薬品 工業 (株), 三井 東 洋 化 学 (株), 日本 チ バ カ イ ギ ー (株)
ピラゾ レート ・プレ チラク	クサホ ープ粒 剤 100	4-(2,4-ジク ロロベンゾ イル)-1,3-ジメチ ル-5-ピラゾ	粒 剤	移植水稻	水田一年生 雑草および マツバイ・ ホタルイ・	全域の普 通期およ び早期栽 培地帯	壤土～埴 土(減水 深2cm/ 日以下)	移植後1～ 10日(ノビ エ2葉期ま で)	3～4 kg	湛 水 散 布 1 回	三共 (株), 北海 三共

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録 会社
ロール 粒剤 (つづ き)		リルー β -ートル エンスルホネー ト …… 8% 2-クロロ-2, 6'-ジエチル- N-(2-プロポ キシエチル)ア セトアニリド …… 2%			ウリカワ・ ミズガヤツ リ・ヘラオ モダカ・ヒ ルムシロ						(株), 日本 チバ ガイ ギー (株), クミ アイ 化学 工業 (株)

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和59年7月15日～60年3月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数 10a当り 散布液量	希釈倍数	使用 方法	登録会社
ウニコ ナゾー ル液剤	スミセ ブン液 剤	(E)-(RS)-1 -(4-クロロフ ェニル)-4,4- ジメチル-2- (1H-1,2,4- トリアゾール- 1-イル)-1- ペンテン-3- オール …… 0.05%	液 剤	きく(ポ ットマム)	節間の伸長 抑制(矮化)	摘芯10日 後頃	5~10ml/5号 鉢 (原液 0.1~ 0.2 ml/5号 鉢)	25~50	茎葉 散布	住友化学 工業(株), 山本農薬 (株)
							50~100 ml /5号鉢 (原液 1 ml /5号鉢)	50~100	土壌 灌注	
							5~10ml/5 号鉢 (原液 0.3~ 0.5 ml/5号 鉢)	15~25	茎葉 散布	
							5~10 ml/5 号鉢 (原液 0.3~ 0.5 ml/5号 鉢)	15~20		
				ポインセ チア						
				つつじ・ しゃくな げ (鉢栽培)						