

薬剤名・剤型 (商品名) (委託者名)	有効成分および 含有量(%)	試験実施 場所(数)	試験の種類〔対象芝; 対象雑草; ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新続 の別 今回 判定	判定理由または内容
15. napropamid simazine 細粒 (ローンベスト) (つづき) 〔日本農薬〕	……1.2 CAT……0.8	程ヶ谷, 豊田, 中国G研, 西日 本G研. (6)	草全般〕 雑草発生前; 1000, 1500, 2000, g; 全面土壌処理.	継 続	(薬量, 草種, 散布法 について)
16. RPJ-832 フロアブル (モーダウン) 〔ローヌプーラン〕	ビフェノックス ……40	鬼怒川, 千葉農 試, 東名古屋, 西日本G研. (4)	適用性〔日本芝; スズメノカタビ ラを主対象とした一年生イネ科 雑草〕 雑草発生前; 75, 100, 125 ml <20~30 l>; 全面土壌処理.	継続 —— 実 ・ 継	実: 〔日本芝; スズメノ カタビラ等一年生イネ 科雑草〕 雑草発生前, 125 ml, 全面土壌処理. 継: 処理時期, 薬量の検 討
17. SDH-84Q フロアブル 〔エスディーエス〕	未公開……52	千葉農試, 東名 古屋, 西日本G 研. (3)	適用性〔日本芝; スズメノカタビ ラを主対象とした一年生イネ科 雑草〕 雑草発生前; 250, 300, 350 g <30 l>; 全面土壌処理	新規 —— 継	・成分未公開 試験年次, 例数不足.

B. 生育調節剤

1. HOK-835 水和 〔北興化学〕	未公開……50	植調研, 西日本 G研. (2)	作用性〔コウライシバ; 冬枯れ遅 延効果および一年生雑草の防除 効果の検討〕 ・刈込7~3日前. ・刈込3~7日後. ; 1000, 2000, 4000 ppm; 全面 茎葉散布.	新規 —— 継	・成分未公開. 試験年次不足.
--------------------------------	---------	----------------------------	---	---------------	--------------------

編 集 後 記

変化に注目したい。

ハーレー彗星が, 今年の11月から来年の4月
にかけ, 地球の軌道に近づくという。そのため
か否かは知らぬが, 今年は台風の発生が意外に
多く, 本土を襲うケースが非常に多い。折角,
農水省で米は豊作との予想が発表されたばかり
なのに, 今後は心配である。一方, 8月の暑さ
は厳しく, 降雨量も少なかったもので, 海水の温
度も異常に上昇し, 上層の高い水塊と下層の低
い水塊が混ざらなくなり, 下層は酸欠を来とし,
下層魚が多数死ぬという現象が生じた。これも
例年に見られなかった異常現象で, 今後の気象

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都台東区台東1丁目26番6号

電話 東京(03)832-4188(代)

昭和60年9月発行

植調第19巻第6号

定価400円(送料170円)

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉沢長人

発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)833-1821番(代)