

薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有量(%)	試験実施 場数(%)	試験の種類〔対象芝, 対象雑草, ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) <水量/a>; 処理方法等.	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
20. T P S 液 (つづき) 〔東商トップス〕			面散布.		
T S H-888 フロアブル <自主試験> 〔東洋曹達〕	未公開	西日本G研. (1)			

昭和60年度桑園関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和60年度桑園関係除草剤・生育調節剤試験成績検討会は、昭和60年12月6日(金)に、植調会館会議室において開催された。

この検討会には、試験場関係者31名、委託関係者等39名、計70名の参集を得て、除草剤11薬

剤(53点)、生育調節剤1薬剤(1点)について、試験成績の報告後に、慎重な検討が行なわれた。

その判定結果は、次に掲載する判定表のとおりである。

昭和60年度 桑園関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定表

A 除 草 剤

薬剤名・剤型 (商品名) 〔旧試験名等〕 〔委託者名〕	有効成分および 含有量(%)	試験実施 場所(%)	試験の種類〔ねらい, 対象雑草等〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
(1) ANK-553 細粒 (ゴーゴーサン) 〔ゴーゴーサン普〕	ペンディメタリ ン……………2	福島, 山梨, 三重農技, 徳 島, 熊本. (5)	適用性〔効果・薬害の検討, キク 科・ツユクサを除く畑地一年生 雑草〕 春期および夏期, 雑草発生前; 500, 600 g; 土壌処理.	継続 実	・〔キク科・ツユクサ科を 除く一年生雑草〕 春夏期, 雑草発生前, 500~600 g/a, 土壌処 理.
(2) glyphosate 液 (ラウンドアップ) 〔低薬量, 低水量〕 〔モンサント〕	グリホサート ……………41	蚕糸, 福島, 群馬, 島根農 試, 鹿児島. (5)	適用性〔低薬量低水量による効果 ・薬害の検討, イネ科を主体と した畑地一年生雑草〕 夏切り後, 雑草生育期; 10, 15, 20 ml < 1, 2.5 l >; 茎葉処理.	(新規) 継	・薬量, 水量と効果および 散布方法.

薬剤名・剤型 (商品名) [旧試験名等] [委託者名]	有効成分および 含有量 (%)	試験実施 場所 (数)	試験の種類 [ねらい, 対象雑草等] 処理時期; 散布薬量 (製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新規 の別 今回 判定	判定理由または内容
(3) Hoe-866 液 (バスタ) [バスタ協]	グルホシネート18.5	岩手, 茨城, 長野南信, 山 梨, 岐阜, 愛 媛, 高知. (7)	適用性 [実用化] [効果・被害, 畑地一年生雑草] 春期および夏期, 雑草生育期 (草丈15~30cm時); 30, 50 ml; 茎葉処理.	継続 実 ・ 継	・ [一年生雑草全般] 春夏期, 桑発芽前, 雑草 生育期 (草丈30cm以下 時), 30~50ml/a, 茎 葉処理.
(4) Hoe-866① 液 (バスタ) [ベキスト]	グルホシネート120g/a	宮城, 長野南 信, 徳島, 大 分農技. (4)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草生育期 (草丈15~30cm時); 40, 60, 80ml; 茎葉処理.	新規 実 ・ 継	実: [一年生雑草全般] 春夏期, 桑発芽前, 雑草 生育期 (草丈15~30cm 時), 60~80ml/a, 茎 葉処理. 継: 薬量と効果.
(5) HOK-15 水和 (ホクバック) [北興化学]	DBN.....30 DCMU.....10	宮城, 埼玉, 新潟, 鳥取, 宮崎総農. (5)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草発生前~ 始期; 20, 30, 50g; 土壌処理.	新規 実 ・ 継	実: [一年生雑草全般] 春夏期, 雑草発生前~始 期, 30~50g/a, 土壌処 理. 継: 薬量と草種.
(6) HOK-15① 細粒 (ホクバック) [北興化学]	DBN.....1 DCMU.....0.5	宮城, 茨城, 新潟, 鳥取, 宮崎総農. (5)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草発生前~ 始期; 500, 600, 700g; 土壌処 理.	新規 実 ・ 継	実: [一年生雑草全般] 春夏期, 雑草発生前, 600~700g/a, 土壌処 理. 継: 処理時期, 薬量と効果.
(7) KH-212 粒 (カッター) <S. 59 秋冬> [カネショウ]	KH-212粒3-2, DBN.....3 DCMU.....2 KH-212粒4-2, DBN.....4 DCMU.....2 KH-212粒4-3, DBN.....4 DCMU.....3	茨城, 新潟, 兵庫, 宮崎総 農. (4)	適用性 [効果・被害, 一年生雑草 およびヨモギ・タンポポ・ヤブ ガラシ・ギンギン等多年生雑草] 秋冬期 (積雪前まで), 雑草発 生前~始期; 600g; 土壌処理.	継続 実 ・ 継	実: [ヨモギ・タンポポ・ ヤブガラシ・ギンギン等 多年生広葉雑草および一 年生雑草] 秋冬期 (積雪前まで), 雑 草発生前~始期, 600g/ a, 土壌処理. 継: 薬量 (混合比を含む), 被害 (生育抑制).
(8) MW-831 水溶 [明治製菓]	ピアラホス...20	岩手, 埼玉, 三重農技, 鳥 根農試, 熊本 (5)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草生育期; 30, 50, 75g; 茎葉処理.	継続 実 ・ 継	実: [一年生雑草全般] 春夏期, 桑発芽前, 雑草 生育期, 50~75g/a, 茎 葉処理. 継: 薬量.
(9) MW-DC 水和 [明治製菓]	ピアラホス...12 DCMU.....18	山形, 埼玉, 兵庫, 愛媛, 鹿児島. (5)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草生育期; 50, 75g; 茎葉・土壌処理.	継続 実	・ [一年生雑草全般] 春夏期, 桑発芽前, 雑草 生育期 (草丈30cm以下 時), 50~75g/a, 茎葉 (・土壌) 処理.
(10) SKP-3 乳 [三洋貿易]	成分未公開...12	蚕糸, 岩手, 熊本. (3)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草生育期;	新規 継	・ 試験年次不足, 成分未公 開.

薬剤名・剤型 (商品名) [旧試験名等] [委託者名]	有効成分および 含有量 (%)	試験実施 場所 (数)	試験の種類 [ねらい, 対象雑草等] 処理時期; 散布薬量 (製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
10) SKP-3 乳 (つづき) [三洋貿易]			15, 30, 50ml; 茎葉処理.		
11) SSH-55 乳 (コワーク) [塩野義製薬]	トリフルラリン14 プロメトリン 6	山形, 群馬, 岐阜, 兵庫, 大分農技. (5)	適用性 [効果・被害, 畑地一年生 雑草] 春期および夏期, 雑草発生前; 80, 90, 100ml; 土壌処理.	継続 実 ・ 継	実: [一年生雑草全般] 春夏期, 桑発芽前, 雑草 発生前, 80~90ml/a, 土壌処理. 継: 薬量.

B 生育調節剤

薬剤名・剤型 (商品名) [旧試験名等] [委託者名]	有効成分および 含有量 (%)	試験実施 場所 (数)	試験の種類 [ねらい, 対象雑草等] 処理時期; 散布薬量 (製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
(1) benzyldene- nine 液 (ヘルボス) [BA] [興人]	ベンジルアデニ ン..... 1.7	蚕試. (1)	基礎 [新梢さし木における発芽促 進等の効果]	継続 継	・効果不明確.

昭和60年度春夏作野菜花き関係 除草剤・生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

昭和60年度野菜花き関係除草剤・生育調節剤
試験成績検討会は, 昭和60年12月12~13日, 虎
ノ門パストラル (東京都港区虎ノ門4-1-1)
において開催された。

この検討会には, 試験場関係者95名, 委託関
係者等97名, 計192名が参集し, 23作物に対す

る除草剤80試験321点, 15作物に対する生育調
節剤26試験68点, 前回未検討除草剤9試験21点,
生育調節剤3試験3点について, 試験成績の報
告後, 慎重な検討が行なわれた。

その判定結果については, 次表に示すとおり
である。