

薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有率 (%)	試験実施 場所 (数)	試験の種類〔対象芝; 対象雑草; ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
14. RPJ-832 (つづき) 〔ロースプーラン〕		研. (5)			壤処理. 継: ヒメクグ・ハマスゲに対す る効果の向上について.
15. SDH-84Q フロアブル 〔エスディーエス〕	TCTP.....52	鬼怒川, 千葉農試, 相模原, 東名古屋, 中国G研. (5)	適用性〔日本芝; イネ科を主とし た一年生雑草全般〕 芝生育期, 雑草発生前; 200, 250, 300ml <30 l>; 全面土 壤処理.	継続 実・ 継	実: 〔日本芝, 一年生イネ科雑 草〕 芝生育期, 雑草発生前, 200 ~300ml/a <30 l>, 全面 土壌処理. 継: 抑草期間と薬量について.

B 生育調節剤

薬剤名・剤型 (商品名) 〔委託者名〕	有効成分および 含有率 (%)	試験実施 場所 (数)	試験の種類〔対象芝; 対象雑草; ねらい〕 処理時期; 散布薬量(製品/a) <水量/a>; 処理方法等	新継 の別 今回 判定	判定理由または内容
1. AR-1 液 〔トモエ化学〕	未公開.....5	西日本G 研. (1)	作用性〔ペントグラス; 地上部, 地下部の生育促進効果の検討〕 11月~; 100, 200, 400 ml <100 l>; 全面茎葉処理.	新継 規 継	・処理方法, 薬量について.

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和60年4月1日~61年5月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	時用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
アトラ ジン・ テトラ ピオン・ DCM U・D PA粒 剤	トモスパ ーク粒剤 スーパ ーゼスト粒 剤 トモスタ ー粒剤 クサノン P粒剤 ビックア ップ180 粒剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ-ス -トリアジン5% 2,2,3,3-テ トラフルオルプロ ピオン酸ナトリ ウム.....1.5% 3-(3,4-ジ クロルフェニル) -1,1-ジメチ ル尿素.....5%	粒 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生お よび多年 生雑草	全 域		雑草発生 始期~生 育中期 (草丈50 cm位ま で)	10~15 kg	全 面 均 一 散 布	保土谷化 学工業(株), 大阪化成 (株), トモ ノ農薬(株), 武田薬品 工業(株), フマキラ ー(株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
アトラ ジン・ テトラ ピオン・ DCM U・D PA粒 剤 (つづ き)	ブッシュ ロン粒剤	2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…10% 2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ- s -トリアジン ………10% 2,2,3,3-テト ラフルオルプロ ピオン酸ナトリ ウム………3% 3-(3,4-ジ クロルフェニル) -1,1-ジメチ ル尿素………10% 2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…20%		公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・鉄 道等				雑草発生 始期～生 育期	8～15 kg		保土谷化 学工業(株)
アトラ ジン・ DCM U・D PA水 和剤	アトロソ 水和剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ- s -トリアジン ………17% 3-(3,4-ジ クロルフェニル) -1,1-ジメチ ル尿素………17% 2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…37%	水 和 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生雑 草および 多年生雑 草	全 域		雑草発生 初期～雑 草生育期	3～5 kg 〔散布液 量、噴 霧器 200～ 300 l, ジョロ 400～ 500 l〕	雑 草 茎 葉 散 布	保土谷化 学工業(株)
アトラ ジン・ DCB N・D CMU 粒剤	クミレイ キング粒 剤 デスコン 粒剤 ネコソギ 粒剤 キング草 枯し粒剤 カリシー ン粒剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ- s -トリアジン ………3% 2,6-ジクロル チオベンザミド ………3% 3-(3,4-ジ クロルフェニル) -1,1-ジメチ ル尿素………6%	粒 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生雑 草および 多年生広 葉雑草	全 域		雑草発生 始期～生 育中期	10～20 kg	全 面 均 一 散 布	保土谷化 学工業(株), 理研薬販 (株), レイ ンボー薬 品(株), キ ング化学 (株), シェ ル化学(株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
MCC・ 2,4 P A 水和 剤	プラスコ ン	メチル-N-(3, 4-ジクロロフ ェニル)カーバ メート……5% 2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物……80%	水 和 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・の り面等	一年生広 葉雑草お よび多年 生広葉雑 草	全 域		雑草生育 初期～中 期	0.5～ 1.0kg 〔散布液 量150 ～300 l〕	雑草茎 葉散 布	日産化学 工業㈱
				日 本 芝				芝の生育 期	0.5～ 1.0kg 〔散布液 量150 ～200 l〕		
DCB N・D PA・ MDB A 粒剤	クサキラ ーA 粒剤	2,6-ジクロル チオベンザミド ……2.5% 2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…5% 2-メトキシ- 3,6-ジクロル 安息香酸 ……1.3%	粒 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生雑 草および 多年生雑 草	全 域		雑草の発 生前～発 生初期	20～40 kg	全 面 均 一 散 布	北海三共 ㈱
パラコ ート・ ジクワ ット液 剤	ブリグロ ックス	1,1'-ジメチル -4,4'-ビピリ ジリウムジクロ リド……10% 1,1'-エチレン -2,2'-ビピリ ジリウムジプロ ミド……14%	液 剤	かんきつ・ りんご・ ぶどう・ なし・も も・かき	一年生雑 草	全 域		雑草生育 期	300～ 500ml 〔希釈水 量50～ 150l〕	雑草茎 葉散 布(本 剤のみ 使用の 場合5 回以内 、パラ コート を含む 農業の 総使用 回	アイシー アイジャ パン㈱、 武田薬品 ㈱、日本 農薬㈱

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使 用 量	使用 方法	登録会社
パラコ ート・ ジクワ ット液 剤 (つづ き)				桑				春期発芽 前または 夏切後		数5回以内、ジクワットを含む農薬の総使用回数5回以内	
				公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・の り面等				雑草生育 期			
メチル ダイム ロン・ 2,4 P A 水和 剤	スタッカ ーD 水和 剤	1-(α , α - ジメチルベンジ ル)-3-メチ ル-3-フェニ ル尿素……50% 2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物……12.5%	水 和 剤	日 本 芝 (こうら いしば)	一年生広 葉雑草お よびハマ スゲ	全 域		雑草生育 期	2~3kg 〔散布液 量 150 ~ 200 l〕	雑 草 茎 葉 散 布	(株)エスデ ィーエス バイオテ ック
メチル ダイム ロン・ DCM U・2, 4 PA 水和剤	ファンタ ックスA 水和剤 クサノン S 水和剤	1-(α , α - ジメチルベンジ ル)-3-メチ ル-3-フェニ ル尿素……25% 3-(3,4-ジ クロルフェニル) -1,1-ジメチ ル尿素……30%	水 和 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・の り面等	一年生お よび多年 生雑草	全 域		雑草生育 初期	2~4kg 〔希釈水 量 200 ~ 300 l〕	雑 草 茎 葉 散 布	(株)エスデ ィーエス バイオテ ック、武 田薬品工 業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録会社
メチル タイム ロン・ DCMU・2, 4PA 水和剤 (つづ き)		2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物………15%									
カルブ チレー ト・2, 4PA 水和剤	タンデッ クスD水 和剤	3-(3,3-ジ メチルウレイド) フェニル=ター シャリーブチル カルバマート ………56% 2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物………27%	水 和 剤	公園・堤 とう・駐 車場・道 路・運動 場・宅地・ のり面等	一年生雑 草および 多年生雑 草	全 域		雑草生育 初期～中 期(草丈 50cm以 下)	1～1.5 kg 〔希釈水 量 200 ～300ℓ〕	雑 草 茎 葉 散 布	(株)エスデ ィーエス バイオテ ック
ベンタ ゾン粒 剤	バサグラ ン粒剤 (ナトリ ウム塩)	3-イソプロピ ル-2,1,3-ベン ゾチアジアノ ン-(4)-2,2-ジ オキシド=ナ トリウム塩 ………11%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草 (イネ科 を除く) マツバイ・ ホタルイ・ ウリカワ・ ミズガヤ ツリ・ヘ ラオモダ カ	全域の普 通期およ び早期裁 培地帯	砂壌土～ 埴土 (減水深 1.5cm/ 日以下)	移植後15 ～35日 〔移植前 後の初 期除草 剤によ る土壌 処理と の体系 で使用〕	3～4kg	落水散布またはごく浅く湛水して散布(茎葉兼土壌処理)1回	住友化学 工業(株), 八洲 化学工業 (株), サン ケイ化学 (株), 三共 (株), 北興 化学工業 (株) クミアイ 化学工業 (株)
					オモダカ	関東・東 海以北の 普通期お よび早期 栽培地帯					
					クログワ イ	東北・北 陸・関東・ 東山およ び東海地 域の普通 期栽培地 帯					
					エゾノサ ヤヌカグ サ	北海道					

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有率	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ペンタ ゾン液 剤	バサグラ ン液剤 (ナトリ ウム塩)	3-イソプロピ ル-2,1,3-ベン ゾチアジアジ ノン-(4)-2,2 -ジオキシド= ナトリウム塩 ……………40%	液 剤	たま ね ぎ 秋播	畑地一年 生雑草 (イネ科 を除く)	全 域		6月上旬 まで(雑 草の3～ 4葉期)	60～120 m/ [希釈水 量30～ 100 l]	雑 草 茎 葉 散 布 1 回	住友化学 工業(株), 日本農薬 (株), 八洲 化学工業 (株), サン ケイ化学 (株), 三共 (株), 北興 化学工業 (株), クミ アイ化学 工業(株)
アトラ ジン・ DPA・ 2,4 P A水和 剤	プリマト ールAD 水和剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ-s -トリアジン ……………18% 2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…35% 2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物……………15%	水 和 剤	公園・庭 園・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生雑 草および 多年生雑 草	全 域		雑草生育 初期	2～4kg [希釈水 量100 ～200 l]	雑 草 茎 葉 散 布	日産化学 工業(株)
アトラ ジン・ DPA・ 2,4 P A粒剤	プリマト ールAD 粒剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ-s -トリアジン ……………4% 2,2-ジクロル プロピオン酸ナ トリウム…10% 2,4-ジクロル フェノキシ酢酸 ナトリウム-水 化物……………5%	粒 剤	公園・庭 園・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地等	一年生雑 草 多年生雑 草	全 域		雑草生育 初期～中 期 (草丈30 cm以下)	10～20 kg 30～40 kg	全 面 均 一 散 布	日産化学 工業(株)
アトラ ジン・ CAT 粒剤	プリマト ールSA 粒剤	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ-s -トリアジン ……………2% 2-クロル-4, 6-ビス(エチ	粒 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・の り面等	一年生雑 草	全 域		雑草発生 前	15～20 kg	全 面 土 壌 散 布	日産化学 工業(株), 日本チバ ガイギー (株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
アトラ ジン・ CAT 粒剤 (つづ き)		ルアミノ)ー s ー トリアジン ……………3%									
アトラ ジン・ CAT 水和剤	プリマト ール SA	2-クロル-4 -エチルアミノ -6-イソプロ ピルアミノ- s ー トリアジン ……………10% 2-クロル-4, 6-ビス(エチ ルアミノ)ー s ー トリアジン ……………45%	水 和 剤	公園・庭 園・堤と う・駐車 場・道路・ 運動場・ 宅地・の り面等	一年生雑 草	全 域		雑草発生 前	1~2kg 〔希釈水 量 100 ~300l〕	全 面 土 壌 散 布	日産化学 工業(株), 日本チバ ガイギー (株)
ニトラ リン・ DCP A水和 剤	パノップ 水和剤	4-(メチルス ルフォニル)- 2,6-ジニトロ -N, N-ジプロ ピルアニリン ……………25% 3,4-ジクロル プロピオンアニ リド……………30%	水 和 剤	たまねぎ (春播)	畑地一年 生雑草	全 域		定植活着 後25日ま で (雑草生 育初期)	400 ~ 600 g 〔希釈水 量 100 ~150l〕	雑草茎葉 散布または 全面土壌散 布1回(ニト ラリンを含 む農薬の総 使用回数2 回以内。DC PAを含む)	北興化学 工業(株), シェル化 学(株), 保 土谷化学 工業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ニトラ リン・ DCP A 水和 剤 (つづ き)										農薬の総使用回数1回	
ジメピ ペレー ト粒剤	ユカメイ ト粒剤	S-1-メチル -1-フェニル エチル=ピペリ ジン-1-カル ボチオアート ……7%	粒 剤	水 稲 (湛水直 播)	ノビエ	関東東山 以西	壤土～ 埴土 (減水深 1cm/日 以下)	は種後3 ～7日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	3～4kg	湛 水 散 布 1 回	三菱油化
ピラゾ キシフ ェン・ プロモ ブチド 粒剤	ノックワ ン粒剤	2-[4-(2,4- ジクロロベン ゾイル)-1,3- ジメチルピラ ゾール-5-イ ルオキシ]アセ トフェノン ……7% (RS)-2-ブ ロモ-N-(α , α -ジメチルペ ンジル)-3,3- ジメチルブチ ルアミド…5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ウリカワ・ ヘラオモ ダカ・ミ ズガヤツ リ・ヒル ムシロ	東海・北 陸以北の 普通期お よび早期 栽培地帯 近畿以西 の普通期 および早 期栽培地 帯	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下) 砂壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下) 〔但し、 砂壤土 は1.5 cm/日 以下〕	移植後3 ～8日 〔ノビエ 1.5葉 期まで、 但し、 東北・ 北陸以 北では 1葉期 まで〕	3kg	湛 水 散 布 1 回	住友化学 工業(株)、 石原産業 (株)、日本 農薬(株)
ピラゾ レート・ プロモ ブチド 粒剤	サリオ粒 剤	4-(2,4-ジ クロロベンゾ イル)-1,3-ジ メチル-5-ピ ラゾリル-p- トルエンスル ホネート……7% (RS)-2-ブ ロモ-N-(α , α -ジメチルペ ンジル)-3,3- ジメチルブチ ルアミド…5%	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ タルイ・ ウリカワ・ ヘラオモ ダカ・ミ ズガヤツ リ・ヒル ムシロ	東北・北 陸以北 関東以西 の普通期 および早 期栽培地 帯	壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日 以下) 砂壤土 ～埴土 (減水深 2cm/日 以下)	移植後3 ～8日 〔ノビエ 1.5葉 期まで、 但し、 東北・ 北陸以 北では 1葉期 まで〕	3kg	湛 水 散 布 (土壌処理) 1回	住友化学 工業(株)、 三共(株)、 九州三共 (株)、北興 化学工業 (株)、山本 農薬(株)
シメトリ ン・ジメ ピペレー ト・フェ ノチオー ル粒剤	セスロン 粒剤	2-メチルチオ -4,6-ビス(エ チルアミノ)- s-トリアジン	粒 剤	移植水稻	水田一年 生雑草お よびマツ バイ・ホ	全域の普 通期およ び早期栽 培地帯	砂壤土～ 埴土 (減水深 2cm/日)	水稻移植 後20～25 日 〔ノビエ〕	3～4kg	湛 水 散 布 (茎)	北興化学 工業(株)、 三菱油化 (株)

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物 名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
シメト リン・ ジメピ ペレー ト・フ ェノチ オール 粒剤 (つづ き)		…… 1.5 % S-1-メチル -1-フェニル エチル=ピペリ ジン-1-カル ボチオアート …… 10 % 2-メチル-4 -クロルフェノ キシチオ酢酸- S-エチル …… 0.7 %			タルイ・ ヒルムシ ロ・ヘラ オモダカ・ ウリカワ (北海道 を除く)・ セリ (関 東以西の 普通期栽 培地帯)		以下) (但し、 南四国 ・九州 の普通 期栽培 地帯は 減水深 1 cm / 日以下)	2.5 葉 期まで。 但し、 北海道 はノビ エ 2 葉 期まで。 (移植 前後の 初期除 草剤に よる土 壌処理 との体 系で使 用)		葉茎土壌処理) 1 回	

新登録植物成長調整剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和60年4月1日～61年5月31日

種類名	商品名	有効成分の種類 および含有量	剤 型	適用作物	使用目的	適用地帯	使用時期	使用量・ 回数 10a 当り 散布液量	希釈倍数	使用 方法	登録会社
エチク ロゼー ト乳剤	エルゴー 乳剤	5-クロル-3 (1 H)-イン ダゾリル酢酸エ チル…… 1 %	乳 剤	温室メロ ン (アー ルス系)	ネット形 成促進お よび果実 肥大促進		交配後20 日および 25日	50ml / 株 見当 2 回	1,000 ~ 1,300 倍	着果部位により上部茎葉にまんべんなく散布する	日産化学 工業㈱、 藤沢薬品 工業㈱
マレイ ン酸ヒ ドラジ ド液剤	エルノー	マレイン酸ヒド ラジドコリン …… 39 %	液 剤	ばれいし ょ	貯蔵中の 萌芽抑制	北海道を 除く全域	収穫 2 ~ 3 週間前	80 l	80 ~ 120 倍	散布	日本ヒド ラジン工 業㈱