

| 種類名                                                                | 商品名 | 有効成分の種類<br>および含有量                                                                                                                                       | 剤<br>型 | 適用作物<br>名・場所 | 適用雑草                                                                                   | 適用地帯 | 適用土壌                                                                  | 使用時期                                                                                                           | 10a 当り<br>使用量 | 使用<br>方法   | 登録会社 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| シメト<br>リン・<br>ジメピ<br>ペレー<br>ト・フ<br>ェノチ<br>オール<br>粒剤<br>( つづ<br>き ) |     | <p>……1.5%</p> <p>S-1-メチル<br/>-1-フェニル<br/>エチル=ピペリ<br/>ジン-1-カル<br/>ボチオアート</p> <p>……10%</p> <p>2-メチル-4<br/>-クロルフェノ<br/>キシチオ酢酸-S<br/>-エチル</p> <p>……0.7%</p> |        |              | タルイ・<br>ヒルムシ<br>ロ・ヘラ<br>オモダカ・<br>ウリカワ<br>(北海道<br>を除く)・<br>セリ(関<br>東以西の<br>普通期栽<br>培地帯) |      | 以下)<br>〔但し、<br>南四国<br>・九州<br>の普通<br>期栽培<br>地帯は<br>減水深<br>1cm/<br>日以下〕 | 2.5葉<br>期まで。<br>但し、<br>北海道<br>はノビ<br>エ2葉<br>期まで。<br>(移植<br>前後の<br>初期除<br>草剤に<br>よる土<br>壌処理<br>との体<br>系で使<br>用) |               | 葉茎土壌処理) 1回 |      |

## 新登録植物成長調整剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和60年4月1日～61年5月31日

| 種類名                      | 商品名        | 有効成分の種類<br>および含有量                       | 剤<br>型 | 適用作物                 | 使用目的                         | 適用地帯         | 使用時期                 | 使用量・<br>回数<br>10a 当り<br>散布液量 | 希釈倍数             | 使用<br>方法               | 登録会社                            |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| エチク<br>ロゼー<br>ト乳剤        | エルゴー<br>乳剤 | 5-クロル-3<br>(1H)-イン<br>ダゾリル酢酸エ<br>チル……1% | 乳<br>剤 | 温室メロ<br>ン(アール<br>ス系) | ネット形<br>成促進お<br>よび果実<br>肥大促進 |              | 交配後20<br>日および<br>25日 | 50ml/株<br>見当2回               | 1,000～<br>1,300倍 | 着果部位により上部茎葉にまんべんなく散布する | 日産化学<br>工業(株)、<br>藤沢薬品<br>工業(株) |
| マレイ<br>ン酸ヒ<br>ドラジ<br>ド液剤 | エルノー       | マレイン酸ヒド<br>ラジドコリン<br>……39%              | 液<br>剤 | ばれいし<br>よ            | 貯蔵中の<br>萌芽抑制                 | 北海道を<br>除く全域 | 収穫2～<br>3週間前         | 80 l                         | 80～<br>120倍      | 散布                     | 日本ヒド<br>ラジン工<br>業(株)            |

| 種類名                                   | 商品名 | 有効成分の種類<br>および含有量 | 剤<br>型 | 適用作物               | 使用目的 | 適用地帯         | 使用時期                                    | 使用量・<br>回数<br>10a当り<br>散布液量 | 希釈倍数  | 使用<br>方法 | 登録会社 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|--------|--------------------|------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|------|
| マレイ<br>ン酸ヒ<br>ドラジ<br>ド液剤<br>(つづ<br>き) |     |                   |        | ばれいし<br>ょ(つづ<br>き) |      | 北 海 道        | 黄変期 2<br>～ 3 週間<br>前(収穫<br>31～45日<br>前) |                             |       |          |      |
|                                       |     |                   |        | たまねぎ               |      | 北海道を<br>除く全域 | 収穫 1 ～<br>2 週間前                         |                             |       |          |      |
|                                       |     |                   |        |                    |      | 北 海 道        | 倒伏期 1<br>～ 2 週間<br>後(収穫<br>2～3 週<br>間前) |                             |       |          |      |
|                                       |     |                   |        | てんさい               |      |              | 収穫 3 ～<br>6 週間前                         | 100 l                       | 100 倍 |          |      |

## 植 調 協 会 だ よ り

・昭和61年度評議員会(第22回)

日時: 昭和61年9月25日(木) 13:30～15:30

場所: 植調会館 3 階会議室(東京都台東区

台東 1-26-6)

### ◎ 会議開催日程のお知らせ

## 編 集 後 記

予期せぬ台風10号くずれの熱帯性低気圧の本  
土上陸で、関東・東北地方では記録的な豪雨に  
見舞われ、各地で河川の氾濫による被害が発生  
し、米作農家にも衝撃を与えている。わが国の  
耕地利用による農業粗生産額は7兆7千億円(1  
昨年)であるので、GNPからみればわずかであ  
ろうが、農業に依存する人口は約2千万人であり、  
総人口に対する割合は16%を占めていることを  
忘れてはならない。農業に対し、自動車産業の  
伸びは目覚しく、昨年のトヨタ、日産、本田自  
動車の売上額9兆3千億円に及ばないとはいえ、  
わが国の戦後の食糧を供給し、今日の経済発展  
を裏から支えてきた農業をもう一度見つめなお  
してもらいたいものだ。各地方自治体でも、農  
業関係研究員は毎年削減され、十分な研究がで

きない現状にある。これら研究員は、2千万人  
を超える農民の道しるべとなる者であることを  
認識してもらいたい。そのためには、農耕地面  
積当りの粗生産額を向上させるような研究成果  
をあげる必要があるのではなかろうか。

財団法人 日本植物調節剤研究協会

東京都台東区台東1丁目26番6号

電話 東京(03)832-4188(代)

昭和61年8月発行

植調第20巻第5号

定価 400 円(送料 170 円)

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉 沢 長 人

発行人 植 調 編 集 印 刷 事 務 所 広 田 伸 七

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植 調 編 集 印 刷 事 務 所

電話 東京(03)833-1821番(代)