

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用地帯	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピラゾレート・プロモブチド・メフェナセツト粒剤（つづき）		……4% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド……3.5%			シロ	早期栽培地帯	九州・南四国などの暖地の普通期および早期栽培地帯	移植後5～15日 〔ノビエ〕 3葉期まで		回数2回以内	

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和61年6月1日～11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数・10a当り散布葉量	希釈倍数	使用方法	登録会社
コリン液剤	サンキャッチ液剤	塩化コリン……2%	液剤	かんしょ	発根促進およびいもの早期肥大	苗の植付時		1,000倍	苗の植付前に切り口を希釈液に1昼夜浸漬する	三菱瓦斯化学㈱
イナベンフィド水和剤	セリタード水和剤	4'-クロロ-2'-(α -ヒドロキシベンジル)イソニコチンアニリド……50%	水和剤	稲（箱育苗）	徒長防止、葉令促進	播種時	育苗箱（30×60×3cm）使用土壌約5l）1箱当たり0.125～0.25g		育苗箱1箱当たり500mlの水に希釈して覆土前の床土に均一に灌水する	中外製薬㈱
イナベンフィド粒剤	セリタード粒剤	4'-クロロ-2'-(α -ヒドロキシベンジル)イソニコチンアニリド……6%	粒剤	水稲	下位節間短縮による倒伏軽減	出穂40～60日前	3～4kg, 1回		湛水条件下で均一に散布する	中外製薬㈱

新日本原色雑草図鑑

沼田 真・吉沢長人/編集・B5判・定価9,800円

身近な雑草木600余種について1,020点のカラー写真と630点の図版を併用して示し、詳しい解説を付した他に類のない本格的植物生態図鑑。

全国農村教育協会

東京都台東区台東1-26-6（植調会館）☎03(833)1821●内容見本呈