

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省 農蚕園芸局植物防疫課

昭和61年12月1日～昭和62年11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社		
ビアラホス水溶剤	ハービエース水溶剤	L-2-アミノ-4-[(ヒドロキシ)(メチル)ホスフィノイル]ブチリル-L-アラニル-L-アラニンのナトリウム塩 ……20%	水溶剤	かんきつ・ぶどう・なし・もも・うめ・かき	畑地一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)収穫30日前まで	500～750g 〔散布水量100～150l以下すべて同量〕	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを含む農薬の総使用回数3回以内〕	明治製菓(株)、武田薬品工業(株)		
					畑地多年生雑草				750～1,000g				
				りんご	畑地一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)収穫21日前まで	500～750g	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを含む農薬の総使用回数2回以内〕			
					畑地多年生雑草				750～1,000g				
				キャベツ・はくさい	畑地一年生雑草			定植前雑草生育期(草丈20cm以下)	300～500g	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを含む農薬の総使用回数1回〕			
				トマト	畑地一年生雑草								
				きゅうり				雑草生育期定植前または定植後畦間処理		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを含む農薬の総使用回数4回以内〕			
												雑草茎葉散布 〔本剤および	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ビアラ ホス水 溶剤 (つづ き)				きゅう り(つ づき)						ビアラホス を含む農薬 の総使用回 数3回以内	
				すいか				定植後畦 間処理 収穫60日 前まで		雑草茎葉散布 〔本剤および ビアラホス を含む農薬 の総使用回 数1回〕	
				花 木				雑草生育 期(草丈 20 cm 以 下)		雑草茎葉散布	
				桑				春期萌芽 前および 夏切後(雑 草生育期)	500 ~ 750 g		
				公園・ 庭園・ 堤とう・ 駐車場・ 道路・ 運動場・ 宅地・ のり面・ その他	一年生 雑草 多年生 雑草			雑草生育 期(草丈 30 cm 以 下)	750 ~ 1,000 g		
ジメタ メトリ ン・ピ ラゾレ ート・ プレチ ラクロ ール粒 剤	クサホー プD粒剤	2-メチルチ オ-4-エチ ルアミノ-6 -(1,2-ジ メチルプロピ ルアミノ)- S-トリアジ ン……0.2% 4-(2,4-ジ クロロベン ゾイル)-1, 3-ジメチル -5-ピラゾ リル-p-ート ルエンスルホ ネート…6% 2-クロロー 2',6'-ジエチ	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草およ びマツ バイ・ ホタル イ・ウ リカワ・ ヘラオ モダカ・ ミズガ ヤツリ・ ヒルム シロ・ アオミ ドロ・ 藻類に よる表	全域の 普通期 および 早期裁 培	砂壌土 ~埴土 (減水深 2cm /日以下。但 し、九州、南 四国など の暖地では 減水深 1.5cm /日以下)	移植後3 ~10日 (ノビエ 2葉期ま で)	3 kg	灌水散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回、ジ メタメトリ ンを含む農 薬の総使用 回数1回、 ピラゾレ ートを含む農 薬の総使用 回数1回、 プレチラク ロールを含 む農薬の総 使用回数2 回以内〕	三共(株)、 九州三共 (株)、日本 チバガイ ギー(株)、 クミアイ 化学工業 (株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ジメタ メトリ ン・ピ ラゾレ ート・ プレチ ラクロ ール粒 剤(つ づき)		ル-N-(2- プロポキシ エチル)アセ トアニリド ……1.5%			層はく 離・オ モダカ (東北、 北陸、 九州)・ ウキク サ(近 畿、中 国、四 国)						
ジメタ メトリ ン・プ レチラ クロール 粒剤	バレージ 粒剤	2-メチルチ オ-4-エチ ルアミノ-6 -(1,2-ジ メチルプロピ ルアミノ)- s-トリアジ ン……0.1% 2-クロロ- 2,6'-ジエチ ル-N-(2- プロポキシ エチル)アセ トアニリド ……2%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草およ びマツ バイ・ ホタル イ・ヘ ラオモ ダカ・ ミズガ ヤツリ・ アオミ ドロ・ 藻類に よる表 層はく 離	東北・ 北陸以 北 関東以 西の普 通期栽 培地帯 および 九州・ 南四国 などの 暖地の 早期栽 培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水 深2cm /日以下、 但し、近 畿・中 国・四 国・九 州では 砂壤土 を除く)	移植後3 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで) 移植後3 ～7日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	3kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回、ジ メタメトリ ンを含む農 薬の総使用 回数1回、 プレチラ クロールを 含む農薬の 総使用回数2 回以内〕	武田薬品 工業㈱、 日本チバ ガイギー ㈱
ジメタ メトリ ン・ナ プロア ニリド・ プレチ ラクロ ール粒 剤	ヨートル D粒剤	2-メチルチ オ-4-エチ ルアミノ-6 -(1,2-ジ メチルプロピ ルアミノ)- s-トリアジ ン……0.1% α-(2-ナ フトキシ)プ ロピオンアニ リド……7% 2-クロロ- 2,6'-ジエチ ル-N-(2- プロポキシ エチル)アゼ トアニリド ……2%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草およ びマツ バイ・ ホタル イ・ヘ ラオモ ダカ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ・ アオミ ドロ・ 藻類に よる表 層はく 離	東北・ 北陸以 北 関東以 西の普 通期栽 培地帯	砂壤土 ～埴土 (減水 深2cm /日以下、 但し、砂 壤土は 減水深 1cm/ 日以下)	移植後3 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで) 移植後3 ～7日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	3kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回、ジ メタメトリ ンを含む農 薬の総使用 回数1回、 ナプロア ニリドを 含む農薬の 総使用回数1回、 プレチラ クロールを 含む農薬の 総使用回数2 回以内〕	武田薬品 工業㈱、 日本チバ ガイギー ㈱、三井 東圧化学 ㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
チアザフルロン粒剤	エルボタン粒剤	1,3-ジメチル-1-(5-トリフルオロメチル)-1,3,4-チアジアゾール-2-イル) 尿素 ……5%	粒剤	鉄道・道路・駐車場・運動場	一年生および多年生雑草			雑草発生始期	15 kg	全面均一散布	日本チバガイギー(株)、日本化学工業(株)
								雑草生育初期(草丈 20 cm 以下)	15 ~ 20 kg		
								雑草生育中期(草丈 50 cm 以下)	20 ~ 30 kg		
チアザフルロン水和剤	エルボタン水和剤	1,3-ジメチル-1-(5-トリフルオロメチル)-1,3,4-チアジアゾール-2-イル) 尿素 ……80%	水和剤	鉄道・道路・駐車場・運動場	一年生および多年生雑草			雑草生育初期(草丈 30 cm まで)	1 kg 〔散布液量 200 l〕	雑草茎葉散布	日本チバガイギー(株)、日産化学工業(株)
								雑草生育盛期(草丈 50 cm まで)	1.5 kg 〔散布液量 200 ~ 300 l〕		
エチジムロン水和剤	ウスチラン水和剤	1-(5-エチルスルホニル)-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素 ……70%	水和剤	公園・庭園・道路・運動場・駐車場	一年生および多年生雑草			雑草生育初期~中期(草丈 30 cm 以下)	500 ~ 1,000 g 〔希釈水量 100 ~ 300 l〕	雑草茎葉散布または全面土壌散布	日本特殊農業製造(株)
イマザピル液剤	アーセナル	イソプロピルアンモニウム=(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリン-2-イル)ニコチナート……25%	液剤	鉄道・工場敷地(タンクヤード)等	一年生雑草			雑草生育期	200 ~ 400 ml 〔希釈水量 60 ~ 100 l 以下すべて同量〕	全面均一散布	日本サイアナミッド(株)、保土谷化学工業(株)
					多年生雑草				600 ~ 1,000 ml		
					クズ、ササ類				1,000 ~ 1,400 ml		
ヘキサジノン粒剤	ベルバー粒剤	3-シクロヘキシル-6-ジメチルアミ	粒剤	駐車場・道路・運動場	一年生雑草			発生始期~生育期	5~10 kg	全面均一散布	丸和バイオケミカル(株)

— 30 —

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジメピペレート・ベンゾフェナップ粒剤（つづき）		ラゾール5-イルオキシ-4'-メチルアセトフェノン……6%		湛水直播水稻	水田一年生雑草およびワカマツバイ	近畿以西	壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	播種直後～播種後7日（ノビエ1.5葉期まで）			
テブチウロン粒剤	ハービック粒剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素……5%	粒剤	駐車場・道路・運動場・鉄道軌道内・宅地	一年生および多年生雑草			雑草発生前～生育初期	10～15 kg	全面土壌散布または雑草茎葉散布	武田薬品工業㈱，日本カーリット㈱
								生育中	15～20 kg		
テブチウロン水和剤	ハービック水和剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素……80%	水和剤	駐車場・道路・運動場・鉄道軌道内・宅地	一年生および多年生雑草			雑草発生前～生育初期	250～500 g 〔希釈水量 100～200ℓ〕	全面土壌散布または雑草茎葉散布	武田薬品工業㈱，日本カーリット㈱
								生育中期	500～1,000 g 〔希釈水量 200～400ℓ〕		
ジメピペレート・ベンスフロンメチル粒剤	プッシュ粒剤17	S-1-メチル-1-フェニルエチル=ピペリジン-1-カルボクシアート……10% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)カルバモイルスルファモイル)-オート……0.17%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ（北陸・関東以西）・セリ	北海道 東北 北陸・関東以西の普通期栽培地帯 関東以西の早期栽培	砂壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	移植後5～15日（ノビエ1.5葉期まで） 移植後5～10日（ノビエ1.5葉期まで） 移植後5～10日（ノビエ2葉期まで） 移植後5～13日（ノビエ	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回，ジメピペレートを含む農薬の総使用回数1回，ベンスフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	デュポンジャパンリミテッド，三菱油化㈱，北興化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジメピペレート・ベンスルフロンメチル粒剤 (つづき)					コウキヤガラ(九州)・アオミドロ・藻類による表層はく離	地帯		2葉期まで)			
					水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ	北陸		移植後15～20日(ノビエ2葉期まで) 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用			
ジメピペレート・ベンスルフロンメチル粒剤	プッシュ粒剤25	S-1-メチル-1-フェニルエチル=ピペリジン-1-カルボチオアート ……10% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアート ……0.25%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ・セリ・シズイ・エゾノサヤヌカグサ(北海道)・コウキヤガラ	北海道	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～15日(ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布(本剤のみを使用する場合1回、ジメピペレートを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内)	デュボンジャパンリミテッド、三菱油化(株)、北興化学工業(株)
						東北		移植後5～15日(ノビエ2葉期まで)			
						北陸・関東以西の普通期栽培地帯		移植後5～10日(ノビエ2葉期まで)			
						関東以西の早期栽培地帯		移植後5～13日(ノビエ2葉期まで)			
						北海道・東北・北陸		移植後15～20日(ノビエ			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジメビペレート・ベンスルフロンメチル粒剤（つづき）								2葉期まで）、移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用			
ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ粒剤	ウルフ粒剤 17	メチル＝ α －（4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル－ α － α ートルアート …0.17% s－（4－クロルベンジル）－N, N－ジエチルチオカーバメート ……7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラモモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ（北陸・関東以西）・セリ・コウキヤガラ（九州）・クサネム・ヒメホタルイ（九州）・アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北 北陸・関東以西の普通期栽培地帯 関東以西の早期栽培地帯 北陸	砂壤土～埴土（減水深2cm／日以下） 埴土～埴土（減水深2cm／日以	移植後5～15日（ノビエ1.5葉期まで） 移植後5～10日（ノビエ1.5葉期まで） 移植後5～10日（ノビエ2葉期まで） 移植後5～13日（ノビエ2葉期まで） 移植後15～20日（ノビエ2葉期まで）	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	デュボンジャパンリミテッド、クミアイ化学工業㈱、九州三共㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ粒剤（つづき）					ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ		下）	移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用			
ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ粒剤	ウルフ粒剤 25	メチル＝ α －（4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル）－ α － α －トルアート ……0.25% s－（4－クロルベンジル）－N, N－ジエチルチオカーバメート ……7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ・セリ・シズイ・エゾノサヤヌカグサ（北海道）・コウキヤガラ（九州）・クサネム・ヒメホタルイ（九州）・アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北 北陸・関東以西の普通期栽培地帯 関東以西の早期栽培地帯 北海道・東北・北陸	壤土～埴土（減水深2cm／日以下）	移植後5～15日（ノビエ1.5葉期まで） 移植後5～15日（ノビエ2葉期まで） 移植後5～10日（ノビエ2葉期まで） 移植後5～13日（ノビエ2葉期まで） 移植後15～20日（ノビエ2葉期まで） 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	デュポン・ジャパン・リミテッド、クミアイ化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ペンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤	ザーク粒剤 17	メチル＝αー (4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアート …0.17% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド……3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ	北海道	壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後5～15日 (ノビエ2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数2回以内〕	デュボンジャパンリミテッド、日本特殊農薬製造(株)、クミアイ化学工業(株)、三共(株)
					イ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ	東北・北陸・関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯		移植後5～15日 (ノビエ2.5葉期まで)			
					イ(北陸・関東以西)・セリ・アオミドロ・藻類による表層はく離	近畿以西の普通期および早期栽培地帯		移植後5～15日 (ノビエ3葉期まで)			
ペンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤	ザーク粒剤 25	メチル＝αー (4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアート …0.25% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド……4%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ・シズイ・エゾノサヤヌカグサ	北海道	壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後5～15日 (ノビエ2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数2回以内〕	デュボンジャパンリミテッド、日本特殊農薬製造(株)、クミアイ化学工業(株)、北海三共(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ペンス ルフロン メチル・メ フェナ セット 粒剤 (つづき)					(北海道)・セリ・アオミドロ・藻類による表層はく離						
プレチ ラクロ ール・ ペンス ルフロン メチ ル粒剤	ゴルボ粒 剤 17	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ……2% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイル)-o-トルアート ……0.17%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・オモダカ・ヘラオモダカ・アオミドロ・藻類による表層はく離	北陸・関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～10日(ノビエの1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内、ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	武田薬品工業㈱、デュボンジャパンリミテッド、日本チバガイギー㈱
プレチ ラクロ ール・ ペンス ルフロン メチ ル粒剤	ゴルボ粒 剤 25	2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド ……2% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイル)-o-トルアート ……0.25%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・オモダカ・ヘラオモダカ・アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道 東北・北陸	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後5～15日(ノビエの1.5葉期まで) 移植後5～10日(ノビエの1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内、ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	武田薬品工業㈱、デュボンジャパンリミテッド、日本チバガイギー㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社	
MCP P・M DBA・ 2,4P A液剤	トリメックF液剤	α-(2-メチル-4-クロルフェノキシ)プロピオン酸ジメチアミン……12% 2-メトキシ-3,6-ジクロル安息香酸ジメチルアミン……2.5% 2,4-ジクロルフェノキシ酢酸ジメチルアミン…26%	液剤	日本芝	畑地一年生広葉雑草			雑草生育期	400～800g 〔希釈水量100～150l〕	雑草茎葉散布	日本農薬(株)、東洋グリーン(株)	
メトラクロール乳剤	デュアール乳剤	2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド……45%	乳剤	とうもろこし	畑地一年生雑草	全 域	砂壤土～埴土	播種後発芽前(雑草発生前)	200～400ml 〔希釈水量70～100l〕	全面土壌散布 〔本剤およびメトラクロールを含む農薬の総使用回数1回、以下他の使用方法でも同じ〕	日本チバガイギー(株)、武田薬品工業(株)、北海三共(株)	
								挿苗後(雑草発生前)				
								播種後発芽前(雑草発生前)				
						北海道・東北						
						北海道		定植後(雑草発生前)				
						全 域	砂壤土～埴土		100～200ml 〔希釈水量70～100l〕	畦間株間土壌散布 全面土壌散布		
								播種後(雑草発生前)				
プロメトリン・メトラクロール水和剤	コダール水和剤	2-メチルチオ-4,6-ビス(イソプロピルアミノ)	水和剤	とうもろこし	畑地一年生雑草	北海道	砂壤土～埴土	播種後発生前(雑草発生前)	300～400g 〔希釈水量70～〕	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合1回、プ	日本チバガイギー(株)、武田薬品工業(株)	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社		
プロメトリン・メトラクロール水和剤(つづき)		ー s - トリアジン……20% 2 - クロロ - 2' - エチル - N - (2 - メトキシ - 1 - メチルエチル) - 6' - メチルアセトアニリド……30%		えだまめ・大豆		全 域			100 l 以下すべて同量	ロメトリンを含む農薬の総使用回数1回、但し、らっかせいのみ2回以内、メトラクロールを含む農薬の総使用回数1回			
				小 豆		北海道			300 g				
				さやいんげん・いんげんまめ					300 ～ 400 g				
				らっかせい		関東以西							
				たまねぎ		北海道		定植活着後または中耕除草後(雑草発生前)	200 ～ 300 g				
プロメトリン・メトラクロール粉粒剤	コダール細粒剤 F	2 - メチルチオ - 4,6 - ビス(イソプロピルアミノ) - ー s - トリアジン……1% 2 - クロロ - 2' - エチル - N - (2 - メトキシ - 1 - メチルエチル) - 6' - メチルアセトアニリド……2%	粉粒剤	とうもろこし	畑地一年生雑草	北海道を除く全 域	砂壌土～埴土	播種後発芽前(雑草発生前)	5～6kg	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合1回、以下他の使用方法でも同じ、プロメトリンを含む農薬の総使用回数1回、但し、にんじんとらっかせいは2回以内、メトラクロールを含む農薬の総使用回数1回〕	日本チバガイギー(株)、武田薬品工業(株)		
				えだまめ・大豆									
				にんじん		全 域		定植後(雑草発生前)	3～4kg			畦間株間土壌散布	
				キャベツ					3～5kg				
				はくさい			埴土～埴土	定植前(雑草発生前)	4 kg			全面土壌散布	
								定植後(雑草発生前)					

種類名	商 品 名	有効成分の 種類および 含 有 量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
プロメ トリン・ メトラ クロール 粉粒 剤（つ づき）				らっか せい			砂壤土 ～埴土	播種後発 芽前（雑 草発生前）	5～6 kg	全面土壌散布	
								マルチ前・ 播種前 （雑草発 生前）	2～3 kg	土壌混和	
									4～5 kg		
								春期萌芽 前および 夏切後 （雑草発 生前）	5～6 kg	全面土壌散布	
アトラ ジン・ メトラ クロール 水和 剤	ゲザノン フロアブ ル	2－クロロ－ 4－エチルア ミノ－s－ト リアジン ……15% 2－クロロ－ 2’－エチル－ N－（2－メ トキシ－1－ メチルエチル） －6’－メチル アセトアニリ ド……25%	水 和 剤	とうも ろこし	畑地一 年生雑 草	全 域 北海道	砂壤土 ～埴土	播種後発 芽前（雑 草発生前） 生育期 （とうも ろこし2 ～4葉期）	200 ～ 400 ml 〔希釈水 量70～ 100 l〕	全面土壌散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回、ア トラジンを 含む農薬の 総使用回数 2回以内、 メトラクロ ールを含む 農薬の総使 用回数1回〕	日本チバ ガイギー （株）、武田 薬品工業 （株）、クミ アイ化学 工業（株）

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和61年12月1日～昭和62年11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数・10a当り散布液量	希釈倍数	使用方法	登録会社
マレイン酸ヒドラジド液剤	OMH-K液剤	マレイン酸ヒドラシドカリウム……32%	液剤	たばこ	腋芽抑制	芯止後	1株当り20～25 ml	黄色種60倍	散布	大塚化学(株)