

種類名	商 品 名	有効成分の 種類および 含 有 量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
プロメ トリン・ メトラ クロール 粉粒 剤（つ づき）				らっか せい			砂壤土 ～埴土	播種後発 芽前（雑 草発生前）	5～6 kg	全面土壌散布	
								マルチ前・ 播種前 （雑草発 生前）	2～3 kg	土壌混和	
									4～5 kg		
								春期萌芽 前および 夏切後 （雑草発 生前）	5～6 kg	全面土壌散布	
アトラ ジン・ メトラ クロール 水和 剤	ゲザノン フロアブ ル	2-クロロ- 4-エチルア ミノ-s-ト リアジン ……15% 2-クロロ- 2'-エチル- N-(2-メ トキシ-1- メチルエチル)- 6'-メチル アセトアニリ ド……25%	水 和 剤	とうも ろこし	畑地一 年生雑 草	全 域 北海道	砂壤土 ～埴土	播種後発 芽前（雑 草発生前） 生育期 （とうも ろこし2 ～4葉期）	200 ～ 400 ml 〔希釈水 量70～ 100 l〕	全面土壌散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回、ア トラジンを含 む農薬の総 使用回数 2回以内、 メトラクロ ールを含む 農薬の総使 用回数1回〕	日本チバ ガイギー （株）、武田 薬品工業 （株）、クミ アイ化学 工業（株）

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課
昭和61年12月1日～昭和62年11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数・10a当り散布液量	希釈倍数	使用方法	登録会社
マレイン酸ヒドラジド液剤	OMH-K液剤	マレイン酸ヒドラシドカリウム……32%	液剤	たばこ	腋芽抑制	芯止後	1株当り20～25 ml	黄色種60倍	散布	大塚化学(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回数・10a当り散布液量	希釈倍数	使用方法	登録会社
マレイ ン酸ヒ ドラジ ド液剤 (つづき)								在米種およびパー レー種 75倍		
過酸化 カルシ ウム粉 粒剤	カルパー 粉粒剤 A	過酸化カルシ ウム……11%	粉 粒 剤	湛水直播 水稻	発芽率の 向上、苗 立歩合の 安定	播種前浸 種後	乾燥種粒重 量の3倍重 量		空中散布用種 粒に湿粉衣	保土谷化 学工業㈱、 日本化薬 ㈱
ジクロ ルプロ ップ液 剤	エラミカ 液剤	トリエタノール アルミン＝2 ー(2,4-ジ クロルフェノ キシ)プロピ オン酸塩 ……15.5%	液 剤	日向夏・ 甘夏・河 内晩柑	後期落果 防止	収穫開始 予定日の 30日前ま で(11月 以降)	300～500 l 1回	330～ 500倍	立木全面散布	ユニオン カーバイ ド㈱、日 本農薬㈱
				伊予柑・ 甘夏・ネ ーブル	へた落ち 防止	収穫開始 予定日の 20～30日 前				
				温州みか ん	間引摘果	満開後30 日頃(果 径15mm の時期)		1,000～ 2,000倍		
コリン 液剤	サンキャ ッチ液剤 30s	塩化コリン ……30%	液 剤	かんしょ	肥大促進	苗植付後 30～50日	100 l 1回	200～ 300倍	茎葉散布	三菱瓦斯 化学㈱

財団法人 日本植物調節剤研究協会
東京都台東区台東1丁目26番6号
電話 東京(03)832-4188(代)

編集人 日本植物調節剤研究協会専務理事 吉沢長人
発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

昭和62年12月発行

植調第21巻第9号

定価400円(送料170円)

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京(03)833-1821番(代)