

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和62年12月1日～63年3月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジメピペレート・プロモブチド・MCPB粒剤	ピリカーナ粒剤	S-1-メチル-1-フェニルエチル=ピペリジン-1-カルボチオアート…10% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド…4% 2-メチル-4-クロルフェノキシ酪酸エチル…0.8%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ	近畿以西の普通期および早期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深1cm/日以下)	移植後5～10日 (ノビエの2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、ジメピペレートを含む農薬の総使用回数2回以内、プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回、MCPBエチルを含む農薬の総使用回数3回以内。〕	サンケイ化学(株)、三菱油化(株)、住友化学工業(株)、日本化薬(株)。
						北海道・東北・北陸	埴土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後20～25日 (ノビエの2葉期まで)			
					水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土 (減水深1cm/日以下)	〔移植前後の初期除草剤による土壌処理剤との体系で使用。〕			
ピラゾレート・プロモブチド・ベンチオカーブ粒剤	リワード粒剤	4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル-p-トルエンスルホネート…4% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメ	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ	東北・北陸	埴土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後3～10日 (ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、ピラゾレートを含む農薬の総使用回数1回、プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回、ベ	クミアイ化学工業(株)、三共(株)、九州三共(株)、住友化学工業(株)。
					水田一年生雑草およびマツ	関東以西の普通期および近	砂壤土～埴土 (減水深2cm	移植後3～8日 (ノビエ1.5葉期			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピラゾレート・プロモブチド・ベンチオカーブ粒剤（つづき）		チルブチルアミド……4% S-（4-クロルベンジル）-N，N-ジエチルチオカーバメート……5%			バイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ	畿以西の早期栽培地帯	／日以下）	まで）		ンチオカーブを含む農薬の総使用回数1回	
ペンディメタリン水和剤	ウェイアップフロアブル	N-（1-エチルプロピル）-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン……45%	水和剤	日本芝（こうらいしば） 公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等	畑地一年生雑草（キク科雑草を除く）			雑草発生前	400～900 ^g 〔希釈水量200～300l〕	全面土壌散布	日本サイアナミッド㈱
フェノキサプロップエチル乳剤	フローレ乳剤	エチル＝（RS）-2-〔4-（6-クロロ-1,3-ベンゾオキサゾール-2-イルオキシ）フェノキシ〕プロピオート……9%	乳剤	てんさい 大豆・枝豆・小豆・さやいんげん にんじん かんしょ	畑地一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	北海道 全 域		雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）但し、定植後2カ月まで。 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）但し、播種後1カ月まで。 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）但し、挿苗後1カ月まで。	75～150 ^{ml} 〔希釈水量100l〕	雑草茎葉散布	ヘキストジャパン㈱、三共㈱、北海三共㈱、九州三共㈱。

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
フェノキサプロップエチル乳剤(つづき)				キャベツ				雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、定植後1カ月まで。			
				いちご(親株床)				雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)			
				たまねぎ				雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、定植後2カ月まで。			
エスプロカルブ・ベンスルフロンメチル粒剤	フジグラ ス粒剤25	S-ベンジル =1,2-ジメチルプロピル (エチル)チ オカルバマー ト………7% メチル=α- (4,6-ジメ トキシビリミ ジン-2-イ ルカルバモイ ルスルファモ イル)-o- トルアート ……0.25%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草およ びマツ バイ・ ホタル イ・ウ リカワ・ ミズガ ヤツリ・ クログ ワイ・ オモダ カ・ヘ ラオモ ダカ・ ヒルム シロ・ アオミ ドロ・ 藻類に よる表 層はく 離	全域の 普通期 および 早期栽 培地帯	壤土～ 埴土 (減水 深2cm /日以 下)	移植後5 ～15日 (ノビエ 2.5葉期 まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回、エ スプロカル ブを含む農 薬の総使用 回数1回、 ベンスルフ ロンメチル を含む農薬 の総使用回 数2回以内〕	アイ・シ ー・アイ・ ジャパン (株)、日本 農薬(株)、 デュポン ジャパン リミテッ ド。
エスプロカルブ・ベンスルフロンメチル粒剤	フジグラ ス粒剤17	S-ベンジル =1,2-ジメチルプロピル	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草およ	北陸・ 関東以 西の普	砂壤土 ～埴土 (減水	移植後5 ～15日 (ノビエ		湛水散布 〔本剤のみを 使用する場	アイ・シ ー・アイ・ ジャパン

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
エスプロカルブ・ベンスルフロンメチル粒剤（つづき）		（エチル）チオカルバマート……7% メチル＝α－（4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイル）－o－トルアート ……0.17%			びまつパイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・クログワイ・オモダカ・ヒルムシロ・アオミドロ・藻類による表層はく離	通期および早期栽培地帯	深2cm／日以下	2.5葉期まで		合の使用回数1回、エスプロカルブを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	㈱、日本農薬㈱、デュボンジャパンリミテッド。
クロメプロップ・プレチラクロール粒剤	センテ粒剤	（RS）－2－（2,4－ジクロロ－m－トリロキシ）プロピオンアニリド ……1.5% 2－クロロ－2',6'－ジエチル－N－（2－プロポキシエチル）アセトアニリド ……1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびびまつパイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ミズガヤツリ	全域の普通期栽培地帯	壤土～植土（減水深2cm／日以下）	移植後3～10日（ノビエ1.5葉期まで）	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、クロメプロップを含む農薬の総使用回数2回以内、プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内〕	三菱油化㈱、日本チバガイギー㈱、日本農薬㈱。

財団法人 日本植物調節剤研究協会
東京都台東区台東1丁目26番6号
電話 東京（03）832-4188（代）

編集人 日本植物調節剤研究協会 会長 吉沢長人
発行人 植調編集印刷事務所 広田伸七

昭和63年5月発行

植調第22巻第2号

定価400円（送料170円）

東京都台東区台東1-26-6 全国農村教育協会

発行所 植調編集印刷事務所

電話 東京（03）833-1821番（代）