

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

昭和63年4月1日～63年11月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ジメタ メトリ ン・ピ ラゾレ ート・ プレチ ラクロ ール粒 剤	クサホー プ95D粒 剤	2-メチルチ オ-4-エチ ルアミノ-6 -(1,2-ジ メチルプロピ ルアミノ)- s-トリアジ ン……0.2% 4-(2,4-ジ クロロベン ゾイル)-1, 3-ジメチル -5-ピラゾ リル-p-ト ルエンスルホ ネート……8% 2-クロロ- 2',6'-ジエチ ル-N-(2- プロポキシエ チル)アセト アニリド ……1.5%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ヘ ラオモ ダカ・ ヒルム シロ・ アオミ ドロ・ 藻類に よる表 層はく 離	北海道	砂壤土 ～埴土 (減水 深2cm /日以下)	移植後3 日～移植 後15日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	3kg	灌水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回,ジ メタメトリ ンを含む農 薬の総使用 回数1回, ピラゾレー トを含む農 薬の総使用 回数1回, プレチラク ロールを含 む農薬の総 使用回数2 回以内〕	三共㈱, 北海三共 ㈱,日本 チバガイ ギー㈱, クミアイ 化学工業 ㈱
ダイム ロン・ ビフェ ノック ス粒剤	ラムジン 粒剤	1-(α , α - ジメチルベン ジル)-3-(パラトリル) 尿素……6% 5-(2,4-ジ クロルフェ ノキシ)-2 -ニトロ安息 香酸メチル ……6%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ヘラオ モダカ	北海道	埴土～ 埴土 (減水 深2cm /日以下) 〔但し, 九州・ 南四国 などの 暖地の 普通期 は(1	移植後3 ～5日 (ノビエ 1葉期ま で)	3～4kg	灌水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回,ダ イムロンを 含む農薬の 総使用回数 1回,ビフ ェノックス を含む農薬 の総使用回 数2回以内〕	八洲化学 工業㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	登録会社
ダイムロン・ビフェノックス粒剤（つづき）					イ・ホタルイ・ヘラオオダカ・ミズガヤツリ	普通期栽培地帯	cm/日以下)				
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ	近畿以西の普通期及び関東・東海の早期栽培地帯					
ビフェノックス・SAP粒剤	リーダール粒剤	5-（2,4-ジクロルフェノキシ）-2-ニトロ安息香酸メチル……6% 0,0-ジイソプロピル-2-（ベンゼンスルホンアミド）エチルジチオホスフェート……5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ	北海道	壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	移植直後～移植後7日（ノビエ1葉期まで）	3～4 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、ビフェノックスを含む農薬の総使用回数2回以内、SAPを含む農薬の総使用回数2回以内〕	八洲化学工業㈱
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ミズガヤツリ	東北・北陸					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	関東以西の普通期及び早期栽培地帯（九州・南四国などの暖地を除く）	砂埴土～埴土（減水深2cm/日以下）				
グリホサート液剤	ポラリス液剤	N-（ホスホノメチル）グリシンのイソ	液剤	かんきつ・りんご	一年生雑草及びヨモ			雑草生育期（草丈30cm以下）	300～500 ml/希釈水	雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサート〕	日本モンザート㈱、北興化学

種類別	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
グリホ サート 液剤 (つづ き)		プロピルアミ ン塩		ぶどう	ギ・タ ンボボ・ チガヤ・ ギシギ シ				量 25 l 少量散 布	を含む農薬 の総使用回 数 3 回以内	工業㈱, 塩野義製 薬㈱
				水田畦 畔						雑草茎葉散布 〔本剤及びグ リホサート を含む農薬 の総使用回 数 1 回〕	
				水田耕 起前				雑草生育 期(草丈 30cm以下) 耕起10日 以前			
				桑				雑草生育 期(草丈 30cm以下) 春期萌芽 前及び夏 切後萌芽 前		雑草茎葉散布	
フェノ チオー ル粒剤	ホクコー ゼロワン 粒剤	2-メチル- 4-クロルフ ェノキシチ オ酢酸-S-エ チル…1.4%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生広 葉雑草	北海道 を除く 全域の 普通期 栽培地 帯	砂壤土 ～埴土	有効分け つ終止期 ～幼穂形 成始期	3～4 kg	湛水散布 〔本剤及びフ ェノチオー ルを含む農 薬の総使用 回数 1 回〕	北興化学 工業㈱
シメト リン・ ニトラ リン・ フェノ チオー ル粒剤	ホクコー ウィード ナックス 粒剤	2-メチルチ オ-4,6-ビ ス(エチルア ミノ)-S- トリアジン ……1.5% 4-(メチル スルフォニル) -2,6-ジニ トロ-N, N -ジプロピル アニリン ……3% 2-メチル- 4-クロルフ ェノキシチ オ酢酸-S-エ チル…0.7%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ヘラオ モダカ・ ウリカ ワ・ヒ ルムシ ロ	北海道 及び九 州・南 四国な どの暖 地を除 く全域 の普通 期栽培 地帯	埴土～ 埴土 (減水 深 1.5 cm/日 以下)	移植後20 ～25日 (ノビエ 2葉期ま で) 〔移植前 後の初 期除草 剤によ る土壌 処理と の体系 で使用〕	3～4 kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数 1 回, シ メトリンを 含む農薬の 総使用回数 2 回以内, ニトラリン を含む農薬 の総使用回 数 1 回, フ ェノチオー ルを含む農 薬の総使用 回数 1 回〕	北興化学 工業㈱