

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省 農蚕園芸局 植物防疫課

昭和63年12月1日～平成元年3月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
DBN 水和剤	カペレン 水和剤	2,6-ジクロ ルベンゾニ リル……45%	水 和 剤	日本芝 (こうら いしば)	一年生 雑草		壤土～ 埴土	芝休眠期 雑草発生 前～発生 始期	400～ 600g 〔希釈水 量250l〕	散布	(株)グリー ンカネシ ョウ
DBN 粒剤	カペレン 粒剤 2.5	2,6-ジクロ ルベンゾニ リル……2.5%	粒 剤	日本芝	一年生 雑草お よび多 年生広 葉雑草		壤土～ 埴土	秋期雑草 発生期～ 発生始期	8～10kg	全面土壌散布	(株)グリー ンカネシ ョウ
ビアラ ホス・ DCMU水和 剤	サポート 水和剤	L-2-アミ ノ-4[(ヒド ロキシ)(メチ ル)ホスフィ ノイル]ブチ リル-L-ア ラニル-L- アラニンのナ トリウム塩 ……12% 3-(3,4-ジ クロルフェ ニル)1,1- ジメチル尿素 ……18%	水 和 剤	りんご	畑地一 年生雑 草			雑草生育 期(草丈 30cm以下) 収穫90日 前まで	500～ 750g 〔希釈水 量100 ～150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回,ビ アラホスを 含む農薬の 総使用回数 2回以内, DCMUを 含む農薬の 総使用回数 1回〕	明治製菓 (株)
					畑地多 年生雑 草				750～ 1,000g 〔希釈水 量100 ～150l〕		
				ぶどう ・かん きつ	畑地一 年生雑 草			雑草生育 期(草丈 30cm以下) 収穫60日 前まで	500～ 750g 〔希釈水 量100 ～150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを 使用する場 合1回,ビ アラホスを 含む農薬の 総使用回数 3回以内, DCMUを 含む農薬の 総使用回数 1回〕	
					畑地多 年生雑 草				750～ 1,000g 〔希釈水 量100 ～150l〕		
				もも	畑地一 年生雑 草			雑草生育 期(草丈	500～ 750g	雑草茎葉散布 〔本剤のみを	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有率	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ビアラホス・DCMU水和剤(つづき)				もも(つづき)				30cm以下 収穫90日前まで	希釈水量 100 〔～150l〕	使用する場合 1回、ビアラホスを含む農薬の総使用回数 3回以内、DCMUを含む農薬の総使用回数 1回	
					畑地多年生雑草				750～1,000g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕		
				桑	畑地一年生雑草			春期、萌芽前又は夏切り後(雑草生育期)	500～750g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合 1回、DCMUを含む農薬の総使用回数 1回〕	
				花木				雑草生育期(草丈 20cm以下)		雑草茎葉散布	
				公園・庭園・提とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等	一年生雑草			雑草生育期(草丈 20cm以下)	500～750g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕		
					多年生雑草				750～1,000g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕		
シメトリン・メフェナセット・MCPB粒剤	クロアSM粒剤	2-メチルチオ-4,6-ビス-エチルアミノ-S-トリアジン …1.5% 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド……4% 2-メチル-4-クロルフ	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ	北海道	壤土～埴土(減水深 2cm/日以下), 砂埴土(減水深 1.5cm/日以下)	移植後20～25日(ノビエ2葉期まで) 〔移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用〕	3kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合 1回、シメトリンを含む農薬の総使用回数 2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数 2回以内、MCPBを含む〕	日本特殊農薬製造(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シメトリン・メフェナセット・MCPB粒剤（つづき）		エノキシ酪酸エチル …0.8%				東北以西の早期栽培地帯（九州を除く）および普通期栽培地帯（九州および四国を除く）	壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	移植後20～25日（ノビエ3葉期まで） 〔移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用〕		農薬の総使用回数2回以内	
ベスロジン水和剤	バナフィン顆粒水和剤	Nーブチル－Nーエチル－ α, α, α －トリフルオール－2,6－ジニトロ－パラートルイジン ……58%	顆粒水和剤	日本芝	畑地一年生イネ科雑草			雑草発生前	500～700g 〔希釈水量250～300l〕	全面土壌散布	塩野義製薬(株)
ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤	ザークD粒剤17	1－(α, α －ジメチルベンジル)－3－(パラトリル)尿素…1.5% メチル＝ α －(4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル)－0－トルアート …0.17% 2－ベンゾチアゾール－2－イルオキシ－N－メチルアセトアニリド……3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草およびマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ミズガヤツリ・オモダカ・クログワイ・セリ・アオミドロ、藻類による表層はく離	北陸・関東・東山・東海の普通期および早期栽培地帯 近畿以西の普通期および早期栽培地帯	壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	移植後5～15日（ノビエ2.5葉期まで） 移植後5～15日（ノビエ3葉期まで）	3kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合1回、ダイムロンを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内、メフェナセットを含む農薬の総使用回数2回以内〕	三共(株)、九州三共(株)、日本特殊農薬製造(株)、クミアイ化学工業(株)、(株)エス・ディー・エスバイオテック、デュボンジャパンリミテッド