

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成元年 4 月 1 日～元年 11 月 30 日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社						
S A P 粉粒剤	ロンパー 細粒剤 F	0,0-ジイソ プロピル-2 - (ベンゼン スルホンアミ ド) エチルジ チオホスフェ ート……10%	粉 粒 剤	日本芝 (こう らいし ば)	一年生 イネ科 雑草			雑草発生 前	10～15kg	全面土壌散布	日本農業 ㈱						
ビアラ ホス・ D C M U 水和 剤	サポート 水和剤	L-2-アミ ノ-4〔(ヒド ロキシ)(メチ ル)ホスフィ ノイル〕プチ リル-L-ア ラニル-L- アラニンのナ トリウム塩 ……12% 3-(3,4- ジクロルフェ ニル)1,1- ジメチル尿素 ……18%	水 和 剤	りんご	畑地一 年生雑 草			雑草生育 期(草丈 30cm以下) 収穫90日 前まで	500 ～ 750 g 〔希釈水 量 100 ～150ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを〕 使用する場 合 1 回、本 剤及びビア ラホスを含 む農薬の総 使用回数 2 回以内、本 剤及び D C M U を含む 農薬の総使 用回数 1 回、	武田薬品 工業㈱, サンケイ 化学㈱, 保土谷化 学工業㈱, 北興化学 工業㈱						
					畑地多 年生雑 草				750～ 1,000 g 〔希釈水 量 100 ～150ℓ〕								
				ぶどう・ かんき つ	畑地一 年生雑 草				500～ 750 g 〔希釈水 量 100 ～150ℓ〕			雑草茎葉散布 〔本剤のみを〕 使用する場 合 1 回、本 剤及びビア ラホスを含 む農薬の総 使用回数 3 回以内、本 剤及び D C M U を含む 農薬の総使 用回数 1 回、					
					畑地多 年生雑 草								750～ 1,000 g 〔希釈水 量 100 ～150ℓ〕				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
ビアラ ホス・ DCM U水和 剤(つ づき)				も も	畑地一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下) 収穫90日前まで	500～ 750 g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合1回, 本剤及びビアラホスを含む農薬の総使用回数3回以内, 本剤及びDCMUを含む農薬の総使用回数1回〕	
					畑地多年生雑草				750～ 1,000 g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕		
				桑	畑地一年生雑草			春期萌芽前又は夏切り後(雑草生育期)	500～ 750 g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合1回, 本剤及びDCMUを含む農薬の総使用回数1回〕	
				花 木				雑草生育期(草丈20cm以下)		雑草茎葉散布	
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面等	一年生雑草			雑草生育期(草丈30cm以下)	500～ 750 g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕	雑草茎葉散布	
					多年生雑草				750～ 1,000 g 〔希釈水量 100 〔～150l〕〕		
ベンタ ゾン・ MCP 液剤	グラスジ ンMナト リウム液 剤	3-イソプロ ピル-2,1,3 -ベンゾチア ジアジノン- (4)-2,2 -ジオキシド =ナトリウム 塩………33% 2-メチル- 4-クロルフ ェノキシ酢酸 ナトリウム塩 ………6%	液 剤	水 稲	水田一年生雑草(イネ科を除く)及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ウリカワ	北海道	砂壤土 ～埴土 (減水深2cm /日以下)	幼穂形成 始期	300～ 500ml 〔希釈水量70～ 100l〕〕	浅く湛水して散布 〔本剤の使用回数1回, ベンタゾンを含む農薬の総使用回数1回, MCPを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学 工業㈱, 石原産業 ㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ペンタゾン・MCP液剤 (つづき)					水田一年生雑草(イネ科を除く)及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ウリカワ・ミズガヤツリ・クログワイ・コウキヤガラ・セリ	東北・北陸以南の普通期及び早期栽培地帯		有効分けつ終止期～幼穂形成期		落水散布 〔本剤の使用回数1回, ペンタゾンを含む農薬の総使用回数1回, MCPを含む農薬の総使用回数1回〕	
ペンタゾン・MCP粒剤	グラスジンML粒剤	3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジノン-(4)-2,2-ジオキシド=ナトリウム塩……5.5% 2-メチル-4-クロルフェノキシ酢酸エチル……0.7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草(イネ科を除く)及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ・ウリカワ・ミズガヤツリ	北海道	砂壤土～埴土(減水深1.5cm/日以下)	移植後30～45日	3～4kg	浅く湛水して散布 〔本剤の使用回数1回, ペンタゾンを含む農薬の総使用回数1回, MCPを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業㈱, 石原産業㈱
						東北・北陸		移植後20～30日		落水散布 〔本剤の使用回数1回, ペンタゾンを含む農薬の総使用回数1回, MCPを含む農薬の総使用回数1回〕	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ペンタゾン・MCP粒剤（つづき）						〔但し、九州の早期栽培地帯を除く〕					
						九州の早期栽培地帯	壤土～埴土（減水深1.5cm/日以下）				
ペンタゾン・MCP粒剤	グラスジ ンMナ トリウ ム粒 剤	3-イソプロ ピル-2,1,3 -ベンゾチア ジアジノン- (4)-2,2 -ジオキシド ナトリウム塩 ……11% 2-メチル- 4-クロルフ ェノキシ酢酸 エチル ……1.2%	粒 剤	水 稲	水田一 年生雑 草（イ ネ科を 除く） 及びマ ツバイ・ ホタル イ・ヘ ラオモ ダカ	北海道	壤土～ 埴土 （減水 深1.5 cm/日 以下）	幼穂形成 始期	3～4 kg	浅く湛水して 散布 〔本剤の使用 回数1回、 ペンタゾン を含む農薬 の総使用回 数1回、M C Pを含む 農薬の総使 用回数1回〕	日産化学 工業(株)、 石原産業 (株)
					水田一 年生雑 草（イ ネ科を 除く） 及びマ ツバイ・ ホタル イ・ウ リカワ・ ミズガ ヤツリ	東北・ 北陸		有効分け つ終止期 ～幼穂形 成期前			
						関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 （減水 深1.5 cm/日 以下）				
						近畿以 西の普 通期及 び早期 栽培地 帯	壤土～ 埴土 （減水 深1.5 cm/日 以下）				
MDB A液剤	クズコロ ン液剤	2-メトキシ -3,6-ジク ロール安息香酸 ジメチルアミ ン……25%	液 剤	林 地 （造林 木、有 用樹の 無い所）	ク ズ			4～5月	0.25m/ m ² /株	株頭に滴下	(株)エス・ ディー・ エスパイ オテック、 日本カー リット(株)

— 30 —

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ピリブチカルブ・プロモブチド粒剤	オリザガード粒剤	0-3-tert- ブチルフェニル=6-メ トキシ-2- ピリジル(メ チル)チオカ ルバマート ……3.3% (RS)-2- プロモ-N -(α , α - ジメチルベン ジル)-3,3- ジメチルブ チルアミド ……5%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ミズガ ヤツリ	全域の 普通期 及び早 期栽培 地帯	砂壤土 ～埴土 (減水深2cm /日以下。但 し、砂 壤土で は1.5 cm/日 以下)	移植後3 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	3 kg	湛水散布 〔但し、本剤 のみを使用 する場合の 使用回数1 回、ピリブ チカルブを 含む農薬の 総使用回数 1回、プロ モブチドを 含む農薬の 総使用回数 1回〕	東ソー(株)、 三笠化学 工業(株)、 サンケイ 化学(株)
キザロ ホップ エチル 水和剤	タルガフ ロアブル	エチル=(R S)-2-(4- (6-クロ ロキノキサリ ン-2-イル オキシ)フェ ノキシ)プロ ピオナート ……10%	水 和 剤	たまね ぎ	畑地一 年生イ ネ科雑 草(ス ズメノ カタビ ラを除 く)	全 域		雑草生育 期(イネ 科雑草の 3～6葉 期。但し、 収穫60日 前まで)	80～ 120 m/ 〔希釈水 量100ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びキ ザロホップ エチルを含 む農薬の総 使用回数2 回以内〕	日産化学 工業(株)、 日本農薬 (株)
				にんじ ん				雑草生育 期(イネ 科雑草の 3～6葉 期。但し、 収穫45日 前まで)		雑草茎葉散布 〔本剤及びキ ザロホップ エチルを含 む農薬の総 使用回数1 回〕	
				すいか				雑草生育 期(イネ 科雑草の 3～6葉 期。但し、 収穫30日 前まで)			
				いちご (親株 床)				雑草生育 期(イネ 科雑草の 3～6葉 期。但し、 収穫150 日前まで)		雑草茎葉散布 〔本剤及びキ ザロホップ エチルを含 む農薬の総 使用回数2 回以内〕	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
キザロホップエチル水和剤（つづき）				だいず・えだまめ				雑草生育期（イネ科雑草の3～5葉期．但し，収穫60日前まで）	75～100 m ^l 〔希釈水量100～150 ^l 〕	雑草茎葉散布〔本剤及びキザロホップエチルを含む農薬の総使用回数1回〕	
				あずき・いんげんまめ		東北以北		雑草生育期（イネ科雑草の3～5葉期．但し，収穫90日前まで）			
				らっかせい		関東以西		雑草生育期（イネ科雑草の3～5葉期．但し，収穫60日前まで）			
				かんしょ				雑草生育期（イネ科雑草の3～5葉期．但し，収穫60日前まで）			
				てんさい	北海道	雑草生育期（イネ科雑草の3～5葉期．但し，収穫120日前まで）	80～120 m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕				
				キャベツ	全 域	雑草生育期（イネ科雑草の3～6葉期．但し，収穫30日前まで）					
				はくさい		雑草生育期（イネ科雑草の3～6葉期．但し，収穫21日前まで）					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
キザロホップエチル水和剤(つづき)				いぐさ	水田一年生イネ科雑草	九州		イグサ先刈り後～ノビエ5葉期まで	100m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕	雑草茎葉散布(落水)	
キンクロラクク水和剤	ファセック水和剤	3,7-ジクロロキノリン-8-カルボン酸………50%	水和剤	乾田直播水稻	ノビエ	近畿・中国・四国	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	播種後9日～16日, 但し, 入水5日前まで(ノビエ2葉期まで)	80g 〔希釈水量70～100 ^l 〕	全面散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, キンクロラククを含む農薬の総使用回数2回以内〕	ビー・エー・エス・エフ・ジャパン(株)
キンクロラクク・ベントゾン粒剤	グラスゴン粒剤	3,7-ジクロロキノリン-8-カルボン酸……1.3% 3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジノン-(4)-2,2-ジオキシド=ナトリウム塩………11%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・セリ・エゾノサヤヌカグサ(北海道)	東海・北陸以北の普通期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後20～30日(ノビエの3.5葉期まで。但し, 北海道は3葉期まで)	3kg	落水散布または浅く湛水して散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, キンクロラククを含む農薬の総使用回数2回以内, ベントゾンを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業(株), 住化アグロ(株)
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカ	近畿・中国の普通期栽培地帯	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後10～20日(ノビエの3.5葉期まで)			
						四国・九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土(減水深2cm/日以下)				
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカ	全 域 (九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後20～35日(ノビエの3.5葉期まで。但し, 北海道は3			

[illegible]

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
キンクロラク・ベンスルフロンメチル粒剤	ロザール粒剤17	3,7-ジクロロキノリン-8-カルボン酸……1% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-0-トルアート……0.17%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・オモダカ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ・アオミドロ・藻類による表層はく離	北陸・関東・東山・近畿・中国の普通期及び早期栽培地帯・四国の早期栽培地帯	壤土～埴土（減水深2cm/日以下）	移植後5～15日（ノビエの2.5葉期まで）	3kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、キンクロラクを含む農薬の総使用回数2回以内、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	武田薬品工業㈱、北興化学工業㈱、デュボンジャパンリミテッド
ピラゾスルフロンエチル粒剤	シリウス粒剤	エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート……0.07%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草（イネ科を除く）及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・オモダカ・セリ クログワイ	東海・北陸以北の普通期及び早期栽培地帯 近畿以西の普通期及び早期栽培地帯（但し、九州を除く） 近畿以西の普通期栽培地帯（但し、九州を除く）	砂壤土～埴土（砂壤土では減水深1.5cm/日以下、埴土では2cm/日以下） 砂壤土～埴土（減水深1cm/日以下）	移植後12～20日 〔移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用〕	3kg	湛水散布 〔本剤及びピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ピラゾ スルフ ロンエ チル水 和剤	アグリー ン水和剤	エチル=5- (4,6-ジメ トキシピリミ ジン-2-イ ルカルバモイ ルスルファモ イルスルファ モイル)-1- メチルピラ ゾール-4- カルボキシラ ート……5%	水 和 剤	日本芝	ヒメク グ			芝生育期 (雑草生 育期)	200 g 〔希釈水 量 150 ~300 l〕	散布	日産化学 工業(株)
キンク ロラッ ク・ピ ラゾス ルフロ ンエチ ル・プ レチラ クロー ル粒剤	イナズマ 粒剤	2,7-ジクロ ロキノリン- 8-カルボン 酸……0.9% エチル=5- (4,6-ジメ トキシピリミ ジン-2-イ ルカルバモイ ルスルファモ イル)-1- メチルピラゾ ール-4-カル ボキシラート ……0.07% 2-クロロ- 2',6'-ジエチ ル-N-(2- プロポキシ エチル)アセ トアニリド ……1.5%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び ホタル イ・ウ リカワ・ ヘラオ モダカ	北海道	埴壌土 埴土 (減水 深 1 cm /日以 下)	移植後10 ~15日 (ノビエ 2葉期ま で)	3 kg	灌水散布 〔本剤の使用 回数 1 回, ピラゾスル フロネチル を含む農 薬の総使用 回数 1 回, キンクロラ ックを含む 農薬の総使 用回数 2 回 以内, プレ チラクロー ルを含む農 薬の総使用 回数 2 回以 内〕	日産化学 工業(株), 日本チバ ガイギー (株)
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ヘ ラオモ ダカ・ ヒルム シロ	東北		移植後 5 ~15日 (ノビエ 2.5葉期 まで)			
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ミズガ ヤツリ	北陸					
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ	関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
キンクロラク・ピラズルフロンエチル・プレチラクロール粒剤（つづき）					水田一年生雑草及びホタルイ	関東・東海の早期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ	近畿・中国の普通期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	近畿・中国の早期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びホタルイ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ	四国の普通期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ	四国の早期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	九州の普通期栽培地帯					

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
ピラゾ スルフ ロンエ チル・ プレチ ラクロ ール粒 剤	ライザー 粒剤20	エチル＝5－ (4,6－ジメ トキシピリミ ジン－2－イ ルカルバモイ ルスルファモ イル)－1－ メチルピラゾ ール－4－カ ルボキシラ ート……0.07% 2,6’－ジエチ ル－N－(2 －プロポキシ エチル)アセ トアニリド ……2%	粒 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ヘ ラオモ ダカ・ ヒルム シロ	北海道	壇壤土 ～壇土 (減水 深1.5 cm/日 以下)	移植後5 ～10日 (ノビエ 1.5葉期 まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤の使用 回数1回、 ピラゾスル フロンエチ ルを含む農 薬の総使用 回数1回、 プレチラク ロールを含 む農薬の総 使用回数2 回以内〕	日産化学 工業㈱、 石原産業 ㈱、日本 チバガイ ギー㈱
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ・ ヘラオ モダカ	東北	壇壤土 ～壇土 (減水 深1cm /日以 下)				
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ミズガ ヤツリ	北陸	壇壤土 ～壇土 (減水 深0.5 cm/日 以下)				
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ	関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤	ライザー粒剤15	エチル＝5－(4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル)－1－メチルピラゾール－4－カルボキシラート……0.07% 2－クロロ－2',6'－ジエチル－N－(2プロポキシエチル)アセトアニリド …1.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ	近畿・中国の普通期栽培地帯	埴埴土～埴土(減水深1cm/日以下)	移植後3～7日(ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤の使用回数1回,ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回,プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日産化学工業㈱, 日本チバガイギー㈱, 石原産業㈱
ピラゾフルフロエチル・メフェナセツト粒剤	アクト粒剤	エチル＝5－(4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル)－1－メチルピラゾール－4－カルボキシラート……0.07% 2－ベンゾチアゾール－2－イルオキシ－N－メチルアセトアニリド……3.5%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・アオミドロ・藻類による表層はく離	北海道	埴埴土～埴土(減水深1.5cm/日以下)	移植後10～15日(ノビエ2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤の使用回数1回,ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回,メフェナセツトを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日産化学工業㈱, 日本特殊農薬製造㈱, 八洲化学工業㈱
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ	東北		移植後5～15日(ノビエ2葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ピラゾ スルフ ロンエ チル・ メフェ ナセッ ト粒剤 (つづ き)					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ	北陸 関東・ 東山・ 東海の 早期栽 培地帯		移植後 5 ～15 日 (ノビエ 2.5 葉期 まで)			
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ・ ヒルム シロ・ セリ	関東・ 東山・ 東海の 普通期 栽培地 帯					
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ・ ヘラオ モダカ・ ヒルム シロ・ セリ	近畿・ 中国・ 四国の 普通期 栽培地 帯					
					水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリカ ワ・ミ ズガヤ ツリ・ ヒルム シロ	九州の 普通期 栽培地 帯					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
キンクロラク・ピラゾスルフロネチル粒剤	サーベイヤ粒剤	3,7-ジクロロキノリン-8-カルボン酸……0.9% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート……0.07%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ	北海道	砂壤土～埴土(減水深1.5cm/日以下)	移植後10～15日(ノビエ2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤の使用回数1回, キンクロラクを含む農薬の総使用回数2回以内, ピラゾスルフロネチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業㈱, 三笠化学工業㈱
					オモダカ	東北・関東・東山・東海の普通期栽培地帯	全域の早期及び普通期栽培地帯(減水深1.5cm/日以下)	移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)			
キンクロラク・プロモブチド粒剤	ボルサー粒剤	3,7-ジクロロキノリン-8-カルボン酸……0.9% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート……0.07% (RS)-2-ブプロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド……3%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ(関東以西)	北海道	埴土～埴土(減水深1cm/日以下)	移植後10～15日(ノビエ2葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤の使用回数1回, キンクロラクを含む農薬の総使用回数2回以内, ピラゾスルフロネチルを含む農薬の総使用回数1回, プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業㈱, 住化アグロ㈱
						九州の普通期栽培地帯	埴土～埴土(減水深1cm/日以下)	移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)			

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピラゾスルフロンエチル・モリネート粒剤	ペルーフ粒剤	エチル＝5－（4,6－ジメトキシピリミジン－2－イルカルバモイルスルファモイル）－1－メチルピラゾール－4－カルボキシレート……0.07% S－エチルヘキサヒドロ－1H－アゼピン－1－カーボチオエート……7%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・セリ・エゾノサヤヌカグサ（北海道）	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土（減水深1.5cm／日以下）	移植後5～15日（ノビエ2.5葉期まで）	3kg	灌水散布 〔本剤の使用回数1回、ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回、モリネートを含む農薬の総使用回数2回以内〕	八洲化学工業㈱、日産化学工業㈱、アイ・シー・アイジャパン㈱
グリホサートトリメシウム塩液剤	タッチダウン液剤	トリメチルスルホニウム＝N－（ホスホノメチル）グリシナート……38%	液剤	水稻	一年生雑草			雑草生育期（春期耕起前40～20日）	400～750m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートトリメシウム塩を含む農薬の総使用回数1回〕	アイ・シー・アイジャパン㈱、武田薬品工業㈱、日本農薬㈱、八洲化学工業㈱
					ミズガヤツリ			秋期水稻刈取後10日からミズガヤツリの塊茎形成盛期まで	500～750m ^l 〔希釈水量50～100 ^l 〕		
					セリ			秋期水稻刈取後、セリ生育期			
				りんご・ぶどう・なし・温州みかん	一年生雑草			雑草生育期（草丈30cm以下）	200～400m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕		
					多年生雑草				400～600m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕		
				公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・鉄道・運動場・宅地・のり面等	一年生雑草			雑草生育期（草丈50cm以下）	250～500m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕	雑草茎葉散布	
					多年生雑草				500～1,000m ^l 〔希釈水量100 ^l 〕		