

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成元年12月1日～2年4月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
アイオキシニル水和剤	グロスコールフロアブル	3,5-ジオーダー4-オクタノイルオキシベンゾニトリル……6%	水和剤	日本芝	畑地一年生広葉雑草			芝生育期（雑草生育初期）	1,000～1,200m ^l 〔希釈水量100～250 ^l 〕	雑草茎葉散布	塩野義製薬(株)
フラザスルフロン水和剤	シバゲン水和剤	1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(3-トリフルオロメチル-2-ピリジルスルホニル)尿素 ………10%	水和剤	日本芝	一年生雑草, 多年生広葉雑草及びヒメクグ			春期～夏期 芝生育期（雑草生育期）	25～50g 〔希釈水量150～200 ^l 〕	散布	石原産業(株)
					ハマスゲ				50～100g 〔希釈水量150～200 ^l 〕		
					一年生雑草			秋期～冬期 （雑草生育初期）	25～50g 〔希釈水量150～200 ^l 〕		
シメトリン・ピラゾキシフェン・プロモブチド粒	グラナイス粒剤	2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン……0.5% 2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ]アセトフェノン………6%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・ア	全域の普通期及び早期栽培地帯	砂壤土～埴土（減水深1.5cm/日以下）	移植後3～10日（ノビエ1.5葉期まで）	3 kg	灌水処理 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、シメトリンを含む農薬の総使用回数2回以内、ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数1回、プロモブチドを含	石原産業(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
シメトリン・ピラゾキシフェン・プロモブチド粒剤 (つづき)		N-(α , α -ジメチルベンジル)-2-プロモ-3,3-ジメチルブチルアミド4%			オミドロ・藻類による表層剥離					む農薬の総使用回数1回	
ナプロアニリド・プレチラクロール・プロモブチド粒剤	エリードン粒剤	α -(2-ナフトキシ)プロピオンアニリド.....10% 2'-クロロ-2'-6'-ジエチル-N-(2-プロボキシエチル)アセトアニリド.....2% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド3%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ	全域の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 (減水深1.5cm/日以下)	移植後3～10日 (ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, ナプロアニリドを含む農薬の総使用回数1回, プレチラクロールを含む農薬の総使用回数2回以内, プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回〕	三井東圧化学(株), サンケイ化学(株)
ピリブチカルブ・プロモブチド・ベンゾフェナップ水和剤	シーゼットフロアブル	O-3-tert-ブチルフェニル=6-メトキシ-2-ピリジル(メチル)チオカルバマート5.7% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド10% 2-(4-(2,4-ジク	水和剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ	全域の普通期及び早期栽培地帯 (但し, 九州を除く)	壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後3～10日 (ノビエ1.5葉期まで)	1 l	原液湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, ピリブチカルブを含む農薬の総使用回数1回, プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回, ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数1回〕	東ソー(株), 三共(株), 北海三共(株), 九州三共(株), アグロス, 八洲化学工業(株), 三菱油化(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ピリブチカルブ・プロモブチド・ベンゾフェナップ水和剤（つづき）		ロロ-m-トルオイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオキシ)-4'-メチルアセトフェノン12%			・ウリ カワ・ ヒルム シロ						
エスプロカルブ・ベンスルフロロンメチル・SAP粒剤	ミチノック粒剤	S-ベンジル=1,2-ジメチルプロピル（エチル）チオカルバマート.....7% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-O-トルアート0.25% O, O-ジイソプロピル-2-(ベンスルホナミド)エチルジチオホスフェート3%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ・ホタルイ ・ウリ カワ・ミズガヤツリ ・オモダカ・ヘラオモダカ ・ヒルムシロ	東北	壤土～ 埴土 （減水深2cm/日以下）	移植後10～20日（ノビエ2.5葉期まで）	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、エスプロカルブを含む農薬の総使用回数1回、ベンスルフロロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内、SAPを含む農薬の総使用回数1回〕	アイ・シー・アイジャパン(株), 日本農薬(株)
アトラジン・ビフェノックス水和剤	パーセブ水和剤	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-S-トリアジン15% 5-(2,4-ジクロルフェノキシ)-2-ニトロ安息香酸メチル60%	水和剤	日本芝	スズメノカタビラ及び一年生広葉雑草			雑草発生前～生育始期	400～600 g 〔希釈水量250ℓ〕	全面土壌散布	八洲化学工業(株), ローヌ・ブーラン・アグロ(株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a当り 使用量	使用 方法	登録会社
キンク ロラッ ク・シ ノスル フロ ン・プレ チラク ロール 粒剤	セイラン ト粒剤	1-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-3-[(2-(2-メトキシエトキシ)フェニル)スルホニル]尿素...0.15% 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド.....1%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ヘラオ モダカ	北海道	壤土～ 埴土 (減水深1.5 cm/日 以下)	移植後3 ～12日 (ノビエ 2葉期ま で)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回、キン クロラク クを含む農 薬の総使用 回数2回以 内、シノス ルフロンを 含む農薬の 総使用回数 1回、プレ チクロール を含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	日本チバ ガイギー (株)、大塚 化学(株)
					水田一年生雑草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリ カワ・ ヘラオ モダカ	東北・ 北陸以 南の普 通期栽 培地帯 及び関 東・東 海の早 期栽培 地帯					
					水田一年生雑草及び マツバ イ・ホ タルイ・ ウリ カワ・ ミ ズガヤ ツリ・ ヘラオ モダカ	近畿以 西の早 期栽培 地帯					

ノビエからホタルイまで

好評
発売中

水田初期除草剤

ショウロンM 粒剤

®: エス・ディー・エス バイオテック 登録商標

特長

- ☑ホタルイに卓効
- ☑イネに安全
- ☑適用地帯が広い
- ☑高い安全性

ショウロンM普及会

クミアイ化学工業株式会社 三井東圧化学株式会社
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 三井東圧農業株式会社