

## 新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成2年5月1日～2年10月31日

| 種類名                                   | 商品名                            | 有効成分の種類および含有量                                                                                                                       | 剤型     | 適用作物                                                | 使用目的                                        | 使用時期              | 使用量             | 適用地域 | 使用方法                                                                                                                           | 登録会社                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| フルル<br>プリミ<br>ドール<br>粒剤               | グリー<br>ンフィ<br>ールド<br>粒剤        | 2-メチル-<br>1-ピリミジ<br>ン-5-イル<br>-1-(4-<br>トリフルオロ<br>メトキシフェ<br>ニル)プロパ<br>ン-1-オール<br>……1.0%                                             | 粒<br>剤 | 日本芝                                                 | 草丈の伸<br>長抑制                                 | 生育初期<br>～生育盛<br>期 | 10～20<br>kg/10a |      | 全国均一散布<br>〔本剤及びフ<br>ルルプリミ<br>ドールを含<br>む農薬の総<br>使用回数2<br>回以内〕                                                                   | 塩野義製薬<br>(株), ダウ・<br>エランコ日<br>本(株)       |
|                                       |                                |                                                                                                                                     |        | 西洋芝<br>(バミュー<br>ダグラス<br>・ペン<br>トグラス<br>・ブルー<br>グラス) |                                             |                   | 5～10<br>kg/10a  |      |                                                                                                                                |                                          |
| イナベ<br>ンフィ<br>ド粒剤                     | セリタ<br>ード粒<br>剤5               | 4'-クロロ-<br>2'-( $\alpha$ -ヒ<br>ドロキシベン<br>ジル)イソニ<br>コチンアニリ<br>ド……5.0%                                                                | 粒<br>剤 | 水稻                                                  | 下位節間<br>短縮によ<br>る倒伏軽<br>減, 登熟<br>向上         | 出穂30～<br>50日前     | 3～4<br>kg/10a   |      | 湛水条件下で<br>均一に散布す<br>る<br>〔イナベンフ<br>ィドを含む<br>農薬の総使<br>用回数2回<br>以内(但し,<br>本田期は1<br>回)〕                                           | (株)アグロス                                  |
| 本剤の使用目的に新たに「登熟向上」を追加した。               |                                |                                                                                                                                     |        |                                                     |                                             |                   |                 |      |                                                                                                                                |                                          |
| プロベ<br>ナゾー<br>ル・イ<br>ナベン<br>フィド<br>粒剤 | オリゼ<br>メート<br>セリタ<br>ード粒<br>剤5 | 3-アリルオ<br>キシ-1,2-<br>ベンゾインチ<br>アゾール-1,<br>1-ジオキシ<br>ド……8.0%<br>4'-クロロ-<br>2'-( $\alpha$ -ヒ<br>ドロキシベン<br>ジル)イソニ<br>コチンアニリ<br>ド……5.0% | 粒<br>剤 | 稲                                                   | 下位節間<br>短縮によ<br>る倒伏軽<br>減, 及び<br>いもち病<br>防除 | 出穂40～<br>50日前     | 3～4<br>kg/10a   |      | 湛水散布<br>〔本剤の使用<br>回数1回<br>プロベナゾ<br>ールを含む<br>農薬の総使<br>用回数2回<br>以内<br>イナベンフ<br>ィドを含む<br>農薬の総使<br>用回数2回<br>以内(但し,<br>本田期は1<br>回)〕 | 明治製薬(株),<br>(株)アグロス                      |
| ピロキ<br>ロン・<br>イナベ<br>ンフィ<br>ド粒剤       | コラト<br>ップセ<br>リター<br>ード粒<br>剤  | 1,2,5,6-テ<br>トラヒドロピ<br>ロロ〔3,2,1<br>-ij〕キノリ                                                                                          | 粒<br>剤 | 水稻                                                  | 下位節間<br>短縮によ<br>る倒伏軽<br>減, 及び               | 出穂40～<br>50日前     | 3～4<br>kg/10a   |      | 湛水散布<br>〔本剤の使用<br>回数1回<br>ピロキロン                                                                                                | 中外製薬(株),<br>日本チバガ<br>イギー(株),<br>三共(株), 九 |

| 種類名                                          | 商品名 | 有効成分の<br>種類および<br>含有量                                                                    | 剤<br>型 | 適用作物 | 使用目的       | 使用時期 | 使用量 | 適用地域 | 使用方法                                                                                          | 登録会社               |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ピロキ<br>ロン・<br>イナペ<br>ンフィ<br>ド粒剤<br>(つづ<br>き) |     | ン-4-オン<br>……5.0%<br>4'-クロロ-<br>2'-( $\alpha$ -ヒ<br>ドロキシベン<br>ジル)イソニ<br>コチンアニリ<br>ド……5.0% |        |      | いもち病<br>防除 |      |     |      | を含む農薬<br>の総使用回<br>数4回以内<br>(本田は3<br>回以内)<br>イナペンフ<br>ィドを含む<br>農薬の総使<br>用回数2回<br>以内(本田<br>は1回) | 州三共(株),<br>(株)アグロス |

# 【ポラリス】 だったら、 5満足。

ポラリスはここが満足。  
数えたら、5つありました。

- ① いろいろな雑草に効きます。
- ② 効きめじくく、効果は長持ち。
- ③ サラッと撒いて、ラクに使えます。
- ④ 人にも自然にも安心成分です。
- ⑤ 値段もお手頃、経済的です。

● 詳しい資料をご希望の方は、下記住所までご請求ください。

ポラリス普及会 塩野義製薬株式会社・北興化学工業株式会社

事務局 日本モンサント株式会社 アグロサイエンス事業部 〒100 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル Tel.(03)287-1251

水田・畑・家まわりの除草に。  
黄色いボトルで新登場。



新刊

野外観察ハンドブック

## 校庭の雑草

岩瀬徹・川名興/共著 A5判/147頁/カラー写真約520点/定価1,900円

校庭や路傍で普通に見られる雑草を取り上げ、ユニークな視点からその見分けかたを展開。野外指導に携わる著者が、身近な雑草を生きた教材として活用するためにつくりだした、まったく新しいタイプの野外観察図鑑。

- 雑草の「くらし」と「かたち」 ● 校庭の雑草160種
- 校庭雑草の調べかた の3部構成。

全国農村教育協会 〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) ☎03(833)1821 振替/東京1-97736