

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成2年11月1日～3年4月30日

(1) 適用作物：移植水稻

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方法	登録会社
ビフェ ノック ス粒剤	モーダ ウン粒 剤	既登録薬剤に同じ									ローヌ・ プーラン アグロ(株)
ジチオ ピル・ プロモ ブチド 粒剤	ライト ーン粒 剤	S, S'-ジメ チル=2-ジ フルオロメチ ル-4-イソ ブチル-6- トリフルオロ メチルピリジ ン-3,5-ジ カルボチオア ート…0.40% (RS)-2- プロモ-N -(α , α - ジメチルベン ジル)-3,3- ジメチルブ チルアミド …4.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年 生雑草及 びマツバ イ・ホタ ルイ・ヘ ラオモダ カ	東北・ 北陸以 北	壤土～ 埴土 (減水 深1.5 cm/日 以下)	移植後3 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジチオピル を含む農薬 の総使用回 数1回 プロモブチ ドを含む農 薬の総使用 回数1回〕	日本モン サント(株)、 (株)アグロ ス
					水田一年 生雑草及 びマツバ イ・ホタ ルイ・ミ ズギャツ リ	関東・ 東山・ 東海の 普通期 及び早 期栽培 地帯		移植後3 ～8日 (ノビエ の1.5葉 期まで)			
						近畿以 西の普 通期及 び早期 栽培地 帯	壤土～ 埴土 (減水 深1cm /日以 下)				
ジチオ ピル・ ピラゾ レート ・プロ モブチ ド粒剤	ラゾ粒 剤	S, S'-ジメ チル=2-ジ フルオロメチ ル-4-イソ ブチル-6- トリフルオロ メチルピリジ ン-3,5-ジ カルボチオア ート…0.40%	粒 剤	移植水 稲	水田一年 生雑草及 びマツバ イ・ホタ ルイ・ウ リカワ・ ミズギャ ツリ・ヘ ラオモダ カ	東北・ 北陸以 南の普 通期及 び早期 栽培地 帯	壤土～ 埴土 (減水 深1.5 cm/日 以下)	移植後3 ～10日 (ノビエ の1.5葉 期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ジチオピル を含む農薬 の総使用回 数1回 ピラゾレー	日本モン サント(株)、 三共(株)、 九州三共 (株)、(株)ア グロス

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
ジチオ ピル・ ピラゾ レート ・プロ モブチ ド粒剤 (つづ き)		4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル-p-トルエンスルホネート …4.0% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド …3.0%								トを含む農薬の総使用回数1回 プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回	
ジチオ ピル・ ピラゾ スルフ ロンエ チル粒 剤	カルコ ーン粒 剤	S, S'-ジメチル=2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオアート…0.40% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート…0.070%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ	北海道	壤土～ 埴土 (減水深1.5cm/日以下)	移植後3～10日 (ノビエの1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ジチオピルを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日本モンサント㈱, 日産化学工業㈱, ㈱アグロ ス
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・オモダカ・ヒルムシロ・セリ	東北・北陸		移植後3～8日 (ノビエの1.5葉期まで)			
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・オモダカ・	九州の普通期栽培地帯					

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジチオビル・ピラゾスルフロエチル粒剤(つづき)					ヘラオモダカ・ヒルムシロ	関東以西の早期栽培地帯					
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ						

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
グリホサートナトリウム塩・ピアラホス水溶剤	インパルス水溶剤	ナトリウム＝N-(ホスホノメチル)グリシナート…16.0% L-2-アミノ-4-((ヒドロキシ)(メチル)ホスフィニル)ブチル-L-アラニル-L-アラニン のナトリウム塩…8.0%	水溶剤	水田耕起前	一年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下) ・耕起20日以前	500～600g 〔希釈水量100ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ピアラホスを含む農薬の総使用回数3回以内 グリホサートナトリウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、及びグリホサートアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数1回〕	明治製菓(株)、日本モンサント(株)、クミアイ化学工業(株)、三共(株)、北海三共(株)、九州三共(株)、(株)アグロス
				水田畦畔		雑草生育期(草丈30cm以下)		雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 ピアラホスを含む農薬の総使用回数2回以内 グリホサートナトリウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、及びグリホサートアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数3回以内〕	
				りんご					
				ぶどう・かんきつ・なし				雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 ピアラホスを含む農薬の総	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	使用時期	10a当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
グリホ サート ナトリ ウム塩 ・ピア ラホス 水溶剤 (つづ き)								使用回数3回以内 グリホサートナトリウム塩, グリホサートイソプロピル アミン塩, 及びグリホサ ートアンモニウム塩を含む農 薬の総使用回数3回以内	
グリホ サート アンモ ニウム 塩水溶 剤	草当番	アンモニウム =N-(ホス ホノメチル) グリシナート …20.0%	水 溶 剤	水田耕 起草	一年生雑 草	雑草生育 期(草丈 30cm以下) ・耕起10 日以前	500～ 750g 〔希釈水 量25～ 100l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートアン モニウム塩, グリホサート イソプロピルアミン塩, グ リホサートナトリウム塩を 含む農薬の総使用回数1回	日本モンサ ント㈱, クミアイ化 学工業㈱, 塩野義製薬 ㈱, 三共㈱, 北海三共㈱, 九州三共㈱
				水田畦 畔	一年生雑 草及び多 年生雑草	雑草生育 期(草丈 30cm以下)			
				りんご ・ぶど う・か んきつ ・なし	一年生雑 草 多年生雑 草		300～ 500g 〔希釈水 量25l〕 500～ 750g 〔希釈水 量25～ 100l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグリホサートアン モニウム塩, グリホサート イソプロピルアミン塩, グ リホサートナトリウム塩を 含む農薬の総使用回数3回 以内	
MDB A液剤	ロクイ チM液 剤	2-メトキシ -3,6-ジク ロル安息香酸 ジメチルアミ ン……40.0%	液 剤	公園・ 庭園・ 堤とう ・駐車 場・道 路・運 動場・ 宅地・ のり面 等	ニセアカ シア	6～9月	2倍希釈 液を直径 1cm当り 0.5～1 ml	立木処理(樹幹にナタ目を入 れハンドスプレー等で処理す る) 〔本剤およびMDBAを含む 剤の総使用回数3回以内〕	保土谷化学 工業㈱
							3倍希釈 液を直径 1cm当り 0.5～1 ml	切株処理(切口面にハnds プレー等で処理する) 〔本剤およびMDBAを含む 剤の総使用回数3回以内〕	
							0.5～1 l/10a 〔希釈水 量100l〕	茎葉散布 〔本剤およびMDBAを含む 剤の総使用回数3回以内〕	

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
テブチウロン・DCMU・DPA水和剤	ハービアウト水和剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素…13.0% 3-(3,4-ジクロルフェニル)-1,1-ジメチル尿素…23.0% 2,2-ジクロルプロピオン酸ナトリウム…44.0%	水和剤	駐車場・道路・運動場・鉄道・軌道内・宅地	一年生及び多年生雑草	雑草生育中期	4～6kg 〔希釈水量100～150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 テブチウロンを含む農薬の総使用回数3回以内 DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内 DPAを含む農薬の総使用回数3回以内〕	武田薬品工業㈱, 日本カーリット㈱
ジチオピル乳剤	ディクトラン乳剤	S, S'-ジメチル=2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオアート…32.0%	乳剤	日本芝	一年生雑草	雑草発生前	150～300ml 〔希釈水量200～300l〕	散布 〔本剤及びジチオピルを含む農薬の総使用回数2回以内〕	日本モンサント㈱, 大日本インキ化学工業㈱
DPA粒剤	ダラボン粒剤	既登録薬剤に同じ							保土谷化学工業㈱, 日産化学工業㈱, 石原産業㈱
DPA水溶剤	ダラボン水溶剤	既登録薬剤に同じ							保土谷化学工業㈱, 日産化学工業㈱, 石原産業㈱