

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成2年11月1日～3年4月30日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物等	使用目的	使用時期	10a 当り使用量	希釈倍数・希釈水量	使用方法	登録会社
パクロブトラゾール・メフルイジド水和剤	トリミッドフロアブル	(2RS, 3RS)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタン-3-オール …18.0% 2',4'-ジメチル-5'- (トリフルオルメタンズルホンアミド)アセトアニリドのジエタノールアミン塩 …1.6%	水和剤	西洋芝 (ブルーグラス・フェスク)	草丈の伸長抑制による刈込軽減	刈込7日前～刈込3日後	200～400 ml	300 l/10a	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数2回以内 パクロブトラゾールを含む農薬の総使用回数2回以内 メフルイジドを含む農薬の総使用回数2回以内〕	アイ・シー・アイジャパン(株)、日産化学工業(株)、武田薬品工業(株)、日本農薬(株)
				日本芝		刈込直後	600～1,000 ml			
				堤とう・駐車場・宅地・運動場・飛行場・グリーンベルト・のり面等の一年生雑草(シロザ・アオビユを除く)及び多年生雑草		雑草生育初期または生育中期 刈込直後	2～3 l	300 l/10a	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内 パクロブトラゾールを含む農薬の総使用回数3回以内 メフルイジドを含む農薬の総使用回数3回以内〕	
パラフィン乳剤	純グリーン	パラフィン …37.70%	乳剤	水稻	植え込み防止	移植前日		40～60 倍 100 ml/育苗箱 (30×60 cm)	散布 〔使用回数1回〕	三井東圧化学(株)

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物等	使用目的	使用時期	10a当り使用量	希釈倍数・希釈水量	使用方法	登録会社
メピコートクロリド液剤	フラスター液剤	1,1-ジメチルピペリジニウム=クロリド……44.0%	液剤	ぶどう(巨峰)	着粒増加	新梢展開葉7~8枚時		500倍 散布液量 100~150 l/10a	散布 〔本剤およびメピコートクロリドを含む農薬の総使用回数1回〕	ビーエーエスエフジャパン(株), 日本曹達(株)
ウニコナゾールP粒剤	ロミカ粒剤	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール……0.040%	粒剤	水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂20~10日前	2~3kg		湛水散布 〔本剤及びウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	住友化学工業(株), クミアイ化学工業(株), 日産化学工業(株), (株)アグロス
ピロキロン・ウニコナゾールP粒剤	ピタサイド粒剤	1,2,5,6-テトラヒドロピロロ[3,2,1-ij]キノリン-4-オン……6.5% (E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール……0.040%	粒剤	水稻	いもち病防除及び節間短縮による倒伏軽減	出穂20~10日前	3kg		湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 ピロキロンを含む農薬の総使用回数4回以内(本田は3回以内) ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	クミアイ化学工業(株)
ウニコナゾールP複合肥料	スミシヨート28, コープシヨート28, コープシヨートA28	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール……0.0050%	粒剤	水稻	節間短縮による倒伏軽減	出穂25~20日前	15~20kg		湛水散布 〔本剤及びウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数1回〕	住友化学工業(株), コープケミカル(株), 日本耕土産業(株)