

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成3年5月1日～10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ジチオピル・ペンスルフロンメチル	ワイホーブ粒剤25	S, S'-ジチメル=2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオアート...0.40% メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-オートルアート...0.25%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ	北海道	壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後5～15日 (ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、ジチオピルを含む農薬の総使用回数1回、ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日本モンサント㈱, デュポン・ジャパン・リミテッド, 北興化学工業㈱
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ	東北		移植後5～10日 (ノビエ1.5葉期まで)			
ジチオピル・ペンスルフロンメチル	ワイホーブ粒剤17	S, S'-ジメチル=2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオロメチルピリジ	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリ	北陸・関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	壤土～埴土 (減水深2cm/日以下)	移植後5～8日 (ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、ジチオピルを含む農薬の	日本モンサント㈱, デュポン・ジャパン・リミテッド, 北興化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ジチオビル・ベンスルフロンメチル(つづき)		ン-3,5-ジカルボチアート……0.40% メチル-α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-O-トリアルート……0.17%			カワ・ミズガヤツリ・セリ	近畿以西(九州を除く)の普通期栽培地帯	壇土～壇土(減水深1cm/日以下)			総使用回数1回、ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数2回以内	
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ・セリ	近畿以西(九州を除く)の早期栽培地帯					
エスプロカルプ・ピラゾスルフロンエチル	コントラクト粒剤	S-ベンジル=1,2-ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマー……7% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート…0.070%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ	北陸	壇土～壇土(減水深2cm/日以下)	移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)	3kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回、エスプロカルプを含む農薬の総使用回数1回、ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日産化学工業, アイ・シー・アイ・ジャパン(株), 石原産業(株), 塩野義製薬(株)
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ・セリ・アオミドロ・藻類による表層剥離	関東・東山・東海の普通期栽培地帯	砂壇土～壇土(減水深1cm/日以下)				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
エスプロカルプ・ピラゾスルフロンエチル(つづき)				水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヒルムシロ	九州の普通期栽培地帯	壤土～埴土 (減水深1.5cm/日以下)					
ピリブチカルプ	エイゲン水和剤	O-3-tert-ブチルフェニル=6-メトキシピリジル(メチル)チオカルバマート…47.0%	水和剤	日本芝(こうらいしば)	畑地一年生イネ科雑草	—	—	芝生育期(雑草発生前)	750～1,500g 〔希釈水量200～250l〕	散布 〔本剤及びピリブチカルプを含む農薬の総使用回数2回以内〕	東ソー(株), 大日本インキ化学工業(株)
				洋芝(ベントグラス)					750～1,500g 〔希釈水量200l〕		
テブチウロン・DCMU・DPA	ハービアウト粒剤	1-(5-tert-ブチル-1,3,4-シアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素……3% 3-(3,4-ジクロルフェニル)-1,1-ジメチル尿素……5% 2,2-ジクロルプロピオン酸ナトリウム……10%	粒剤	駐車場・道路・運動場・鉄道軌道内・宅地	一年生及び多年生雑草	—	—	雑草生育期(草丈30～50cm)	20～30kg	全面均一散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数3回以内, テブチウロンを含む農薬の総使用回数3回以内, DCMUを含む農薬の総使用回数3回以内, DPAを含む農薬の総使用回数3回以内〕	武田薬品工業(株), 日本カーリット(株)
ペンディメタリン・リニユロン	カイタック乳剤	N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン…15.0%	乳剤	小麦 大麦	畑地一年生雑草	関東以西 九州	砂埴土～埴土 埴土～埴土	播種後(雑草発生前)	500～800ml 〔希釈水量70～100l〕	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数3回以内〕	日本農薬(株), 日本サイアナミッド(株), デュポン・ジャバ

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量	使用方法	登録会社
ペンデ イメタ リン・ リニュ ロン (つづ き)		3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素 ……10%				関東・ 東山・ 東海			500 ml 〔希釈水量70～ 100 l〕	リンを含む農薬の総使用回数1回, リニュロンを含む農薬の総使用回数1回	ン・リミ テッド
プロジ アミン	クサプロ ック	5-ジプロピルアミノ- α , α -トリフルオロ-4,6-ジニトロ-O-トリイジン-63.0%	水和 剤	日本芝	一年生 雑草 (キク 科雑草 を除く)	—	—	秋期雑草 発生前 (芝生育 期)	120～ 160 g 〔希釈水量250 ～300 l〕	全面土壌散布 〔本剤及びプロ ジアミン を含む農薬 の総使用回 数1回〕	㈱エス・ ディー・ エス・バ イオテッ ク
ブタミ ホス・ プロモ ブチド	スミクレ ート粒剤	O-エチル-O-(3-メチル-6-ニトロフェニル)セコンダリーブチルホスホロアミドチオエート ……3.5% (RS)-2-プロモ-N-(α , α -ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド ……3.0%	粒 剤	移植水 稲	水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ	北海道	砂壤土～埴土(砂壤土では減水深1.5 cm/日以下, 埴土では減水深2 cm/日以下)	移植後3～8日(ノビエ1.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回, ブタミホスを含む農薬の総使用回数1回, プロモブチドを含む農薬の総使用回数1回〕	㈱アグロ ス
					水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ	東海・北陸以西(但し, 北海道を除く)	砂壤土～埴土(減水深2 cm/日以下)				
						近畿以西の普通期栽培地帯及び九州の早期栽培地帯	砂壤土～埴土(減水深1.5 cm/日以下)				

種類名	商品名	有効成分の種類および含有率	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地域	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
ブタミ ホス・ プロモ ブチド (つづ き)						近畿以 西の早 期栽培 地帯 (但し、 九州を 除く)	壤土～ 埴土 (減水 深1cm ／日以 下)				

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成3年5月1日～10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	10a当り使用量	適用地域	使用方法	登録会社
混合生 薬抽出 物	アルムグ リーン	オウバク・ク ジン・オウゴ ン・カッコン ・タイソウ・ ダイオウ・シ ョウキョウ・ センキュウ・ トウキ・カン ゾウ・チンピ ・トウガラシ 抽出物 …3.5%	液 剤	日本芝 (こうら いしば)	根の伸長 促進	生育期	1～2l 〔希釈水量 1,000l〕		散 布 〔本剤及び混 合生薬抽出 物を含む農 薬の総使用 回数16回以 内〕	(株)アルム
				西洋芝 (ペント グラス)						

新刊

改訂 雑草学用語集

日本雑草学会／編集・発行
B5判 234頁 定価7,210円(税込)

雑草を研究する上で必須の文献として高い評価を受けてきた旧版を大幅に改訂。雑草学研究に必要な用語はこれ1冊でこと足りるようという編集方針のもとに、第I編 学術用語編では現時点で必要な用語、解説用語を新たに選び直した。さらに第II編 雑草名編では新たに100種を追加し、第III編 除草剤名編では新たな薬剤も加え、わが国で登録されたことのある薬剤すべてを網羅した。

—呈内容見本—

全国農村教育協会

〒110 東京都台東区台東1-26-6(植調会館) 電話／03-3833-1821 FAX／03-3833-1665