

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成3年11月1日～4年4月30日

(1) 適用作物：移植水稻

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a当り使用量	使用方法	登録会社
エスプロカルブ・ジチオピル・ピラゾスルフロンエチル粒剤	ポテンザ粒剤	S-ベンジル=1,2-ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマー ト……7.0% S, S'-ジメチル=2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオア- ト…0.30% エチル=5-(4,6-ジメトキシピリジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラ- ト…0.070%	粒剤	移植水稻	水田一年生雑草及びマツバ イ・ホタルイ・ウリカワ・ミズガヤツリ・ヘラオモダカ・ヒルムシロ・セリ(北海道・東北・北陸)・アオミドロ・藻類による表層剥離	北海道 東北・北陸・関東以西の普通期栽培地帯(但し、九州を除く)	壤土～埴土(減水深2cm/日以下)	移植後10～20日(ノビエ2.5葉期まで) 移植後5～15日(ノビエ2.5葉期まで)	3 kg	湛水散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数1回 エスプロカルブを含む農薬の総使用回数1回 ジチオピルを含む農薬の総使用回数1回 ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数1回〕	日本モンサント㈱, 日産化学工業㈱, アイ・シー・アイジャパン㈱
ピラゾスルフロンエチル・メフェナセツト粒剤	アクト粒剤	既登録薬剤に同じ									三笠化学工業㈱

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適用 地帯	適用 土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	登録会社
ピラゾ スルフ ロンエ チル・ プレチ クロ ール粒 剤	ライザ 一粒剤 20	既登録薬剤に同じ									大塚化学 ㈱
ピラゾ スルフ ロンエ チル・ プレチ クロ ール粒 剤	ライザ 一粒剤 15	既登録薬剤に同じ									大塚化学 ㈱

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	適用 地帯	適用 土壌	使用時期	10a当り 使用量	使用方法	登録会社
ビフェ ノック ス水和 剤	ウィー ラルフ ロアブ ル	5-(2,4-ジクロルフェ ノキシ)-2- ニトロ安息 香酸メチル ……38.0%	水 和 剤	日本芝	スズメノ カタビラ 等一年生 イネ科雑 草			雑草発生 前	1,250ml 〔希釈水 量200 ~300l〕	全面土壌散布 〔本剤及びビ フェノック スを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	ローヌ・ プーラン アグロ㈱, 北興化学 工業㈱, 八洲化学 工業㈱
イソキ サベン 水和剤	ターザ イン水 和剤	N-[3-(1- エチル-1- メチルプロ ピル)イソオ キサゾール- 5-イル]-2, 6-ジメト キシベンズア ミド……50.0%	水 和 剤	日本芝 (こう らいし ば)	畑地一年 生広葉雑 草			秋期雑草 発生前	40~80g 〔希釈水 量200 ~300l〕	全面土壌散布 〔本剤及びイ ソキサベン を含む農薬 の総使用回 数1回〕	ダウ・エ ランコ日 本㈱, 大 日本イン キ化学工 業㈱, ㈱ 理研グリ ーン
DCP A乳剤	スタム 乳剤35	既登録薬剤に同じ									㈱アグロ ス

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
クロル フタリ ム複合 肥料	ハオト ップ8 号	N-(4-クロ ロフェニル) -1-シクロ ヘキセン-1, 2-ジカルボ キシミド ...0.50%	粒 剤	日本芝 (こう らいし ば)	一年生雑 草			春季雑草 発生前 (芝生育 期)	40~60kg	全面土壌処理 〔本剤及びク ロルフタリ ムを含む農 薬の総使用 回数1回〕	三菱化成 (株)
クロル フタリ ム複合 肥料	ユクリ ース10 号	N-(4-クロ ロフェニル) -1-1-シ クロヘキセン -1,2-ジカ ルボキシミド ...0.50%	粒 剤	日本芝 (こう らいし ば)	一年生雑 草			春季雑草 発生前 (芝生育 期)	40~60kg	全面土壌処理 〔本剤及びク ロルフタリ ムを含む農 薬の総使用 回数1回〕	三菱化成 (株)
〔ハオトトップ8号とユクリース10号とは含有する肥料成分が異なる〕											
グルホ シネー ト液剤	ハヤブ サ	アンモニウム =DL-ホモ アラニン-4 -イル(メチ ル)ホスフィ ナート ...8.5%	液 剤	キャベ ツ	畑地一年 生雑草			雑草生育 期 定植前又 は畦間処 理(収穫 45日前ま で)	500 ~ 750ml 〔希釈水 量50~ 100 l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	ヘキスト ジャパン (株), クミ アイ化学 工業(株), 日本バイ エルアグ ロケム(株)
				きゅう り				雑草生育 期 定植前又 は畦間処 理(収穫 前日まで)		雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数3回以 内〕	
				なす・ トマト				雑草生育 期 畦間処理 (収穫前 日まで)			
				ね ぎ				雑草生育 期 畦間処理 (収穫60 日前まで)		雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数2回以 内〕	
				だいこ ん				雑草生育 期 は種前			

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10 a 当り 使用 量	使用 方法	登録会社
グルホ シネー ト液剤 (つづ き)				さとい も・や まのい も				雑草生育 期 植付後畦 間処理 (収穫30 日前まで)		雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 3 回以 内〕	
				アスパ ラガス				雑草生育 期畦間処 理(収穫 30日前ま で)		雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 2 回以 内〕	
				かんき つ・り んご・ ぶどう・ なし・ もも	畑地一年 生雑草			雑草生育 期(草丈 30cm以下) 収穫21日 前まで	500 ～ 750ml 〔希釈水 量 100 ～150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 3 回以 内〕	
				かんし ょ	畑地一年 生雑草			雑草生育 期 挿苗後畦 間処理 (収穫90 日前まで)	400 ～ 500ml 〔希釈水 量50～ 100l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 2 回以 内〕	
				こんに ゃく	畑地一年 生雑草			雑草生育 期, 植付 後萌芽前 又は畦間 処理(収 穫30日前 まで)	500 ～ 750ml 〔希釈水 量50～ 100l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 3 回以 内〕	
				ばれい しょ	畑地一年 生雑草			雑草生育 期 植付後萌 芽直前	200 ～ 300ml 〔希釈水 量50～ 100l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 1 回〕	

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適用雑草	適 用 地 帯	適 用 土 壤	使用時期	10 a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
グルホ シネー ト液剤 (つづ き)				水田耕 起前	一年生雑 草			雑草生育 期(春期 耕起前30 ~15日)	500 ~ 750m/l 〔希釈水 量 100 ~150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 1 回〕	
				水田畦 畔	一年生及 び多年生 雑草			雑草生育 期(草丈 30cm以下)	1,000m/l 〔希釈水 量 100 ~150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 2 回以 内〕	
				桑	一年生雑 草			雑草生育 期, 春期 萌芽前及 び夏切り 後萌芽前	500 ~ 750m/l 〔希釈水 量 100 ~150l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 3 回以 内〕	
				公園・ 堤とう・ 庭園・ 駐車場・ 道路・ 宅地・ のり面 等	一年生雑 草			雑草生育 期	500 ~ 1,000m/l 〔希釈水 量 100 ~200l〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びグ ルホシネー トを含む農 薬の総使用 回数 3 回以 内〕	
チフェ ンスル フロ ンメ チル 水和 剤	ハーモ ニー75 DF水 和剤	メチル=3- (4-メトキ シ-6-メチ ル-1,3,5- トリアジン- 2-イルカル バモイルス ルファミ ール)-2-テ ノア-ト ...75.0%	水 和 剤	小 麦 大 麦	畑地一年 生広葉雑 草及びス ズメノテ ッポウ	関東・ 東山・ 東海 近畿以 西 北陸・ 関東・ 東山・ 東海・ 近畿・ 中国・ 四国 九 州	砂壤土 ~埴土 埴土~ 埴土 埴壤土 ~埴土	麦4葉期 ~節間伸 長前 但し, ス ズメノテ ッポウ5 葉期まで	5 ~10 g 〔希釈水 量 100 l〕	茎葉散布 〔本剤及びチ フェンスル フロンメチ ルを含む農 薬の総使用 回数 1 回〕	デュボン ジャパン リミテッ ド

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	適用地帯	適用土壌	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
プロメトリン・IPC 水和剤	ピンサイド水和剤	2－メチルチオ－4,6－ビス（イソプロピルアミノ）－s－トリアジン…15.0%	水和剤	あずき	畑地一年生雑草		砂壌土～埴土	播種後～出芽前	300 ～ 400 g 〔希釈水量 100 ～120ℓ〕	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数 1 回 プロメトリンを含む農薬の総使用回数 1 回 IPC を含む農薬の総使用回数 1 回〕	北海三共(株)
セトキシジム乳剤	ナブS 乳剤	（土）－2－（1－エトキシイミノブチル）－5－〔2－（エチルチオ）プロピル〕－3－ヒドロキシシクロヘキサ－2－エノン…12.5%	乳剤	だいず	畑地一年生イネ科雑草（スズメノカタビラは除く）			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期（但し、収穫 2 カ月前まで）	100 ～ 200ml/ 〔希釈水量 100 ～150ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤及びセトキシジムを含む農薬の総使用回数 1 回〕	日本曹達(株)
グルホシネート・DCMU 水和剤	クサカッター	アンモニウム＝DL－ホモアラニン－4－イル（メチル）ホスフィナート…10.0% 3－（3,4－ジクロルフェニル）－1,1－ジメチル尿素…15.0%	水和剤	かんきつ	畑地一年生雑草			雑草生育期（草丈 30cm以下） 収穫60 日前まで	500 ～ 750ml/ 〔希釈水量 150 ～200ℓ〕	雑草茎葉散布 〔本剤のみを使用する場合の使用回数 1 回 グルホシネートを含む農薬の総使用回数 3 回以内 DCMU を含む農薬の総使用回数 1 回〕	ヘキストジャパン(株)、日本曹達(株)
					畑地多年生雑草				750 ～ 1,000ml/ 〔希釈水量 150 ～200ℓ〕		
				桑	畑地一年生雑草			雑草生育期 春季萌芽前及び夏切り後萌芽前	300 ～ 500ml/ 〔希釈水量 100 ～150ℓ〕		
					庭園・駐車場・宅地のり面等	一年生雑草			雑草生育期		
多年生雑草				750 ～ 1,000ml/ 〔希釈水量 150 ～200ℓ〕							