

新 登 録 生 育 調 節 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成3年11月1日～4年4月30日

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回 数・10a当 り散布液量	希釈倍数	使用 方法	登録会社
ユニコ ナゾー ルP液 剤	スミセ ブnP 液剤	(E)-(S)- 1-(4-クロ ロフェニル)- 4,4-ジメ チル-2- (1H-1,2, 4-トリアゾ ール-1-イ ル)ペンター 1-エン-3 -オール …0.025%	液 剤	き く (ポット マム)	節間の伸 長抑制 (矮化)	摘芯10日 後頃	5～10ml/ 5号鉢(原 液0.1～0.2 ml/5号鉢)	25～50倍	茎葉散布 〔本剤及びウ ニコナゾー ルPを含む 農薬の総使 用回数2回 以内〕	住友化学 工業(株), (株)アグロ ス
							50～100ml/ 5号鉢 (原液1ml/ 5号鉢)	50～100倍	土壌灌注 〔本剤及びウ ニコナゾー ルPを含む 農薬の総使 用回数2回 以内〕	
				ポインセ チア			5～10ml/ 5号鉢(原 液0.3～0.5 ml/5号鉢)	15～25倍	茎葉散布 〔本剤及びウ ニコナゾー ルPを含む 農薬の総使 用回数2回 以内〕	
				つつじ・ しゃくな げ(鉢栽 培)	節間の伸 長抑制 (矮化) および着 蕾数増加	新梢伸長 初期		15～20倍		
ピロキ ロン・ パクロ ブトラ ゾール 粒剤	コラト ップス マレク ト粒剤	1,2,5,6-テ トラヒドロピ ロロ〔3,2,1 -ij〕キノリ ン-4-オン …5.0% (2RS, 3 RS)-1- (4-クロロ フェニル)-	粒 剤	水 稲	いもち病 及び節間 短縮によ る倒伏軽 減	出穂15～ 10日前	3～4 kg/10a		湛水散布 〔本剤のみを 使用する場 合の使用回 数1回 ピロキロン を含む農薬 の総使用回 数4回以内 (本田では	武田薬品 工業(株), アイ・シ ー・アイ ジャパン (株)

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量・回 数・10a当 り散布液量	希釈倍数	使用方法	登録会社
ピロキ ロン・ パクロ ブトラ ゾール 粒剤 (つづ き)		4,4-ジメチ ル-2-(1 H-1,2,4- トリアゾール -1-イル) ペンタン-3 -オール ...0.45%							3回以内) パクロブト ラゾールを 含む農薬の 総使用回数 1回	
クロレ ラ抽出 物液剤	スパー スエー ジ	クロレラ抽出 物...0.26%	液 剤	トマ ト	熟期促進	定植後	100 l	600 ~ 1,200 倍	茎葉散布 本剤及びク ロレラ抽出 物を含む農 薬の総使用 回数15回以 内	クロレ ラ工業 ㈱

農薬は正しく使いましょう!



低温時でも 安心して使える—!

●水田中期除草剤

★ウキクサ・モ類にもバッチリ効いて経済的

アピロサン®粒剤

- 一年生雑草及びヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホタルイ、ミズガヤツリを低コストで防除。
- 低温時でも薬害の心配がない。

★一発処理もできる中期除草剤

ワイダー®粒剤

- ヒエはもとより、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロなど多くの多年生雑草に高い効果。
- 低温時でも薬害の心配がない。

アピロサン・ワイダー普及会

武田薬品工業(株)・石原産業(株)
日本チバガイギー・BASFジャパン