

平成4年度茶園関係除草剤・ 生育調節剤試験成績概要

財団法人 日本植物調節剤研究協会 技術部

平成4年度茶園関係除草剤・生育調節剤委託試験成績検討会は、平成4年11月25日(火)、野菜・茶業試験場(金谷)会議室において試験関係者および委託関係者15名参集のもとに開催された。

当検討会では、除草剤、生育調節剤合わせて、3剤13点について各試験担当場所の報告、その質疑応答ならびに慎重な検討が行われた。その判定結果は次表のとおりである。

平成4年度 茶園関係除草剤・生育調節剤試験供試薬剤および判定結果一覧

A. 除 草 剤

薬剤名・剤型 〔委託者名〕	有効成分および含有率(%)	試験 新継	試験実施場所 ()=試験実施中(数)	〔対象雑草〕 処理時期; 薬量<水量I>/ a; 処理方法等	判定 案	内 容
1. Hoe-86610 液 〔ハヤブサ普及会 (事: ヘキスト ・ジャパン)〕	グルホシネート ……………8.5	適用 継続	静岡茶試, 京都茶研, 鹿児島茶試. (3)	〔一年生雑草全般〕 春期および夏期, 雑草生育期 (草丈30cm以下); 40, 50, 75ml/<10~15>; 茎葉処理. 比) プリグロックスL; 80ml/ <10~15>.	実・ 継	〔一年生雑草全般〕 ・春期~夏期雑草生育期 (草丈20cm以下). ・50~100ml/<10~15>. ・うね間茎葉処理. 継: 低薬量について.

B. 生 育 調 節 剤

薬剤名・剤型 〔委託者名〕	有効成分および含有率(%)	試験 新継	試験実施場所 ()=試験実施中(数)	〔目 的〕 処理時期; 薬量<水量I>/ a; 処理方法等	判定 案	内 容
1. 改良C-MH 液 〔日本ヒドラジン 工業〕	マレイン酸ヒド ラジドコリン ……………39	作用 継続 3年 適用 継続	野菜茶試. (1) 鹿児島茶試. (1)	〔秋梢抑制による翌年の発芽, 収穫時期への影響〕 8月下旬~9月上旬; 400~ 500倍<20>.	一 継 ?	有用な適用場面の検討.

薬剤名・剤型 〔委託者名〕	有効成分および含有率 (%)	試験 新継	試験実施場所 ()=試験実施中 (数)	〔 目 的 〕 処理時期；薬量＜水量 l＞／ a；処理方法等	判定 案	内 容
2. OKY-500液	12種類生薬抽出物	作用 継続	野菜茶試. (1)	〔茶樹育苗期における発根促進 ・生育促進〕	継	効果の確認，処理方法について.
		適用 継続	静岡茶試， 三重茶業セ， 京都茶研， 鹿児島茶試. (4)	〔茶樹育苗期における発根促進 ・生育促進〕 挿穂木を希釈液に3時間浸漬 →挿穂後希釈液を3 l / m ² 土 壌灌注→被覆除去後3週間に 1回希釈液 2 l / m ² 灌注処理； 500, 1, 000 倍.		
		3年 適用 継続	三重茶業セ， 京都茶研， 鹿児島茶試. (3)	〔茶樹育苗期における発根促進 ・生育促進〕 ・穂木を希釈液に3時期浸漬 ・挿穂後希釈液を5 l / m ² 土 壌灌注→被覆除去後月1回希 釈液 3 l / m ² 灌注処理；500， 1, 000 倍.		
〔アルム〕						

豊かさを描いて。

豊かさに、確かさをプラスして、
さらに美しさを求める。
ホクコーは、より質の高い実りの
世界を、今日も描き続けます。



ホクコーの主要除草剤

初期除草剤

マーシェット[®] 粒剤2.5

モーダウ[®] 粒剤

中期除草剤

セスロン[®] 粒剤

バサゲラン[®] 粒剤・液剤
(ナトリウム塩)

初期一発処理剤

プッシュ[®] 粒剤

クサカリン[®] 粒剤

初期除草剤

デルカット[®] 乳剤

ロンスター[®] 乳剤

煙作用除草剤

クレマート[®] 乳剤
U粒剤

果樹・畑作・その他除草剤

ポラリス[®] 液剤

ハービーエース[®] 水溶剤

高温多湿で病害虫、雑草の多い日本では、
農薬のない農業は成り立ちません。



農 協
経 済 連 合



北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町4-4-20