

新 登 録 除 草 剤 一 覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成4年5月1日～4年10月31日

(1) 移 植 水 稻

種類名	商 品 名	有効成分の 種類および 含 有 量	剤 型	適用作 物名・ 場 所	適 用 雑 草	適 用 地 帯	適 用 土 壌	使用時期	10a 当り 使 用 量	使 用 方 法	登録会社
ナプロ アニリ ド・ブ ロモブ チド・ メフェ ナセツ ト粒剤	シンザン 粒剤	既登録薬剤に同じ									㈱アグロ ス
ブレチ ラクロ ール乳 剤	エリジャ ン乳剤	2-クロロ- 2',6'-ジエ チル-N- (2-プロポ キシエチル) アセトアニリ ド……12.0%	乳 剤	移植水 稲	水田一 年生雑 草及び マツバ イ・ホ タルイ ・ヘラ オモダ カ	九州を 除く全 域	壤土～ 埴土 (減水 深2cm /日以 下)	植代時～ 移植4日 前まで	500 ml	原液湛水散布 〔本剤及びブ レチラクロ ールを含む 農薬の総使 用回数2回 以内(本剤 は1回)〕	日本チバ ガイギー ㈱, クミ アイ化学 工業㈱, 武田薬品 工業㈱
ダイム ロン・ ペン スル フロ ンメ チル ・メ フェ ナセ ット 粒剤	ザークD 粒剤17	既登録薬剤に同じ									日本バイ エルアグ ロケム㈱
ペン スル フロ ンメ チル ・メ フェ ナセ ット 粒剤	ザーク粒 剤25	既登録薬剤に同じ									日本バイ エルアグ ロケム㈱

(2) 水田耕起前・水田畦畔・休耕田・水稻刈後・畑作・野菜作・永年生作物・非農耕地対象

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	使用時期	10a 当り使用量	使用 方 法	登録会社
イマザキンアンモニウム塩・ペンディメタリン乳剤	オフCE乳剤	アンモニウム＝(RS)－2－(4－イソプロピル－4－メチル－5－オキソ－2－イミダゾリン－2－イル)キノリン－3－カルボキシラート ……2.5% N－(1－エチルプロピル)－3,4－ジメチル－2,6－ジニトロアニリン ……25.0%	乳剤	日本芝	畑地一年生雑草	秋期芝生育期(雑草発生始期)	800～1,000ml 〔希釈水量 250 l〕	全面土壌散布 〔本剤のみを使用する場合〕 の使用回数 1 回 イマザキンアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数 3 回以内 ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数 2 回以内	日本サイアナミッド㈱
ブタミホス粒剤	クレマートU粒剤	既登録薬剤に同じ							㈱アグロス
ピアラホス液剤	ハービー液剤	L－2－アミノ－4－〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフィノイル〕ブチル－L－アラニンのナトリウム塩 ……18.0%	液剤	かんきつ・ぶどう・なし・もも・キウイフルーツ・かき	畑地一年生雑草	雑草生育期(草丈 30cm以下) 収穫30日前まで	500～750ml 〔散布水量 100～150 ml〕	雑草茎葉散布 〔本剤およびピアラホスを含む農薬の総使用回数 3 回以内〕	明治製菓㈱、武田薬品工業㈱、北興化学工業㈱
					畑地多年生雑草		750～1,000ml 〔散布水量 100～150 ml〕		
				りんご	畑地一年生雑草	雑草生育期(草丈 30cm以下) 収穫21日前まで	500～750ml 〔散布水量 100～150 ml〕		
					畑地多年生雑草		750～1,000ml 〔散布水量 100～150 ml〕		

種類名	商品名	有効成分の 種類および 含有量	剤 型	適用作 物名・ 場所	適用雑草	使用時期	10a 当り 使用量	使用 方 法	登録会社
ビアラ ホス液 剤(つ づき)				畑作一年 生雑草	畑作一年 生雑草	定植前雑 草生育期 (草丈20 cm以下)	300 ~ 500m/ 〔散布水 量 100 ~ 150 ml〕	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 1 回〕	
						雑草生育 期, 萌芽 前(収穫 30日前ま で)または 収穫打 切後畦間 処理		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 2 回以内〕	
						雑草生育 期, 播種 前処理 (草丈20 cm以下)		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 1 回〕	
						雑草生育 期, 萌芽 前処理		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 1 回〕	
						雑草生育 期, 挿苗 前又は挿 苗後畦間 処理(収 穫60日前 まで)		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 4 回以内〕	
						雑草生育 期, 耕起 10日以前		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 1 回〕	
				水田畦 畔	雑草生育 期(草丈 30cm以下)	雑草生育 期(草丈 30cm以下)		雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 2 回以内〕	
					多年生雑 草		750 ~ 1,000m/ 〔散布水 量 100 ~ 150 ml〕		

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物名・場所	適用雑草	使用時期	10a 当り使用量	使用方法	登録会社
ビアラ ホス液 剤(つ づき)				桑	畑地・一年生雑草	春期萌芽前及び夏切後(雑草生育期)	500 ~ 750m/ 〔散布水量 100 ~ 150 m/〕	雑草茎葉散布 〔本剤およびビアラホスを 含む農薬の総使用回数 3 回以内〕	
				公園・ 庭園・ 堤とう ・駐車 場・道 路・運 動場・ 宅地・ のり面 等	一年生雑草	雑草生育期(草丈 30cm以下)	750 ~ 1,000m/ 〔散布水量 100 ~ 150 m/〕		
					多年生雑草				

新登録生育調節剤一覧

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課

平成4年5月1日～4年10月31日

種類名	商品名	有効成分の種類および含有量	剤型	適用作物	使用目的	使用時期	使用量	使用方法	登録会社
イナベンフィド粒剤	箱セリタード粒剤	4'-クロロ-2'-(α -ヒドロキシベンジル)イソニコチンアニリド……4.0%	粒剤	水稲	下位節間短縮による倒伏軽減	移植前日～移植当日	育苗箱(30×60×3cm)使用土壌約5l)1箱当たり75～100g.	育苗箱の苗の上から均一に散布する 〔本剤およびイナベンフィドを含む農薬の総使用回数2回以内(本剤は1回)〕	㈱アグロス
ウニコナゾールP複合肥料	スミシヨート14, コープシヨート14, コープシヨートA14	(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンター-1-エン-3-オール …0.012%	複合肥料	水稲	節間短縮による倒伏軽減	出穂25～10日前	7～10 kg/10a	湛水散布 〔本剤およびウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数〕	住友化学工業(株), コーベケミカル(株), 日本耕土産業(株)